**Synthese neuer Kaliumkanalöffner
mit Benzothiadiazin-, Benzothiazol-, Benzodithiepin-,
Thiochromanon- und Isothiochromanon-Gerüst**

Inaugural-Dissertation

zur

**Erlangung des Doktorgrades der
Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät
der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf**

vorgelegt von

Andreas Fischer

aus Neuss

Düsseldorf, April 2014

Aus dem Institut für Organische Chemie und Makromolekulare Chemie,
Abteilung für stereoselektive Synthesen
der Heinrich-Heine Universität Düsseldorf

Gedruckt mit der Genehmigung der
Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Referent: Prof. Dr. M. Braun

Koreferent: Prof. Dr. T. J. J. Müller

Tag der mündlichen Prüfung: 04.06.2014

Die vorliegende Arbeit wurde in der Zeit von November 2008 bis Dezember 2013 am Institut für Organische Chemie und Makromolekulare Chemie der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Leitung von Prof. Dr. M. Braun angefertigt.

Die Forschung wurde im Rahmen des Projekts „Br 604/18-1,2: Thioamidsubstituierte benzanellierte Heterocyclen als hochaffine, selektive Kaliumkanal-Öffner" von der „Deutschen Forschungsgemeinschaft“ (DFG) gefördert.

Die hier vorliegende Dissertation habe ich eigenständig und ohne unerlaubte Hilfe angefertigt. Die Dissertation wurde in der vorgelegten oder in ähnlicher Form noch bei keiner anderen Institution eingereicht. Ich habe bisher keine erfolglosen Promotionsversuche unternommen.

Düsseldorf, den 22.04.2014

(Andreas Fischer)

Teile dieser Dissertation wurden bereits veröffentlicht:

S. Lachenicht, A. Fischer, C. Schmidt, M. Winkler, A. Rood, H. Lemoine, M. Braun, Synthesis of Modified 4*H*-1,2,4-Benzothiadiazine-1,1-Dioxides and Determination of their Affinity and Selectivity for Different Types of K_{ATP} Channels, *ChemMedChem*, **2009**, *4*, 1850-1858.

A. Fischer, C. Schmidt, S. Lachenicht, D. Grittner, M. Winkler, T. Wrobel, A. Rood, H. Lemoine, W. Frank, M. Braun, Synthesis of Benzofuran, Benzothiophene, and Benzothiazole-Based Thioamides and their Evaluation as K_{ATP}-Channel Openers, *ChemMedChem*, **2010**, *5*, 1749-1759.

C. Schmidt, A. Fischer, D. Grittner, M. Braun, H. Lemoine, Synthesis and selective action of diazoxide derivatives on SUR2B-type KATP channels, *Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology*, **2010**, *381 Supplement 1*, 35.

C. Schmidt, A. Fischer, D. Grittner, M. Braun, H. Lemoine, Allosteric interaction of diazoxide derivatives and [(3)H]-P-1075 on SUR2B-type K(ATP) channels, *Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology*, **2011**, *383 Supplement 1*, 39.

Mein außerordentlicher Dank gilt meinem Doktorvater Prof. Dr. Manfred Braun für die gute Unterstützung durch anregende Diskussionen, Hilfsbereitschaft und sein Vertrauen in meine Person. Seine jahrelange Expertise auf dem Gebiet der organischen Chemie war sehr hilfreich und motivierend.

Für Janette

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
1.1 Die Zellmembran	1
1.2 Ionentransport	3
1.3 Kaliumkanäle	4
1.3.1 ATP-abhängige Kaliumkanäle (K_{ATP})	6
1.3.2 K_{ATP} -Kanal regulierende Substanzen	9
1.4 Zielsetzung	12
2. Hauptteil	14
2.1 Diazoxide	14
2.1.1 Kondensation zu den einkernigen Diazoxid-Derivaten mit aliphatischen Substituenten in der 3-Position	14
2.1.2 Kondensation zu den einkernigen Diazoxid-Derivaten mit heteroaliphatischen Substituenten in der 3-Position	15
2.1.3 Kondensation zu den einkernigen Diazoxid-Derivaten mit aromatischen und heteroaromatischen Substituenten in der 3-Position	16
2.1.4 Syntheseveruche der Vorstufen des <i>ortho</i> -Carboran-substituierten Diazoxids	18
2.1.5 Versuch der Thioamidierung des Diazoxid-Derivats 15b	19
2.1.6 Zweikernige Diazoxid-Derivate	20
2.1.6.1 Syntheseveruche der Brücke aus Glykoleinheiten.....	20
2.1.6.2 Kondensation zu den über die 3-Position des Grundgerüsts verknüpften zweikernigen Diazoxid-Derivaten.....	22
2.2 Benzoxazole	23
2.3 Benzothiazole	25
2.3.1 Alkylsubstituierte Benzothiazole	25
2.3.2 Synthese der Thioamide mit Benzothiazol-Grundgerüst	27
2.3.3 Synthese der Benzothiazol-basierten Amide	31
2.4 Benzofurane	33
2.4.1 Synthese von 2-(1-Benzofuran-2-yl)essigsäure.....	33
2.4.2 Synthese des Thioesters	36
2.4.3 Synthese des Thioamids mit Benzofuran-Grundgerüst	37
2.4.4 Retrosynthetische Betrachtung des Reaktionsweges.....	38
2.4.5 Coumaranone	39
2.5 Benzothiophene	42
2.5.1 Synthese des Thioesters	42
2.5.2 Synthese des Thioamids mit Benzothiophen-Grundgerüst.....	43

2.5.3	Versuch der Alkylierung von 2-(1-Benzothiophen-2-yl)- <i>N</i> - <i>tert</i> -butylacetamid 76	44
2.6	Benzoxepine	45
2.7	Benzothiazepine	47
2.8	Benzodithiepine	49
2.8.1	Synthese der bromierten Xylol-Derivate	49
2.8.2	Synthese der Dithiole	52
2.8.3	Synthese der Benzodithiepine	53
2.8.3.1	Versuch der direkten Methylierung	54
2.8.3.2	Thioacetalbildung unter Säurekatalyse (<i>para</i> -Toluolsulfonsäure).....	55
2.8.3.3	Thioacetalbildung unter mineralischer Katalyse (Montmorillonit KSF).....	57
2.8.3.4	Thioacetalbildung unter Eisenkatalyse (Eisen(III)chlorid)	58
2.8.4	Oxidationen der Benzodithiepine	59
2.8.5	Synthese der Thioamide mit Benzodithiepin-Grundgerüst	61
2.8.5.1	Benzodithiepin-Thioamide	62
2.8.5.2	Thioamide der Benzodithiepin-Sulfoxide	64
2.8.5.3	Amid eines Benzodithiepins	66
2.9	Thio- und Isothiochromanone	67
2.9.1	Synthese der Benzylsulfanylcarbonsäuren	67
2.9.2	Ringschluss zum Isothiochromanon	72
2.9.3	Synthese der Thioamide mit Thio- und Isothiochromanon-Grundgerüst	76
2.9.3.1	Thioamid mit Thiochromanon-Grundstruktur	76
2.9.3.2	Thioamid mit Isothiochromanon-Grundstruktur.....	77
2.10	Zellphysiologische Untersuchungen der synthetisierten neuen Kaliumkanalöffner^[86]	84
2.10.1	Physiologische Ergebnisse der Diazoxid-Derivate	85
2.10.2	High Performance Computing der Volumina der Diazoxid-Derivate.....	89
2.10.3	Physiologische Ergebnisse der Benzothiazol-Derivate.....	91
2.10.4	Physiologische Ergebnisse weiterer Thioamide und Amide benzanellierter Heterozyklen	96
2.10.5	Physiologische Ergebnisse der Benzodithiepin-Derivate.....	97
2.10.6	Physiologische Ergebnisse der Thio- und Isothiochromanon-Derivate	99
3.	Zusammenfassung / Summary	105
3.1	Zusammenfassung	105
3.2	Summary	112
4.	Experimenteller Teil	119
4.1	Danksagung	119

4.2	Geräte	121
4.3	Trocknung und Aufbewahrung von Lösemitteln	123
4.4	Allgemeine Hinweise zum Arbeiten unter Inertbedingungen	124
4.5	Herstellung und Verwendung von Kältemischungen	125
4.6	Versuche zur Synthese der Diazoxid-Derivate	126
4.6.1	Allgemeine Arbeitsvorschrift zur Synthese der chlosubstituierten Diazoxid-Derivate.....	126
4.6.1.1	7-Chlor-3-cyclohexyl-4 <i>H</i> -1λ ⁶ ,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion 15a	127
4.6.1.2	7-Chlor-3-(cyclohexylmethyl)-4 <i>H</i> -1λ ⁶ ,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion 15b	127
4.6.1.3	7-Chlor-3-cyclopentyl-4 <i>H</i> -1λ ⁶ ,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion 15c	128
4.6.1.4	7-Chlor-3-(cyclopentylmethyl)-4 <i>H</i> -1λ ⁶ ,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion 15d ...	129
4.6.1.5	7-Chlor-3-cyclobutyl-4 <i>H</i> -1λ ⁶ ,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion 15e	130
4.6.1.6	7-Chlor-3-(cyclobutylmethyl)-4 <i>H</i> -1λ ⁶ ,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion 15f	131
4.6.1.7	7-Chlor-3-cyclopropyl-4 <i>H</i> -1λ ⁶ ,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion 15g	131
4.6.1.8	3-(4- <i>tert.</i> -Butylcyclohexyl)-7-chlor-4 <i>H</i> -1λ ⁶ ,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion 15h	132
4.6.1.9	3-(Bicyclo[2.2.1]heptan-2-yl)-7-chlor-4 <i>H</i> -1λ ⁶ ,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion 15i	133
4.6.1.10	7-Chlor-3-pentyl-4 <i>H</i> -1λ ⁶ ,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion 15j	133
4.6.1.11	7-Chlor-3-ethenyl-4 <i>H</i> -1λ ⁶ ,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion 15k	134
4.6.1.12	7-Chlor-3-(but-1-en-1-yl)-4 <i>H</i> -1λ ⁶ ,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion 15l	135
4.6.1.13	7-Chlor-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)-4 <i>H</i> -1λ ⁶ ,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion 15m	135
4.6.1.14	7-Chlor-3-(pent-4-in-1-yl)-4 <i>H</i> -1λ ⁶ ,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion 15n	136
4.6.1.15	7-Chlor-3-(2-methoxyethyl)-4 <i>H</i> -1λ ⁶ ,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion 17c	136
4.6.1.16	7-Chlor-3-(ethoxymethyl)-4 <i>H</i> -1λ ⁶ ,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion 17d	137
4.6.1.17	7-Chlor-3-[2-(methylsulfanyl)ethyl]-4 <i>H</i> -1λ ⁶ ,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion 17a	138
4.6.1.18	7-Chlor-3-(pyrrolidin-2-yl)-4 <i>H</i> -1λ ⁶ ,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion 17b	138
4.6.1.19	7-Chlor-3-phenyl-4 <i>H</i> -1λ ⁶ ,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion 19a	139
4.6.1.20	3-Benzyl-7-chlor-4 <i>H</i> -1λ ⁶ ,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion 19b	139
4.6.1.21	3-Benzyl-7-chlor-4 <i>H</i> -1λ ⁶ ,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion (Mikrowelle) 19b	140
4.6.1.22	7-Chlor-3-[(4-nitrophenyl)methyl]-4 <i>H</i> -1λ ⁶ ,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion 19c	141
4.6.1.23	3-(Aminobenzyl)-7-chlor-4 <i>H</i> -1λ ⁶ ,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion 19d	142
4.6.1.24	7-Chlor-3-(2-phenylethyl)-4 <i>H</i> -1λ ⁶ ,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion 19e	142
4.6.1.25	<i>rac</i> -7-Chlor-3-(1-phenylethyl)-4 <i>H</i> -1λ ⁶ ,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion 19f	143
4.6.1.26	7-Chlor-3-[(1 <i>S</i>)-1-phenylethyl]-4 <i>H</i> -1λ ⁶ ,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion 19g ...	144

4.6.1.27	7-Chlor-3-[(1 <i>R</i>)-1-phenylethyl]-4 <i>H</i> -1λ ⁶ ,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion 19h ...	144
4.6.1.28	7-Chlor-3-[(2-(3-methoxyphenyl)ethyl)-4 <i>H</i> -1λ ⁶ ,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion 19i	145
4.6.1.29	3-(1-Amino-2-phenylethyl)-7-chlor-4 <i>H</i> -1λ ⁶ ,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion 19j	146
4.6.1.30	7-Chlor-3-(2-hydroxyphenyl)-4 <i>H</i> -1λ ⁶ ,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion 19k	146
4.6.1.31	7-Chlor-3-[(2-hydroxyphenyl)methyl]-4 <i>H</i> -1λ ⁶ ,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion 19l	146
4.6.1.32	3-(2-Acetylphenyl)-7-chlor-4 <i>H</i> -1λ ⁶ ,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion 19m	147
4.6.1.33	7-Chlor-3-(naphthalin-2-ylmethyl)-4 <i>H</i> -1λ ⁶ ,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion 19n	147
4.6.1.34	7-Chlor-3-(6-methoxynaphthalin-2-yl)-4 <i>H</i> -1λ ⁶ ,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion 19o	148
4.6.1.35	7-Chlor-3-(pyridin-2-yl)-4 <i>H</i> -1λ ⁶ ,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion 19p	148
4.6.1.36	7-Chlor-3-(thiophen-2-yl)-4 <i>H</i> -1λ ⁶ ,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion 19q	149
4.6.1.37	7-Chlor-3-(thiophen-2-ylmethyl)-4 <i>H</i> -1λ ⁶ ,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion 19r .	150
4.6.1.38	7-Chlor-3-(<i>o</i> -carboran-2-yl)-4 <i>H</i> -1λ ⁶ ,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion 19s	151
4.6.1.39	7-Chlor-3-(cyclohexylmethyl)- <i>N</i> -ethyl-1,1-dioxo-4 <i>H</i> -1λ ⁶ ,2,4-benzothiadiazin-4-carbothioamid 22	151
4.6.2	Synthese der Vorstufen der verbrückten Diazoxide und der <i>o</i> -Carborancarbonsäure 18s	152
4.6.2.1	1,17-Dibrom-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecan 24	152
4.6.2.2	4,7,10,13,16-Pentaoxonadecandinitril 25 über die Kolbe-Nitrilsynthese	152
4.6.2.3	3-(2-Carboxyethoxy)propionsäure 27	153
4.6.2.4	<i>ortho</i> -Carborancarbonsäure 18s : Carboxylierung von <i>ortho</i> -Carboran 20 .	153
4.6.2.5	<i>ortho</i> -Carborancarbonsäurechlorid 21	154
4.6.3	Allgemeine Arbeitsvorschrift für die Synthese der verbrückten Diazoxide 29a-f	154
4.6.3.1	7-Chlor-3-({4-[(7-chlor-1,1-dioxo-4 <i>H</i> -1λ ⁶ ,2,4-benzothiadiazin-3-yl)methyl]phenyl}methyl)-4 <i>H</i> -1λ ⁶ ,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion 29a	155
4.6.3.2	7-Chlor-3-[2-(7-chlor-1,1-dioxo-4 <i>H</i> -1λ ⁶ ,2,4-benzothiadiazin-3-yl)ethinyl]-4 <i>H</i> -1λ ⁶ ,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion 29b	155
4.6.3.3	7-Chlor-3-(2-{4-[2-(7-chlor-1,1-dioxo-4 <i>H</i> -1λ ⁶ ,2,4-benzothiadiazin-3-yl)ethyl]phenyl}ethyl)-4 <i>H</i> -1λ ⁶ ,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion 29c	156
4.6.3.4	3-[3-Amino-3-(7-chlor-1,1-dioxo-4 <i>H</i> -1λ ⁶ ,2,4-benzothiadiazin-3-yl)propyl]-7-chlor-4 <i>H</i> -1λ ⁶ ,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion 29d	156
4.6.3.5	7-Chlor-3-[(2-{2-[(7-chlor-1,1-dioxo-4 <i>H</i> -1λ ⁶ ,2,4-benzothiadiazin-3-yl)methoxy]ethoxy}ethoxy)methyl]-4 <i>H</i> -1λ ⁶ ,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion 29e	157

4.6.3.6	7-Chlor-3-{2-[(7-chlor-1,1-dioxo-4 <i>H</i> -1λ ⁶ ,2,4-benzothiadiazin-3-yl)methoxy]phenoxy}methyl-4 <i>H</i> -1λ ⁶ ,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion 29f	158
4.7	Versuche zur Synthese der Benzoxazol-basierten Thioamide	159
4.7.1	2-(1,3-Benzoxazol-2-yl)- <i>N</i> -ethylethanthioamid 31a	159
4.7.2	2-(1,3-Benzoxazol-2-yl)- <i>N</i> -butylethanthioamid 32b	159
4.7.3	<i>N</i> -Ethyl-1,2-benzoxazol-3-carbothioamid.....	160
4.8	Versuche zur Synthese der Benzothiazol-basierten Amide und Thioamide ..	161
4.8.1	Synthese der substituierten Benzothiazole 38a-c, 40	161
4.8.1.1	2-Ethyl-1,3-benzothiazol 38a	161
4.8.1.2	2-Propyl-1,3-benzothiazol 38b	161
4.8.1.3	2-Benzyl-1,3-benzothiazol 38c	162
4.8.1.4	2-Methyl-5-(trifluormethyl)-1,3-benzothiazol 40	162
4.8.2	Allgemeine Arbeitsvorschrift zur Synthese der Benzothiazol-2-carbothioamide	163
4.8.2.1	2-(1,3-Benzothiazol-2-yl)- <i>N</i> -(3-chlorpropyl)ethanthioamid 41a	163
4.8.2.2	<i>N</i> -(2,6-Difluorphenyl)-1,3-benzothiazol-2-carbothioamid 41b	164
4.8.2.3	2-(1,3-Benzothiazol-2-yl)- <i>N</i> -ethylpropanthioamid 41c	164
4.8.2.4	2-(1,3-Benzothiazol-2-yl)- <i>N</i> - <i>tert.</i> -butylpropanthioamid 41d	165
4.8.2.5	<i>N</i> -(Adamantan-2-yl)-2-(1,3-benzothiazol-2-yl)propanthioamid 41e	166
4.8.2.6	2-(1,3-Benzothiazol-2-yl)- <i>N</i> -phenylpropanthioamid 41f	166
4.8.2.7	2-(1,3-Benzothiazol-2-yl)- <i>N</i> -ethylbutanthioamid 41g	166
4.8.2.8	2-(1,3-Benzothiazol-2-yl)- <i>N</i> - <i>tert.</i> -butylbutanthioamid 41h	167
4.8.2.9	<i>N</i> -Ethyl-2-(5-methoxy-1,3-benzothiazol-2-yl)ethanthioamid 43a	169
4.8.2.10	<i>N</i> -Ethyl-2-(6-methoxy-1,3-benzothiazol-2-yl)ethanthioamid 43b	169
4.8.2.11	<i>N</i> - <i>tert.</i> -Butyl-2-(6-methoxy-1,3-benzothiazol-2-yl)ethanthioamid 43c	170
4.8.2.12	<i>N</i> -Ethyl-2-(5-fluor-1,3-benzothiazol-2-yl)ethanthioamid 43d	171
4.8.2.13	2-(5-Chlor-1,3-benzothiazol-2-yl)- <i>N</i> -ethylethanthioamid 43e	171
4.8.2.14	<i>N</i> -(2-Chlorethyl)-1,3-benzothiazol-2-carbothioamid 45a	172
4.8.2.15	<i>N</i> -(Bicyclo[2.2.1]heptan-2-yl)-1,3-benzothiazol-2-carbothioamid 45b	173
4.8.2.16	<i>N</i> -(Adamant-2-yl)-1,3-benzothiazol-2-carbothioamid 45c	174
4.8.2.17	<i>N</i> -(2,6-Difluorphenyl)-1,3-benzothiazol-2-carbothioamid 45d	174
4.8.2.18	<i>N</i> -(2,3,5,6-Tetrafluorphenyl)-1,3-benzothiazol-2-carbothioamid 45e	175
4.8.2.19	<i>N</i> -(3-Nitrophenyl)-1,3-benzothiazol-2-carbothioamid 45f	175
4.8.2.20	1-(1,3-Benzothiazol-2-yloxy)- <i>N</i> -ethylmethanthioamid 47	177
4.8.2.21	<i>N</i> -Ethyl[2-(1,3-benzothiazol-2-ylsulfanyl)ethoxy]carbothioamid 49	177
4.8.3	Synthese der Amide mit Benzothiazol-Struktur	178
4.8.3.1	2-(1,3-Benzothiazol-2-yl)- <i>N</i> - <i>tert.</i> -butylacetamid 51	178

4.8.3.2	2-(1,3-Benzothiazol-2-yl)- <i>N</i> - <i>tert</i> .-butylpropanamid 52	179
4.9	Versuche zur Synthese der Benzofuran-basierten Amide und Thioamide	181
4.9.1	Ethyl-2-(1-benzofuran-3-yl)acetat 72	181
4.9.2	2-Allyl-1-benzofuran 55	181
4.9.3	2-(1-Benzofuran-2-yl)acetaldehyd 56	182
4.9.4	2-(1-Benzofuran-2-yl)essigsäure 57	183
4.9.5	2-[2,2-Bis(methylsulfanyl)ethenyl]-1-benzofuran 60	184
4.9.6	2-(1-Benzofuran-2-yl)-1-(methylsulfanyl)ethan-1-on 61 Fehler! Textmarke nicht definiert.	
4.9.7	2-(1-Benzofuran-2-yl)- <i>N</i> - <i>tert</i> .-butylacetamid 63	185
4.9.8	2-(1-Benzofuran-2-yl)- <i>N</i> - <i>tert</i> .-butylethanthioamid 64	186
4.10	Versuche zur Synthese der Coumaranon-basierten Amide und Thioamide ..	187
4.10.1	2,2-Diallyl-3-coumaranon 67	187
4.10.2	2,2-Diallyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-3-ol 68	188
4.10.3	3 <i>H</i> -Spiro[1-benzofuran-2,1'-cyclopentan]-3'-en-3-ol 69	189
4.10.4	1-[[2,2-Bisprop-2-en-1-yl]-2,3-dihydro-1-benzofuran-3-yl]oxy]- <i>N</i> -ethylmethanthioamid 70	189
4.11	Versuche zur Synthese der Benzothiophen-basierten Amide und Thioamide	191
4.11.1	2-[2,2-Bis(methylsulfanyl)ethenyl]-1-benzothiophen 74	191
4.11.2	2-(1-Benzothiophen-2-yl)-1-(methylsulfanyl)ethan-1-on 75	191
4.11.3	2-(1-Benzothiophen-2-yl)- <i>N</i> - <i>tert</i> .-butylacetamid 76	192
4.11.4	2-(1-Benzothiophen-2-yl)- <i>N</i> - <i>tert</i> .-butylethanthioamid 77	192
4.11.5	2-(1-Benzothiophen-2-yl)- <i>N</i> - <i>tert</i> .-butylbutanamid 79	193
4.12	Versuche zur Synthese der Benzoxepin-Derivate	194
4.12.1	1-Phenyl-2-(2-allylphenoxy)ethan-1-on 83	194
4.12.2	1-Allyl-2-(2-bromallyloxy)benzol 85	195
4.12.3	1-(2-Phenylallyloxy)-2-allylbenzol 87	196
4.13	Versuche zur Synthese der Benzothiazepin-Derivate	196
4.13.1	2,3,4,5-Tetrahydro-1,5-benzothiazepin-4-on 89	196
4.13.2	Versuch der Methylierung des Benzothiazepins 89	197
4.13.3	Versuch der Thioamidierung des Benzothiazepins.....	198
4.14	Versuche zur Synthese der Benzodithiepin-basierten Thioamide	198
4.14.1	Synthese der Benzodithiepine	198
4.14.1.1	1,2-Bis(hydroxymethyl)-4,5-dichlorbenzol 100	198
4.14.1.2	1,2-Bis(brommethyl)benzol 98a	199
4.14.1.3	1,2-Bis(brommethyl)-3-methoxybenzol 98b	199

4.14.1.4	1,2-Bis(brommethyl)-4-chlorbenzol 98c	200
4.14.1.5	1,2-Bis(brommethyl)-4,5-dichlorbenzol 98e	201
4.14.1.6	5,6-Bis(brommethyl)benzo-1,3-dioxol 98f	201
4.14.1.7	2,3-Bis(brommethyl)pyridin 98d	202
4.14.1.8	1,2-Phenylendimethanthiol 102a	202
4.14.1.9	(3-Methoxy-1,2-phenylen)dimethanthiol 102b	203
4.14.1.10	(4-Chlor-1,2-phenylen)dimethanthiol 102c	204
4.14.1.11	[6-(Sulfanylmethyl)-2 <i>H</i> -1,3-benzodioxol-5-yl]methanthiol 102e	204
4.14.1.12	[3-(Sulfanylmethyl)pyridin-2-yl]methanthiol 102d	205
4.14.1.13	3,5-Dihydro-1 <i>H</i> -2,4-benzodithiepin 103	206
4.14.1.14	3,3-Dimethyl-3,5-dihydro-1 <i>H</i> -2,4-benzodithiepin 105a	206
4.14.1.15	3-Methyl-3-propyl-3,5-dihydro-1 <i>H</i> -2,4-benzodithiepin über mineralische Katalyse 105b	208
4.14.1.16	3-Methyl-3-propyl-3,5-dihydro-1 <i>H</i> -2,4-benzodithiepin über Säurekatalyse 105	208
4.14.1.17	3-3-Bis(trifluormethyl)-3,5-dihydro-1 <i>H</i> -2,4-benzodithiepin 105c	209
4.14.1.18	1,5-Dihydrospiro[2,4-benzodithiepin-3,1'-cyclooctan] 105d	209
4.14.1.19	1,5-Dihydrospiro[2,4-benzodithiepin-3,1'-cycloheptan] 105e	210
4.14.1.20	1,5-Dihydrospiro[2,4-benzodithiepin-3,1'-cyclohexan] über Eisenkatalyse 105f	211
4.14.1.21	1,5-Dihydrospiro[2,4-benzodithiepin-3,1'-cyclohexan] über mineralische Katalyse 105f	212
4.14.1.22	1,5-Dihydrospiro[2,4-benzodithiepin-3,1'-cyclohexan] über Säurekatalyse 105f	212
4.14.1.23	4'- <i>tert.</i> -Butyl-1,5-dihydrospiro[2,4-benzodithiepin-3,1'-cyclohexan] 105g ... 213	
4.14.1.24	1'-Methyl-1,5-dihydrospiro[2,4-benzodithiepin-3,4'-piperidin] über Eisenkatalyse 105h	214
4.14.1.25	1'-Methyl-1,5-dihydrospiro[2,4-benzodithiepin-3,4'-piperidin] über Säurekatalyse 105h	214
4.14.1.26	1,5-Dihydrospiro[2,4-benzodithiepin-3,4'-oxan] 105i	215
4.14.1.27	1,5-Dihydrospiro[2,4-benzodithiepin-3,1'-cyclobutan] 105j	216
4.14.1.28	6-Methoxy-1,5-dihydrospiro[2,4-benzodithiepin-3,1'-cyclohexan] 105k	216
4.14.1.29	8-Chlor-1,5-dihydrospiro[2,4-benzodithiepin-3,1'-cyclohexan] 105l	217
4.14.1.30	4',6'-Dioxa-11',13'-dithiaspiro(cyclohexan-1,12'-tricyclo[7.5.0.0 ^{3,7}]tetradecan)-1'(9'),2',7'-trien 105m	218
4.14.2	Oxidationsversuche an Benzodithiepin-Derivaten.....	218
4.14.2.1	3,5-Dihydro-1 <i>H</i> -2λ ⁴ ,4-benzodithiepin-2-on 107	218
4.14.2.2	3,3-Dimethyl-3,5-dihydro-1 <i>H</i> -2λ ⁴ ,4-benzodithiepin-2-on 108a	219

4.14.2.3	1,5-Dihydrospiro[2 λ^4 ,4-benzodithiepin-3,1'-cyclohexan]-2-on 108b	219
4.14.2.4	4'- <i>tert.</i> -Butyl-1,5-Dihydrospiro[2 λ^4 ,4-benzodithiepin-3,1'-cyclohexan]-2-on 108c	220
4.14.2.5	1,5-Dihydrospiro[2 λ^4 ,4-benzodithiepin-3,1'-cyclobutan]-2-on 108d	221
4.14.2.6	1,5-Dihydrospiro[2 λ^6 ,4-benzodithiepin-3,1'-cyclohexan]-2,2-dion 109	222
4.14.3	Synthese der Thioamide mit Benzodithiepin-Struktur	223
4.14.3.1	<i>N</i> -Ethyl-3,5-dihydro-1 <i>H</i> -2,4-benzodithiepin-3-carbothioamid 110a	223
4.14.3.2	<i>N</i> -Butyl-3,5-dihydro-1 <i>H</i> -2,4-benzodithiepin-3-carbothioamid 110b	224
4.14.3.3	<i>N-tert.</i> -Butyl-3,5-dihydro-1 <i>H</i> -2,4-benzodithiepin-3-carbothioamid 110c	224
4.14.3.4	<i>N</i> -Ethyl-3,3-dimethyl-3,5-dihydro-1 <i>H</i> -2,4-benzodithiepin-1-carbothioamid 111a	225
4.14.3.5	<i>N</i> -Ethyl-3-methyl-3-propyl-3,5-dihydro-1 <i>H</i> -2,4-benzodithiepin-1-carbothioamid 111b	226
4.14.3.6	<i>N</i> -Ethyl-1,5-dihydrospiro[2,4-benzodithiepin-3,1'-cyclooctan]-1-carbothioamid 111c	227
4.14.3.7	<i>N</i> -Ethyl-1,5-dihydrospiro[2,4-benzodithiepin-3,1'-cycloheptan]-1-carbothioamid 111d	228
4.14.3.8	<i>N</i> -Methyl-1,5-dihydrospiro[2,4-benzodithiepin-3,1'-cyclohexan]-5-carbothioamid 111e	229
4.14.3.9	<i>N</i> -Ethyl-1,5-dihydrospiro[2,4-benzodithiepin-3,1'-cyclohexan]-5-carbothioamid 111f	230
4.14.3.10	<i>N-tert.</i> -Butyl-1,5-dihydrospiro[2,4-benzodithiepin-3,1'-cyclohexan]-5-carbothioamid 111g	231
4.14.3.11	4'- <i>tert.</i> -Butyl- <i>N</i> -ethyl-1,5-dihydrospiro[2,4-benzodithiepin-3,1'-cyclohexan]-1-carbothioamid 111h	232
4.14.3.12	<i>N</i> -Ethyl-1,5-dihydrospiro[2,4-benzodithiepin-3,4'-oxan]-1-carbothioamid 111i	233
4.14.3.13	<i>N</i> -Ethyl-1,5-dihydrospiro[2,4-benzodithiepin-3,1'-cyclobutan]-5-carbothioamid 111j	234
4.14.3.14	<i>N</i> -Ethyl-4',6'-dioxo-11',13'-dithiaspiro[cyclohexan-1,12'-tricyclo[7.5.0.0 ^{3,7}]tetradecan]-1'(9'),2',7'-trien-10'-carbothioamid 111k	235
4.14.3.15	<i>N</i> -Ethyl-2-oxo-3,5-dihydro-1 <i>H</i> -2,4-benzodithiepin-3-carbothioamid 112	236
4.14.3.16	<i>N</i> -Ethyl-3,3-dimethyl-2-oxo-3,5-dihydro-1 <i>H</i> -2 λ^4 ,4-benzodithiepin-1-carbothioamid 113a	236
4.14.3.17	<i>N</i> -Ethyl-2-oxo-1,5-dihydrospiro[2 λ^4 ,4-benzodithiepin-3,1'-cyclohexan]-1-carbothioamid 113b	238
4.14.3.18	<i>N</i> -Ethyl-2-oxo-1,5-dihydrospiro[2 λ^4 ,4-benzodithiepin-3,1'-cyclobutan]-5-carbothioamid 113c	239
4.14.4	Synthese der Amide mit Benzodithiepin-Struktur	240
4.14.4.1	<i>N-tert.</i> -Butyl-3,5-dihydro-1 <i>H</i> -2,4-benzodithiepin-3-carboxamid 114	240

4.15	Versuche zur Synthese der Isothiochromanon-Derivate	240
4.15.1	Allgemeine Arbeitsvorschrift für die Synthese der Benzylsulfanylcarbonsäuren	240
4.15.1.1	2-(Benzylsulfanyl)propansäure 117a	241
4.15.1.2	2-(Benzylsulfanyl)butansäure 117b	241
4.15.1.3	2-(Benzylsulfanyl)pentansäure 117c	242
4.15.1.4	3,5-Dimethoxytoluol 120	242
4.15.1.5	Bromierung von 3,5-Dimethoxytoluol 120	243
4.15.1.6	3,5-Dimethoxybenzylthiol 123	244
4.15.1.7	2-[(3,5-Dimethoxyphenyl)methyl]sulfanyl}essigsäure 124a	245
4.15.1.8	Ethyl-2-(3,5-dimethoxyphenyl)methylsulfanylpropionat 126	245
4.15.1.9	2-(3,5-Dimethoxyphenyl)methylsulfanylpropansäure 124b	246
4.15.1.10	2-(4-Chlorbenzylsulfanyl)propansäure 129	248
4.15.2	Ringschluss zum Isothiochromanon	248
4.15.2.1	Isothiochroman-4-on 131a	248
4.15.2.2	3-Methylisothiochroman-4-on 131b	249
4.15.2.3	3-Ethylisothiochroman-4-on 131c	251
4.15.2.4	5,7-Dimethoxyisothiochroman-4-on 132a	252
4.15.2.5	5,7-Dimethoxy-3-methylisothiochroman-4-on 132b	253
4.15.2.6	6-Chlor-3-methylisothiochroman-4-on 133	254
4.15.3	Synthese der Thioamide mit Thio- und Isothiochromanon-Struktur	255
4.15.3.1	<i>N</i> -Ethyl-4-oxo-3,4-dihydro-2 <i>H</i> -1-benzothiopyran-3-carbothioamid 135	255
4.15.3.2	<i>N</i> -Ethyl-3-methyl-4-oxo-3,4-dihydro-1 <i>H</i> -2-benzothiopyran-3-carbothioamid 136a	257
4.15.3.3	<i>N-tert.</i> -Butyl-3-methyl-4-oxo-3,4-dihydro-1 <i>H</i> -2-benzothiopyran-3-carbothioamid 136b	257
4.15.3.4	2-([(1- <i>tert.</i> -Butylcarbamothioyl)ethyl]sulfanyl)methyl}benzoesäure 139a	258
4.15.3.5	<i>N</i> -Norbornyl-3-methyl-4-oxo-3,4-dihydro-1 <i>H</i> -2-benzothiopyran-3-carbothioamid 136c	259
4.15.3.6	<i>N</i> -[(1 <i>R</i>)-1-Cyclohexylethyl]-4-oxo-3,4-dihydro-1 <i>H</i> -2-benzothiopyran-3-carbothioamid 137a	260
4.15.3.7	<i>N</i> -[(1 <i>S</i>)-1-Cyclohexylethyl]-4-oxo-3,4-dihydro-1 <i>H</i> -2-benzothiopyran-3-carbothioamid 137b	261
4.15.3.8	<i>N</i> -[(1 <i>R</i>)-1-Cyclohexylethyl]-3-methyl-4-oxo-3,4-dihydro-1 <i>H</i> -2-benzothiopyran-3-carbothioamid 138a	262
4.15.3.9	<i>N</i> -[(1 <i>S</i>)-1-Cyclohexylethyl]-3-methyl-4-oxo-3,4-dihydro-1 <i>H</i> -2-benzothiopyran-3-carbothioamid 138b	263
4.15.3.10	2-([(1-[(1 <i>R</i>)-1-Cyclohexylethyl]carbamothioyl)ethyl]sulfanyl)methyl}benzoesäure 139b	266

4.15.3.11	2-[[[(1S)-1-Cyclohexylethyl]carbamoithiyl]ethyl)sulfanyl]methyl]benzoesäure 139c	267
4.15.3.12	<i>N</i> -Ethyl-5,7-dimethoxy-4-oxo-3,4-dihydro-1 <i>H</i> -2-benzothiopyran-3-carbothioamid 140a	268
4.15.3.13	<i>N</i> -Ethyl-5,7-dimethoxy-3-methyl-4-oxo-3,4-dihydro-1 <i>H</i> -2-benzothiopyran-3-carbothioamid 140b	269
4.15.3.14	<i>N</i> -Propyl-5,7-dimethoxy-3-methyl-4-oxo-3,4-dihydro-1 <i>H</i> -2-benzothiopyran-3-carbothioamid 140c	270
4.15.3.15	<i>N</i> - <i>tert.</i> -Butyl-5,7-dimethoxy-3-methyl-4-oxo-3,4-dihydro-1 <i>H</i> -2-benzothiopyran-3-carbothioamid 140d	271
4.15.3.16	(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-5-Methyl-2-(propan-2-yl)cyclohexyl-3-methyl-4-oxo-3,4-dihydro-1 <i>H</i> -2-benzothiopyran-3-carboxylat 142	272
5.	Literaturverzeichnis	273
6.	Abkürzungsverzeichnis	279
7.	Anhang	282

1. Einleitung

1.1 Die Zellmembran

Die Zellmembran grenzt den Inhalt einer lebenden eukaryotischen als auch prokaryotischen Zelle von seiner Umgebung ab, besitzt aber gleichzeitig eine Vielzahl verschiedener gerichteter wie auch ungerichteter Transportsysteme, um Substanzen selektiv zwischen Zellinhalt und dieser Umgebung zu transferieren. Diese Membran ist aufgrund ihres unpolaren Inneren eine natürliche Barriere gegenüber Ionen und größeren polaren Verbindungen. Kleine Moleküle können die Membran selbst für den Fall, dass sie polar sind wie etwa Wasser, passieren. Es besteht also ein kontinuierlicher Austausch von Wasser und auch Moleküle wie Kohlendioxid und Sauerstoff können direkt durch die Membran von der Zelle abgegeben oder aufgenommen werden. Aufgrund dieser Eigenschaften zählen Zellmembranen zu den semipermeablen Membranen.

Die Zellmembran kann aus verschiedenen amphipathischen Membranlipiden, wie Phospholipiden, Glykolipiden und Cholesterin gebildet werden. Am Beispiel der Phospholipide wird die Struktur kurz verdeutlicht: Diese verfügen über ein hydrophiles Ende („Kopf“) und lange lipophile Seitenketten („Schwanz“). Der lipophile Teil besteht aus zwei Fettsäureresten, die mit Glycerin verestert sind. Eine Phosphatidylcholingruppe bildet den hydrophilen Kopf des Lipids und ist an der letzten der drei Alkoholfunktionen des Glycerins gebunden. Diese Lipide lagern sich zu einer dynamischen Doppelschicht zusammen, indem sich die hydrophoben Ketten aneinander anlagern und die hydrophilen Enden auf der Oberfläche dieser Schicht liegen. Die polaren Köpfe befinden sich sowohl auf der Seite zum Zellinneren als auch auf der Seite zur Zellumgebung.^[1]

Abbildung 1-1: Schematischer Aufbau einer typischen Zellmembran und deren Bestandteile^[2]

Eingebettet in die Zellmembran befinden sich verschiedene Membranproteine, die nicht an einer festen Position gebunden sind, sondern als in der Membran schwimmend betrachtet werden können (Flüssig-Mosaik-Modell).^[3] Ebenso kann man Zellmembranen als eine zweidimensionale Lösung aus globulären, gerichteten Proteinen und aus Lipiden betrachten.

Der Transport von Substanzen durch die Zellmembran hindurch verläuft einerseits über passive andererseits über aktive Transportvorgänge. Der passive Transport verläuft unter Ausnutzung eines Konzentrationsgradienten, der Diffusion und Osmose der Moleküle durch die Membran ermöglicht. Für den aktiven Transport, also auch einen entgegen des Konzentrationsgradienten, werden Membrantransportproteine benötigt, die dazu Energie aus der Hydrolyse von Adenosintriphosphat (ATP) verwenden. Der Transport ist in einem gewissen Ausmaß reversibel und kann zum Aufbau von ATP genutzt werden (Atmungskettenphosphorylierung).^[4] Transportproteine können in zwei verschiedene Gruppen unterteilt werden: Carrier-Proteine und Kanal-Proteine. Erstere können Stoffe aktiv transportieren oder auch den passiven Transport erleichtern. Letztere sind in Plasmamembranen hauptsächlich Ionenkanäle, die gezielt geöffnet oder geschlossen werden können und allein für den passiven Transport zuständig sind. In manchen Zellkompartimenten (z. B. Mitochondrien) kommen allerdings auch andere Kanäle vor (z. B. Porine).^[5]

1.2 Ionentransport

Der Transport von Ionen kann über Ionenpumpen ablaufen, die diese unter Energieaufwand entgegen eines bestehenden Konzentrationsgradienten aktiv transportieren. Das bioelektrische Membranpotential z. B. der Nerven beruht auf einer unterschiedlichen Verteilung von Natrium- und Kalium-Ionen. Durch eine hohe Konzentration von Kalium-Ionen im Zellinneren und eines Überwiegens von Natrium-Ionen in der Zellumgebung bildet sich ein Normalpotential von etwa -60 mV aus. Dieses Potential wird durch die Natrium-Kalium-Ionenpumpe aufrechterhalten, indem diese Natrium-Ionen aus dem Zellinneren nach außen pumpt.^[4]

Ionenkanäle dagegen sind aus Proteinen aufgebaute Poren innerhalb einer Membran, die verschiedene Ionen selektiv passieren lassen und über Konformationsänderungen dieser Proteine geöffnet und geschlossen werden können. Unterschieden werden diese Kanäle über die Ionenselektivität und über die Regulationsmechanismen, die das Öffnen und Schließen des Kanals steuern. Über die Ionenselektivitäten werden Kanäle über die Art des transportierten Ions klassifiziert. Hauptsächlich handelt es sich dabei um Calcium-, Chlorid-, Kalium- und Natrium-Kanäle. Zu den Regulationsmechanismen zählen beispielsweise potentialabhängige, calciumionenabhängige, mechanisch aktivierte, G-Proteingekoppelte und ligandgesteuerte Ionenkanäle, zu denen unter anderem der ATP-sensitive Kaliumkanal (K_{ATP} -Kanal) gehört.^[1,10]

Allen Ionenkanälen gemein sind drei am Schema eines Kaliumkanals aufgezeigte wichtige Eigenschaften:

- 1.) Sie leiten bestimmte Ionen mit hohen Geschwindigkeiten. Beispielsweise leitet ein Kaliumkanal zwischen 10^7 und 10^8 Kalium-Ionen pro Sekunde.
- 2.) Sie sind selektiv bezüglich der verschiedenen Ionen. Ein Kaliumkanal leitet Natrium praktisch nicht. Als Beispiel sind die relativen Größen der Kalium- und Natrium-Ionen in Abb. 1-2 dargestellt.
- 3.) Die Leitung der Ionen wird über das Öffnen und Schließen einer Art „Tor“ (Gate) ein- bzw. ausgeschaltet. Die Konformationsänderungen

beim Gating-Prozess können durch einen äußeren Stimulus wie die Bindung eines Liganden oder durch die Membranspannung ausgelöst werden.

Abbildung 1-2: Schematische Darstellung eines Kaliumkanals und dessen Selektivität^[6]

1.3 Kaliumkanäle

Kaliumkanäle bilden die größte Gruppe unter den Ionenkanälen und besitzen zugleich die größte Diversität. Aufgrund der Tatsache, dass sie in fast jeder erregbaren Zelle vorkommen und für das Überleben dieser Zellen essentiell sind, werden sie schon seit langer Zeit von vielen Forschergruppen analysiert und charakterisiert. Unter anderem werden durch diese Kanäle physiologische Prozesse gesteuert wie die Regulation des Herzens, die Insulinausschüttung im Pankreas und die Kontraktion und Erschlaffung der glatten arteriellen Muskulatur.

Die erste Einteilung der Kaliumkanäle in drei Gruppen erfolgt aufgrund der Anzahl der transmembranären Domänen (TMD) und der Anzahl der Poren, die den Kanal bilden:

Tabelle 1-1: Klassifizierung der Kaliumkanal-Familien nach der Anzahl transmembranärer Domänen (TMD)^[8]

Familie	Anzahl der TMD	Anzahl der Poren
Spannungsgesteuerte Kaliumkanäle (K_v)	6	1
Zwei-Poren-Kanäle	4	2
Einwärtsgerichtete Kaliumkanäle (K_{ir})	2	1

Von den spannungsgesteuerten Kaliumkanälen (K_v) sind bei Säugetieren 6 verschiedene Unterfamilien bekannt, wobei nicht alle Kanäle genau zugeordnet sind. Sie alle öffnen und schließen sich in Abhängigkeit vom Membranpotential. Beispielsweise hilft die Aktivierung dieser Kanäle, die durch Depolarisation der Zellmembran erfolgt, bei der Repolarisation während des Aktionspotentials einer Nervenzelle. Die entsprechenden Gensequenzen wurden in Zellen von Mäusen, Ratten oder menschlichen Zellen nachgewiesen.^[9]

Tabelle 1-2: Unterfamilien der spannungsgesteuerten Kaliumkanäle (K_v)

Unterfamilie	Kanal (Standardname des Human Gene Mapping Workshop HGMW)	Anzahl verschiedener Kanäle
Shaker	$K_v1.x$ (KCNAx)	7
Shab	$K_v2.x$ (KCNBx)	2
Shaw	$K_v3.x$ (KCNCx)	4
Shal	$K_v4.x$ (KCNDx)	3
Unterfamilie 5	$K_v5.x$ (KCNFx)	1
Unterfamilie 6	$K_v6.x$ (KCNGx)	1

Zwei-Poren-Kanäle (twin-pore-channels, K_{2P}) sind ebenso wie andere Kanäle weit verbreitet und kommen sowohl in erregbaren wie auch nicht erregbaren Zellen vor. Diese besitzen vier Transmembransegmente und sind als Dimere aktiv. Sie produzieren ungewöhnliche Ströme, sind bei jedem Membranpotential aktiv und sind unempfindlich gegenüber gängigen, klassischen Kaliumkanalblockern. Wahrscheinlich spielt diese Art von Kanälen eine Hauptrolle bei der Regulierung des Membranpotentials verschiedenster Zelltypen. Bisher sind bei den Zwei-Poren-Kanälen mehrere verschiedene Unterfamilien beschrieben worden, deren Einteilung in der folgenden Tabelle dargestellt ist.^[10]

Tabelle 1-3: Unterfamilien der Zwei-Poren-Kanäle

Unterfamilie	Standardname des Human Gene Mapping Workshop HGMW	Anzahl verschiedener Kanäle
TWIK-x	KCNK1 bzw. KCNK6	2
TASK-x	KCNK3 bzw. KCNK5	2
TREK-x	KCNK2	1
TRAAK	KCNK4	1
KCNK7	KCNK7	1

Für diese Arbeit liegt das Augenmerk auf den einwärtsgerichteten Kaliumkanälen (K_{ir}), von denen bisher 7 verschiedene Unterfamilien inklusive ihrer jeweiligen physiologischen Funktion beschrieben wurden und in der folgenden Tabelle kurz dargestellt werden.^[11]

Tabelle 1-4: Unterfamilien der einwärtsgerichteten Kaliumkanäle (K_{ir})

Unterfamilie (alternative Nomenklatur)	Anzahl verschiedener Kanäle	Funktion
$K_{ir1.x}$ (ROMKx)	1	Kaliumsekretion in den Nieren und Stabilisierung des physiologischen Kaliumkreislaufs (K^+ -recycling)
$K_{ir2.x}$ (IRKx)	4	Aufrechterhaltung des Ruhemembranpotentials, Repolarisation des kardialen Aktionspotentials und Modulation der Zellerregbarkeit
$K_{ir3.x}$ (GIRKx)	4	Rezeptorabhängige Hyperpolarisation des Membranpotentials, Modulation der Herzfrequenz und Reizleitung der Neuronen
$K_{ir4.x}$ (BIRK-1 bzw. IRKK)	2	Stabilisierung des Kaliumgleichgewichts in Gliazellen des zentralen Nervensystems, des Innenohrs und der Nieren ($K_{ir4.1}$)
$K_{ir5.x}$ (BIR 9)	1	pH-Wertbestimmung
$K_{ir6.x}$ (uKATP-1 bzw. BIR) (K_{ATP})	2	Regulierung des Tonus vaskulärer glatter Muskulatur ($K_{ir6.1}$); Regulierung der Insulinausschüttung in pankreatischen β -Zellen, Sauerstoff- und Glucose-Detektor und Zellprotektion bei Ischämie im Gehirn
$K_{ir7.x}$	1	Beitrag zum Ruhemembranpotential von Neuronen und Epithelzellen, transepithaler Kaliumtransport, Kaliumausscheidung

1.3.1 ATP-abhängige Kaliumkanäle (K_{ATP})

Die Unterfamilie $K_{ir6.x}$ besteht aus ATP-abhängigen Kaliumkanälen. Diese befinden sich, wie schon in Tabelle 1-4 gezeigt wurde, in verschiedensten Gewebearten, nämlich in der glatten Muskulatur, in den β -Zellen des Pankreas, in der Herzmuskulatur, in der Skelettmuskulatur und in verschiedenen Nervenzellen z. B.

des Hypothalamus. Der Vorgang des Öffnens und Schließens wird über die ATP- und die ADP-Konzentration in der lebendigen Zelle gesteuert. Der Kanal steuert den Fluss der Kalium-Ionen durch die Zellmembran und damit das Membranpotential. Dies bedeutet, dass der metabolische Zustand der Zelle direkt mit dem Membranpotential und der Erregbarkeit der Membran verbunden ist.^[12]

Abbildung 1-3: Proteinkomplex eines K_{ATP} -Kanals (SUR1/ $K_{ir6.2}$)^[13]

Diese Art der Kaliumkanäle ist aus zwei Proteinuntereinheiten aufgebaut, nämlich aus der Rezeptoreinheit SUR (Sulfonylurea Receptor, Sulfonylharnstoff-Rezeptor), die für die Regulation des Kanals zuständig ist und zur Klasse der ABC-Proteine (ATP binding cassette) gehört und aus der eigentlichen Kaliumkanaleinheit $K_{ir6.x}$, an der die Unterscheidung und Selektivität zwischen den verschiedenen Ionen stattfindet. Die Kaliumkanaleinheit kommt in dieser Unterfamilie der Kaliumkanäle in zwei Varianten vor ($K_{ir6.1}$ und $K_{ir6.2}$) und ist für die gewebespezifischen Eigenschaften des Kanals zuständig, während die Rezeptoreinheit drei verschiedene Arten aufweist (SUR1, SUR2A und SUR2B). Die verschiedenen Kombinationen der Einheiten kommen in unterschiedlichen Zellarten vor: SUR1/ $K_{ir6.2}$ in pankreatischen β -Zellen, SUR2A/ $K_{ir6.2}$ in kardialen Zellen und SUR2B/ $K_{ir6.1}$ in vaskulären glatten Muskelzellen. Beide Untereinheiten sind aneinander aggregiert und werden von jeweils vier einzelnen Proteinsegmenten gebildet, was bedeutet, dass der komplette Kaliumkanal inklusive Rezeptoreinheit aus einem Proteinkomplex besteht (s. Abb. 1-3).

Abbildung 1-4: Hypothetische Darstellung eines kardialen K_{ATP} -Kanals (SUR2A/ $K_{ir6.2}$)^[15]

In Abbildung 1-4 sind die einzelnen Segmente eines repräsentativen Kaliumkanals dargestellt. Das SUR2A-Protein besteht aus 1549 Aminosäuren und verfügt über drei transmembranäre Domänen (TMD, transmembrane domains), die insgesamt 17 transmembranäre Helices aufweisen. Zwischen TMD1 und TMD2 sowie zwischen TMD2 und C-Terminus befindet sich jeweils eine Nukleotid-Bindungsstelle (NBD, nucleotide binding domain), die sich beide auf der intrazellulären Seite der Membran befinden und ATP binden können. Das K_{ir} -Protein besteht aus einer Sequenz aus 390 Aminosäuren mit zwei transmembranären Helices (M1 und M2) und einer intrazellulär gelegenen ATP-Bindungsstelle. In der Abbildung ist gut zu erkennen, wie sich die einzelnen Proteine zu einem kompletten Kaliumkanal zusammensetzen lassen.

1.3.2 K_{ATP} -Kanal regulierende Substanzen

Aufgrund der Tatsache, dass K_{ATP} -Kanäle vielseitige Funktionen übernehmen, stellen sie ein attraktives Ziel für pharmakologisch aktive Wirkstoffe dar. In der Geschichte dieses Forschungsgebietes wurden nicht nur Antagonisten (Kaliumkanalblocker) untersucht, wie beispielsweise die bei Diabetes eingesetzten Sulfonylharnstoffe (z. B. Glibenclamid **1** (Abb. 1-5)), von denen sich der Name der Rezeptoreinheit ableitet - sie ermöglichen eine erhöhte Insulinfreisetzung durch das Schließen des SUR1/ $K_{ir}6.2$ - sondern ebenfalls Agonisten, die Kaliumkanalöffner (KCOs), da sie sich als gutes Werkzeug zur Regulierung der Erregbarkeit verschiedener Zellen eignen und das Hauptaugenmerk der Forschung auf dieser Eigenschaft liegt. Einige Anwendungsgebiete für KCOs sind beispielsweise Bluthochdruck, Asthma, Inkontinenz und kardiale Ischämie.

Abbildung 1-5: Gebräuchliche Kaliumkanalblocker mit Sulfonylharnstoff-Struktur (Glibenclamid **1**^[15], Tolbutamid **2**^[16]) bzw. Glinid-Struktur (Repaglinid **3**^[17])

Der bekannteste Vertreter aus der Gruppe der Kaliumkanalöffner ist wohl das Diazoxid **4**, das zwar eine hohe Affinität, aber nur eine geringe Selektivität zwischen SUR1 und SUR2 aufweist. Daher wird dieser Wirkstoff eingesetzt, um über die Aktivierung des Kaliumkanals in der pankreatischen β -Zelle (SUR1) die

Insulinausschüttung zu senken oder ganz zu unterbinden. Auf diese Weise ist eine Therapie der Symptome der Krankheit PHHI (Persistent Hyperinsulinaemic Hypoglycaemia of Infancy) möglich, bei der es sich um einen angeborenen Gendefekt am K_{ATP} -Kanal handelt, der aufgrund dessen ständig geschlossen bleibt. In der Folge kommt es zu einer unkontrollierten, stetigen Insulinfreisetzung, die zu einer dauerhaften Hypoglykämie führen kann. Andererseits kann Diazoxid **4** zur Behandlung einer arteriellen Hypertonie oder zur Vorbeugung eines Myokardinfarktes eingesetzt werden. Das Öffnen der entsprechenden K_{ATP} -Kanäle (SUR2) führt dabei zu einer Relaxation der glatten Gefäßmuskulatur, wodurch der Innendruck sinkt.^[18]

Abbildung 1-6: Kaliumkanalöffner mit Benzothiadiazin-S,S-dioxid-Grundstruktur (Diazoxid **4**^[19], BPDZ73 **5**, BPDZ44 **6**^[20], NNC-55,0462 **7**^[21])

Obwohl eine Vielzahl verschiedener Substanzen synthetisiert wurde, basieren die meisten KCOs jedoch auf nur drei unterschiedlichen Grundgerüsten: Thiadiazin-S,S-dioxide (z. B. Diazoxid **4**, s. Abb. 1-6), Cyanoguanidine (z. B. Pinacidil **8**, s. Abb. 1-7) und Benzopyrane (z. B. *lev*-Cromakalim **9**, Bimakalim **10**, KC-399 **11**, s. Abb. 1-8).

Abbildung 1-7: Pinacidil **8** als Beispiel für einen KCO mit Cyanoguanidin-Struktur^[22]

Einige Vertreter der Benzopyrane, deren Stammsubstanz das Bimakalim **10** darstellt, erreichen durch die Kombination der Grundstruktur mit Cyanoguanidin-Resten am SUR2B (Aortazellen) Wirkungen im nanomolaren Bereich^[23].

Abbildung 1-8: Kaliumkanalöffner mit Benzopyran-Grundstruktur (*lev*-Cromakalim **9**, Bimakalim **10**^[24], KC-399 **11**^[25]) und das Analog mit Benzothiazin-Grundstruktur **12**

Eine weitaus höhere Affinität am SUR2B stellt sich ein, wenn bereits hochaffine Benzopyrane über ein Thioamid-Pharmakophor^[14] verfügen. Auf diese Weise können Wirksamkeiten bis in den subnanomolaren Konzentrationsbereich erzielt werden. Als Beispiel für eine solche Substanz sei hier KC-399 **11** genannt (s. Abb. 1-8). Innerhalb der Substanzklasse der 1,4-Benzothiazine wie an Verbindung **12** ($p_{EC50} = 12.13$)^[26] exemplarisch gezeigt, finden sich die höchsten bislang erzielten Affinitäten.

Trotz der großen Fortschritte in Hinsicht auf die Affinität, die mit den Benzopyranen und Benzothiazinen gemacht wurden, bleibt die Entwicklung von Wirkstoffen mit hoher Affinität bei gleichzeitiger Gewebespezifität die größte Herausforderung. Um dies zu erreichen, wurden im Zuge dieses Forschungsprojektes als KCOs nicht betrachtete heterocyclische Verbindungen wie Benzofurane, Benzothiazole, Benzothiophene, Benzodithiepine und Isothiochromanone mit dem bekannten Thioamid-Pharmakophor^[14] kombiniert. Außerdem wurde der Standard-KCO Diazoxid **4** an der 3-Position derivatisiert, um die Affinität und die Selektivität signifikant zu steigern.

Um die Selektivität zu maximieren, wird der Umstand genutzt, dass die Proteinsegmente der Rezeptoreinheiten SUR1 und SUR2 nur eine Homologie von etwa 79 % aufweisen. Schwieriger gestaltet sich die Maximierung der Selektivität

zwischen SUR2A und SUR2B, da die Homologie hier bei 99 % liegt und sich diese beiden Rezeptoreinheiten nur in den 28 C-terminalen Aminosäuren hinter der Nucleotid-Bindungsstelle 2 (NBD2) unterscheiden. Dort findet vermutlich die Regulierung der ATP-Besetzung am NBD2 und damit die Aktivierung des K_{ATP} -Kanals statt.^[18]

1.4 Zielsetzung

Das Ziel dieser Arbeit liegt darin, effiziente und selektive Kaliumkanalöffner mit neuen Grundstrukturen zu synthetisieren und in einer Kooperation mit Prof. H. Lemoine am Institut für Lasermedizin der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf auf ihre jeweilige Wirksamkeit zu untersuchen. Dazu sollen als erstes Teilgebiet Derivatisierungen am Diazoxid **4** an der 3-Position vorgenommen werden, um die Ergebnisse aus früheren Arbeiten^[5] zu vervollständigen, bei denen bereits verschiedene Substituenten an der 3-, 5- und der 7-Position im Benzothiadiazin-Grundgerüst eingeführt wurden. Dabei hatten sich bereits Hinweise darauf ergeben, dass die Variation der Substituenten in der 7-Position eine Aktivitätssteigerung bewirkte. Diese Untersuchungen sollen nun im ersten Teil der vorliegenden Arbeit systematisch am Diazoxid **4** vorgenommen werden, wozu eine Reihe modifizierter Diazoxid-Derivate synthetisiert werden soll. Die Überlegung zwei SUR-Einheiten mit nur einem Wirkstoffmolekül zu besetzen, führt zum Konzept verbrückter Diazoxid-Derivate, was parallel in einer Bachelor-Arbeit realisiert wurde.^[27]

Ferner soll das Konzept von neuartigen Kaliumkanalöffnern auf der Basis benzanellierter heterocyclischer Fünfringe mit Thioamid-Substituenten, was sich in Vorgängerarbeiten^[5, 7] als vielversprechend gezeigt hatte, auf den Einbau von Spacergruppen zwischen Heteroaromat und Carbothioamid-Funktion ausgeweitet werden.

Um den Einfluss der Ringgröße des Heteroaromaten auf die Affinität an Kaliumkanälen festzustellen, sollen des Weiteren Carbothioamide mit Benzodithiepin- sowie Thio- und Isothiochromanon-Gerüsten synthetisiert und ebenfalls auf ihre Wirksamkeit als Kaliumkanalöffner untersucht werden. Ein Teil der entsprechenden Synthesen erfolgte im Rahmen begleitender Bachelor-Arbeiten.^[28-30]

Die Affinität der synthetisierten Substanzen an den unterschiedlichen Kaliumkanälen soll zeitnah zu den Synthesen im Institut für Lasermedizin der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf von Prof. Dr. H. Lemoine und seinen Mitarbeitern untersucht werden.

2. Hauptteil

2.1 Diazoxide

2.1.1 Kondensation zu den einkernigen Diazoxid-Derivaten mit aliphatischen Substituenten in der 3-Position

In einer früheren Dissertation^[5] des Arbeitskreises wurde bereits über die effizienteste Methode zur Synthese verschiedener Diazoxide berichtet. Dort wurde dargelegt, dass eine nachträgliche Derivatisierung über das Anion der 3-Methylgruppe des Diazoxids **4** nicht möglich ist. Erstrebenswert ist die Variation der jeweiligen Substituenten an der 3-Position deshalb, da sich abzeichnete, dass die zu erwartenden Affinitäten und Selektivitäten der entstehenden Diazoxid-Derivate jene des Diazoxids **4** um einiges übersteigen würden. Besonders affine Diazoxid-Derivate beinhalten in der 3-Position zwar eine Aminoalkylgruppe, wurden allerdings schon ausführlich betrachtet^[31, 32], während der Bereich der reinen Alkyl-, Aryl- und Hetaryl-Substituenten doch erhebliche Lücken aufweist. Bei den Synthesen in dieser Arbeit wird am Chlorsubstituenten in der 7-Position festgehalten, da dieser für die Wirksamkeit der Substanzen von immenser Wichtigkeit zu sein scheint. Bestimmt durch die Verfügbarkeit der Edukte, die Reaktionsdauer, den Ausbeuteerwartungen und die Handhabbarkeit wurde die Syntheseroute von Imai^[33] gewählt. Hierbei findet eine Kondensation von 2-Aminobenzolsulfonamid **13** mit einer Carbonsäure statt, bei der der Polyphosphorsäuretrimethylsilylester (PPSE) die Abspaltung von Wasser begünstigt. Auf diese Weise wurden die in Schema 2-1 abgebildeten Verbindungen **15a-n** synthetisiert, lediglich die Kondensation mit *exo*-Norboman-2-carbonsäure **14i** und Hexinsäure **14n** gelang nicht. Bei der Kondensation mit **14k** erfolgte eine anschließende Eliminierung von Methanol zum Diazoxid-Derivat **15k**.

Schema 2-1: Synthese der in 3-Position aliphatisch substituierten Diazoxide **15a-n** und deren Ausbeuten

2.1.2 Kondensation zu den einkernigen Diazoxid-Derivaten mit heteroaliphatischen Substituenten in der 3-Position

Um die Frage zu beantworten, welche Auswirkungen Heteroatome in aliphatischen Resten haben, wurden die Verbindungen **17a-d** analog zu dem in Kapitel 2.1.1 beschriebenen Syntheseweg hergestellt (s. Schema 2-2), wobei die Synthese mit 3-(Methylsulfanyl)propionsäure **16a** und mit *L*-Prolin **16b** misslang.

Schema 2-2: Synthese der in 3-Position heteroaliphatisch substituierten Diazoxide **17a-d** und deren Ausbeuten

2.1.3 Kondensation zu den einkernigen Diazoxid-Derivaten mit aromatischen und heteroaromatischen Substituenten in der 3-Position

Da aromatische Substituenten das π -Elektronensystem der Grundstruktur des Diazoxids vergrößern und damit die elektronischen Eigenschaften der Verbindung beeinflussen, wurden diese ebenfalls untersucht. Außerdem haben sie Auswirkungen auf die Molekülgeometrie und deren Rigidität, was Rückschlüsse auf die Koordination zwischen Wirkstoffmolekül und Rezeptereinheit zulässt (vgl. Schlüssel-Schloss-Prinzip nach E. Fischer^[34] bzw. Induced-fit-Konzept^[35]). Da Carborane ähnliche Größen wie Phenylringe aufweisen und das Konzept des Austauschs der beiden Substituenten bei Acetylsalicylsäure bekannt ist (Asborin^[36] als Analogon zu Aspirin), wurde versucht, den Phenylsubstituenten formal durch einen *ortho*-Carboranylrest zu ersetzen und dessen Auswirkungen auf die Affinität und Selektivität zu untersuchen. Auch hier wurde der bereits in Kapitel 2.1.1 erwähnte Syntheseweg gewählt; allerdings gelang die Synthese der Verbindungen **19d**, **19j-m** und **19s** nicht. Das nachstehende Schema 2-3 gibt einen Überblick über die synthetisierten Substanzen.

Schema 2-3: Synthese der in 3-Position aromatisch substituierten Diazoxide **19a-r** und des phenylähnlich substituierten 3-Carboranyl-Diazoxids **19s** und deren Ausbeuten

2.1.4 Syntheseveruche der Vorstufen des *ortho*-Carboran-substituierten Diazoxids

Die *ortho*-Carborancarbonsäure **18s**, die kommerziell nicht erhältlich war, wurde ausgehend vom *ortho*-Carboran **20** selbst hergestellt. Hierzu wurde der Syntheseweg von Kasar^[37] gewählt, der über einen nucleophilen Angriff des Anions des Carborans an festem Kohlenstoffdioxid verläuft. Diese Reaktion verläuft glatt mit hohen Ausbeuten.

Schema 2-4: Carboxylierung des *ortho*-Carborans **20**

Wie in Kapitel 2.1.3 beschrieben misslang die direkte Synthese des Carboran-substituierten Diazoxids **19s** aus der Carbonsäure **18s**. Daher wurde versucht, diese durch Thionylchlorid in das entsprechende Säurechlorid **21** umzuwandeln, um dessen Reaktivität bei der Umsetzung mit dem Sulfonamid **13** zu steigern. Die an die Publikation von Endo^[38] angelehnte Synthese misslang, vermutlich, da das entstandene Produkt bei der Reinigung zerfiel. Eine erneute direkte Umsetzung des Rohproduktes mit dem Sulfonamid **13** wurde nicht mehr unternommen, da eine neue Forschungsrichtung eingeschlagen wurde.

Schema 2-5: Reaktion zum Säurechlorid des *ortho*-Carborans

2.1.5 Versuch der Thioamidierung des Diazoxid-Derivats **15b**

Das Interesse an der Frage, ob sich die beiden Wirkstoffklassen der Diazoxide und die der Thioamide verbinden lassen, um die Auswirkungen auf die Affinität zu untersuchen, führte zu dem in Schema 2-6 aufgeführten Versuch. Dabei sollte die acideste Stelle, der Stickstoff in der 4-Position, mit Natriumhydrid deprotoniert und mit Ethylisothiocyanat umgesetzt werden. Die Wahl der Base hat den Vorteil, dass der entstehende molekulare Wasserstoff dem Gleichgewicht entzogen wird. Die Synthese schlug allerdings fehl und wurde auch nicht weitergehend verfolgt.

Schema 2-6: Versuch der Synthese des thioamidierten 3-(Cyclohexylmethyl)diazoxids **22**

2.1.6 Zweikernige Diazoxid-Derivate

Die vier SUR-Einheiten eines K_{ATP} -Kanals müssen alle gleichzeitig durch ein Wirkstoffmolekül besetzt sein, damit dieser geöffnet wird. Diese Überlegung führte dazu, dass in dieser Arbeit ebenfalls Substanzen hergestellt wurden, die über zwei miteinander verbrückte Diazoxid-Grundgerüste verfügen. Wird die Brücke zwischen diesen beiden Kernen passend gewählt, ist es denkbar, dass durch ein Molekül zwei SUR-Einheiten besetzt werden und der gebildete Komplex sich wie ein Chelat-Komplex verhält, also eine deutlich höhere Stabilität aufweist. Ein großes Problem dieser Methode stellt die geringe Löslichkeit des Wirkstoffes in Wasser dar, die für die physiologischen Untersuchungen essentiell ist. Um die schlechte Löslichkeit der Verbindungen **29a-d** und der verbrückten Diazoxide von A. Götzinger^[27] zu verbessern, wurde versucht, die aliphatischen und aromatischen Brücken durch Brücken aus Glykoleinheiten zu ersetzen. Das Konzept der verbrückten zweikernigen Diazoxide wurde zeitgleich von A. Götzinger in unserem Arbeitskreis fortgeführt, in der das Hauptaugenmerk auf der Variation der Länge der aliphatischen Brücke lag.

2.1.6.1 Synthesversuche der Brücke aus Glykoleinheiten

Da die entsprechenden Dicarbonsäuren der Polyethylenglykole nicht kommerziell erhältlich sind, wurde zunächst das längste erhältliche Polyethylenglykol mit definierter Länge, Hexaethylenglykol **23**, analog zum Syntheseweg von Harrison und Diehl^[39] bromiert. Diese Reaktion lief mit einer guten Ausbeute von 86 % ab.

Schema 2-7: Bromierung von Hexaethylenglykol **23**

Anschließend wurde versucht, im Sinne einer Kolbe-Nitrilsynthese den Bromsubstituenten durch Cyanid zu ersetzen.^[40] Das gewünschte Dinitril **25** wurde dabei aber nicht gebildet. Auch die eventuell gebildete Dicarbonsäure konnte nicht nachgewiesen werden.

Schema 2-8: Kolbe-Nitrilsynthese mit 1,17-Dibromhexaethylenglykol **24**

Um dennoch ein zweikerniges Diazoxid-Derivat mit einer hydrophileren Brücke in Form eines Ethers zu synthetisieren, wurde das kommerziell erhältliche 3-(2-Cyanoethoxy)propanitril **26**, also eine formal aus zwei Ethylenglykoleinheiten aufgebaute Verbindung, einer Verseifung mit konzentrierter Salzsäure unterworfen. Dabei konnte die entstehende Dicarbonsäure **27** mit einer Ausbeute von 46 % erhalten werden.

Schema 2-9: Nitrilverseifung zur Dicarbonsäure **27**

2.1.6.2 Kondensation zu den über die 3-Position des Grundgerüsts verknüpften zweikernigen Diazoxid-Derivaten

Die anschließende Kondensation der Dicarbonsäuren **28a-f** mit dem Sulfonamid **13** erfolgte erneut nach obiger Synthesemethode (s. Kapitel 2.1.1) mit dem Unterschied, dass hier zwei Äquivalente des Sulfonamids nötig sind. Die Dicarbonsäure **27** wurde in der Arbeit von A. Götzinger^[27] mit dem Sulfonamid **13** umgesetzt und wird nur der Vollständigkeit halber mit aufgeführt, während der Umsatz der Dicarbonsäure **28f** in beiden Arbeiten untersucht wurde. In Schema 2-10 sind die hergestellten Verbindungen mitsamt ihrer Ausbeuten aufgeführt.

Schema 2-10: Synthese der in der 3-Position verbrückten zweikernigen Diazoxide

2.2 Benzoxazole

Die Thioamide auf Benzoxazol-Basis stellen nur einen äußerst kleinen Teil in dieser Arbeit dar, da sich deren Synthese bereits früher als wenig erfolgreich zeigte und daher nur nebenbei behandelt wurden.^[7] Diese Verbindungen sind deswegen interessant, weil sie das Sauerstoff-Analogon zu den Benzothiazol-basierten Thioamiden darstellen. Daher wurde auch hier das Konzept der Spacer-Gruppe der Benzothiazole (s. Kapitel 2.3) angewendet. Die direkte Lithierung von 2-Methylbenzoxazol **30** ist zwar prinzipiell möglich und auch die Umsetzung mit einem Isothiocyanat **31a** und **31b** läuft in gewissem Maße ab, allerdings gestaltet sich die Isolierung schwierig, da kein getestetes Laufmittel eine ausreichende Trennleistung bei der Säulenchromatographie hervorbrachte. Eine Destillation scheidet aufgrund der hohen thermischen Belastung für das Thioamid aus und eine Umkristallisation scheiterte daran, dass das Rohprodukt ein Öl bildete und das Produkt nicht ausfiel.

Schema 2-11: Syntheseversuch der beiden Benzoxazol-basierten Thioamide **30**

Zusätzlich wurde ein Syntheseversuch eines Thioamids mit einem 1,2-Benzisoxazol-Grundgerüst unternommen. Die Lithiierung erfolgte mit Lithiumdiisopropylamid (LDA), welches *in situ* erzeugt wurde. Dabei wurde jedoch das Additionsprodukt von LDA und Ethylisothiocyanat **31a** gebildet, welches zusammen mit dem Edukt **33** im Rohprodukt aufzufinden war.

Schema 2-12: Syntheseversuch eines 1,2-Benzisoxazol-basierten Thioamids **34**

2.3 Benzothiazole

Wie in der Einleitung in Abb. 1-8 am Benzothiazin **12** gezeigt wurde, weisen diese eine äußerst hohe Bindungsaffinität und agonistische Wirkung auf. In einer Vorgängerarbeit^[5] wurde schon darüber spekuliert, ob eine formale Ringverengung des 1,4-Benzothiazins zum Benzo[*d*]thiazol als Kaliumkanalöffner wirksame Thioamide zulässt. Diese Arbeit führte tatsächlich zu einigen agonistisch wirksamen Thioamiden auf Benzothiazol-Basis.

In dieser Arbeit wird das Konzept dieser Verbindungen wesentlich erweitert und zwar, indem die Flexibilität und die Molekülgeometrie durch den Einbau einer Spacer-Gruppe zwischen dem aromatischen Benzothiazol und der Carbothioamid-Funktion verändert werden. Diese Gruppe besteht aus einer Methylengruppe, die in manchen Fällen einen weiteren Alkylrest wie eine Methyl- oder Ethylgruppe trägt.

Zur Kontrolle, ob es sich bei der Thioamid-Gruppe tatsächlich um das relevante Pharmakophor handelt, wurden analoge Amide synthetisiert. Die Ergebnisse zeigen, dass sowohl die Bindungsaffinität als auch die Wirkung am Kanal deutlich schwächer wird, wenn das Schwefelatom durch ein Sauerstoffatom ersetzt wird.

2.3.1 Alkylsubstituierte Benzothiazole

Der Syntheseweg der in der 2-Position alkylierten Benzothiazole erfolgte über die bekannte Kondensation von 2-Aminothiophenol **36** mit einem Säurechlorid **37a-c** und gelang mit äußerst hohen Aubeuten (s. Schema 2-13).^[41]

R = Methyl (**a**, 94 %), Ethyl (**b**, 98 %), Phenyl (**c**, 96 %)

Schema 2-13: Kondensationsreaktion zu den alkylsubstituierten Benzo[d]thiazolen

Diese Reaktion wurde hinsichtlich ihrer Toleranz einer Trifluormethyl-Gruppe untersucht, da diese bereits bei Thioamiden auf Benzothiazol-Basis ohne Spacer-Gruppe in einer früheren Arbeit^[7] untersucht wurden und somit eine gute weitere Vergleichsmöglichkeit der Bindungsaffinitäten ergeben hätte. Die Synthese von 2-Methyl-5-(trifluormethyl)-1,3-benzothiazol **40** gelang allerdings nicht.

Schema 2-14: Versuch der Synthese von 2-Methyl-5-(trifluormethyl)-1,3-benzothiazol **40**

Stattdessen wird das Edukt **39** vermutlich einfach acyliert. Wird die Reaktion unter Rückfluss durchgeführt, so bildet sich vermehrt das Dimer des Edukts eventuell über eine Oxidationsreaktion zum Disulfid, aber diese Vermutung wurde nicht verifiziert.

Schema 2-15: Hypothetische Reaktionsprodukte der gescheiterten Synthese von Verbindung **40**

2.3.2 Synthese der Thioamide mit Benzothiazol-Grundgerüst

Die Syntheseroute der „gespacerten“ Thioamide erfolgt analog zu der einer früheren Arbeit^[7] ausgehend vom jeweiligen Benzothiazol mit dem entsprechenden Isothiocyanat mit Phenyllithium als Lithierungsreagenz. Der Austausch von Phenyllithium, bei dem keinerlei Umsetzung erfolgte, gegen LDA bei der Synthese der Verbindung **41a** führte nicht zum Erfolg, da dabei eine Kondensation von LDA mit dem Isothiocyanat unter Abspaltung von Chlorwasserstoff stattfand. Die Synthese von **41e** gelang auch bei der Verwendung von *n*-Butyllithium nicht. Diese Verbindung wäre deshalb interessant gewesen, weil das Diazoxid-Derivat mit einem Adamantylrest in der 3-Position eine der höchsten gemessenen Bindungsaffinitäten und die höchste Selektivität in Bezug auf die Wirkung am SUR1 und SUR2B aufweist.

	R ¹		R ²	Verbindung
38d	H	31c	Et-Cl	41a (kein Umsatz)
38d	H	31g	2,6-Difluorphenyl	41b (kein Umsatz)
38a	Me	31a	Et	41c (14 %)
38a	Me	31d	<i>t</i> Bu	41d (58 %)
38a	Me	31e	Ada	41e (kein Umsatz)
38a	Me	31f	Ph	41f (kein Umsatz)
38b	Et	31a	Et	41g (10 %)
38b	Et	31d	<i>t</i> Bu	41h (11 %)

Schema 2-16: Synthese der „gespacerten“ Benzothiazol-basierten Thioamide

Zusätzlich zu den zuvor beschriebenen Verbindungen wurde auch untersucht, ob die Synthese von 2-Methylbenzothiazolen, die in der 5- oder der 6-Position Substituenten tragen, sinnvoll ist. Die Synthese verläuft unter schlechter Ausbeute, da die Edukte kaum umgesetzt wurden. Einige Synthesen könnten eventuell mit einer anderen Base wie Phenyllithium ermöglicht bzw. deren Ausbeuten gesteigert werden. Außerdem wäre unter Umständen eine längere Reaktionszeit der Lithiierung oder des Umsatzes mit dem Isothiocyanat in Betracht zu ziehen.

	X ¹	X ²		R	Verbindung
42a	OMe	H	31a	Et	43a (7 %)
42b	H	OMe	31a	Et	43b (8 %)
42b	H	OMe	31d	<i>t</i> Bu	43c (kein Umsatz)
42c	F	H	31a	Et	43d (kein Umsatz)
42d	Cl	H	31a	Et	43e (kein Umsatz)

Schema 2-17: Synthese der am Aromaten substituierten Benzothiazol-basierten Thioamide **43a-e**

Obwohl schon eine Reihe verschiedener „ungespaceter“ Thioamide auf Benzothiazol-Basis synthetisiert wurden, werden in dieser Arbeit noch einige Vertreter dieser Serie untersucht, um die Auswirkungen unterschiedlicher Substituenten miteinander vergleichen zu können. Der Syntheseweg läuft über eine Lithiierung von Benzothiazol mit *n*-Butyllithium bei -100 °C ab, welches mit dem entsprechenden Isothiocyanat abgefangen wird.^[5]

Die Synthesen der Verbindungen **43c-e** scheiterten am außerordentlich schlechten Umsatz der Edukte, der schon bei der Synthese der Verbindungen **43a** und **43b** zu sehr geringen Ausbeuten geführt hatte. Durch die Wahl einer alternativen Base zur Lithiierung des Edukts könnte die Ausbeute gesteigert bzw. die Synthese der übrigen Verbindungen ermöglicht werden. Denkbar wäre die Verwendung von Phenyllithium analog zu den Synthesen der „gespacerten“ Thioamide (s. Schema 2-16). Die Substituenten am Aromaten könnten allerdings auch die Synthese durch Präkoordination an falscher Stelle durch die Methoxygruppe oder durch Konkurrenzreaktionen erschweren.

	R	Verbindung
31c	Et-Cl	45a (58 %)
31h	Norbornyl	45b (81 %)
31e	Ada	45c (kein Umsatz)
31g	2,6-Difluorphenyl	45d (kein Umsatz)
31i	2,3,5,6-Tetrafluorphenyl	45e (kein Umsatz)
31j	3-Nitrophenyl	45f (89 %)

Schema 2-18: Synthese der „ungespacerten“ Benzothiazol-basierten Thioamide **45a-f**

Zuletzt wurden auf dem Gebiet der Thioamide mit Benzothiazol-Grundgerüst zwei Syntheseveruche durchgeführt, bei denen die Spacerfunktion durch ein Heteroatom erfüllt werden sollte. Bei der gewählten Syntheseroute wird Natriumhydrid als Base eingesetzt, um ein nucleophiles Alkoholat zu erzeugen, welches dann vom elektrophilen Ethylisothiocyanat **31a** abgefangen wird.^[42] Die Synthese der Verbindung **47** scheiterte, da kein Umsatz des Edukts **46** stattfand.

Schema 2-19: Versuch der Thioamidierung von 2-Hydroxybenzo[d]thiazol **46** zu Verbindung **47**

Bei der Synthese der Verbindung **49** kam es hauptsächlich zur Bildung von 2-Hydroxybenzothiazol **46** (1,3-Benzothiazol-2-ol). Die Reaktion kann auch nicht dadurch ermöglicht werden, dass die Deprotonierung für zwei Stunden bei Raumtemperatur durchgeführt wird. In diesem Fall entsteht abermals der Alkohol **46**.

Schema 2-20: Versuch der Thioamidierung des Sulfanylethanol **48** zu Verbindung **49**

2.3.3 Synthese der Benzothiazol-basierten Amide

Zusätzlich zu den zuvor beschriebenen Thioamiden wurden auch zwei Amide hergestellt, die zeigen sollen, dass die Thioamid-Funktion für die Affinität und Wirkung des Wirkstoffes essentiell ist. Dazu wurde prinzipiell derselbe Syntheseweg über das *tert.*-Butylisocyanat **50** wie für die Thioamid-Synthese gewählt, allerdings mit alternativen lithiumorganischen Verbindungen zur Deprotonierung des entsprechenden Benzothiazols.

Schema 2-21: Synthese des Benzothiazol-basierten Amids **51**

Das zweite Amid **52** ist das Analogon zum Thioamid **41d** und bietet damit einen unmittelbaren Vergleich der Affinitäten an den Kaliumkanälen. Die Synthese mit *tert.*-Butyllithium liefert das gewünschte Produkt nur als Nebenprodukt, welches daher nicht isoliert werden konnte.

Schema 2-22: Syntheseversuch des Amids **52**

Alternativ wurde die Synthese ausgehend vom analogen Thioamid **41d** mit Natriummetaperiodat in Anlehnung an die Untersuchungen von Pourali^[43] durchgeführt. Dabei fand allerdings kein Umsatz des Eduktes statt.

Schema 2-23: Syntheseversuch des Amids **52** mit Natriummetaperiodat

Erfolgreich konnte Verbindung **52** über den in Schema 2-21 aufgeführten Syntheseweg hergestellt werden. Dabei konnte das als Nebenprodukt vorliegende gewünschte Amid **52** durch Umkristallisation abgetrennt werden.

Schema 2-24: Synthese des Benzothiazol-basierten Amids **52**

2.4 Benzofurane

Die Stoffklasse der Benzopyrane beinhaltet, wie in der Einleitung gezeigt wurde, hochaffine, agonistisch wirkende Substanzen. Aus diesem Grund wird auch hier darüber spekuliert, ob eine formale Ringverengung zu den Benzofuranen ebenfalls zu potenten Kaliumkanalöffnern führt. Die Benzofurane nehmen in dieser Arbeit aber nur einen kleinen Teil ein. Das Konzept der Spacer-Gruppe wird auch bei der Synthese des Thioamids auf Benzofuran-Basis fortgeführt. Die direkte Lithiierung von 2-Methylbenzofuran und anschließende Umsetzung mit einem Isothiocyanat wurde nicht gewählt, da zum Zeitpunkt der Durchführung das Edukt nicht oder nur äußerst schwer kommerziell erhältlich war. In den folgenden Unterkapiteln werden die beiden verfolgten Synthesestrategien aufgeführt.

2.4.1 Synthese von 2-(1-Benzofuran-2-yl)essigsäure

Einer der beiden Hauptsynthesewege für ein „gespacertes“ Thioamid mit Benzofuran-Grundgerüst verläuft über 2-(1-Benzofuran-2-yl)essigsäure **57**, welche als Schlüsselverbindung anzusehen ist. Zunächst wurde Benzofuran **53** einer Allylierung unterworfen, die mit guter Ausbeute ablief.

Schema 2-25: Synthese von 2-Allylbenzofuran **55**

Als nächstes wurde am 2-Allylbenzofuran **55** eine Ozonolyse-Reaktion durchgeführt, die bei reduzierender Aufarbeitung mit Dimethylsulfid zu 2-(1-Benzofuran-2-yl)acetaldehyd **56** und Formaldehyd führen sollte, aber kein Produkt lieferte.

Schema 2-26: Synthese von 2-(1-Benzofuran-1-yl)acetaldehyd **56**

Da der gewünschte Aldehyd **56** nicht gebildet wurde, wurde die danach durchzuführende Oxidation mit Kaliumpermanganat oder einem Chrom(VI)-Salz direkt vom 2-Allylbenzofuran **55** durchgeführt. In Anlehnung an die Synthesemethode von Gobbi^[44] wurde die Oxidation mit Kaliumpermanganat in saurem Milieu durchgeführt. Diese Reaktion brachte ebenfalls das gewünschte Produkt nicht hervor, auch dann nicht, wenn die Reaktionszeit auf 30 Minuten verkürzt wird. Auch eine Synthesevorschrift von Moreira^[45] unter Verwendung des Phasentransfer-Katalysators Benzoldimethyltetradecylammoniumchlorid-Dihydrat führte nicht zur gewünschten Carbonsäure **57**.

Schema 2-27: Versuch der Synthese von 2-(1-Benzofuran-2-yl)essigsäure **57**

Ein alternativer Weg zur Carbonsäure **57** bot sich ausgehend vom Benzofuran-2-carboxaldehyd **58**. Wie von Groß^[46] und Degenhardt^[47] berichtet wurde, lassen sich Aldehyde in einer der Horner-Wadsworth-Emmons-Reaktion ähnlichen Phosphor-Sauerstoff-aktivierten Olefinierung von Tetraethyl(dimethylamino)methylendiphosphonat und anschließender saurer Hydrolyse zu einer um eine Methylengruppe verlängerten Carbonsäure oxidieren. Die Reaktion lieferte zwar die Carbonsäure **57**, allerdings ergab die basische Extraktion derselben aus dem Rohprodukt keine ausreichend hohe Reinheit.

Schema 2-28: Versuch der Synthese von **57** mittels einer Horner-Wadsworth-Emmons-Reaktion

2.4.2 Synthese des Thioesters

Die Syntheseroute über die Carbonsäure **57** und die Folgereaktionen (Veresterung, Amidierung, Lawessons Reagenz) zur Bildung des Thioamids war, wie zuvor gezeigt, nicht geeignet. Aus diesem Grund wurde ein neuer Weg über einen Thioester beschrieben. Die von Seebach^[48, 49] beschriebene Peterson-Olefinierung geht vom Benzofuran-2-carboxaldehyd **58** aus, der durch das Anion des (Bis(methylthio)methyl)trimethylsilans **59** nucleophil angegriffen wird und das Olefin **60** mit äußerst hoher Ausbeute liefert.

Schema 2-29: Synthese des Olefins **60**

Zur Bildung des entsprechenden Thioesters **61** wurde das Olefin **60** sauer hydrolysiert, wobei die Ausbeute eher mäßig war.

Schema 2-30: Saure Hydrolyse des Olefins **60** zum entsprechenden Thioester **61**

2.4.3 Synthese des Thioamids mit Benzofuran-Grundgerüst

Die Folgereaktionen, die beim ersten Syntheseweg nicht mehr zum Einsatz kamen, finden nun ausgehend vom Thioester **61** ihre Anwendung. Im Zuge der Amidierung, bei der *tert.*-Butylamin **62** nucleophil am Thiocarbonyl-Kohlenstoff angreift, die von Aggarwal^[50] beschrieben wurde, wurde Silbertriflat als Coreagenz eingesetzt. Die Synthese des Amids **63**, welches gleichzeitig als Referenzsubstanz in den physiologischen Untersuchungen eingesetzt werden kann um die Wichtigkeit der Thioamid-Funktion erneut zu belegen, verlief mit guter Ausbeute.

Schema 2-31: Synthese von 2-(1-Benzofuran-2-yl)-*N-tert.*-butylacetamid **63**

Der Austausch von Sauerstoff mit Schwefel wurde analog zu der Reaktionsvorschrift von Dantale^[51] mit Lawessons Reagenz durchgeführt und lieferte 2-(1-Benzofuran-2-yl)-*N-tert.*-butylethanthioamid **64** in sehr hoher Ausbeute.

Schema 2-32: Sauerstoff-Schwefel-Austausch mit Lawesson's Reagenz zum 2-(1-Benzofuran-2-yl)-*N*-*tert.*-butylethanthioamid **64**

2.4.4 Retrosynthetische Betrachtung des Reaktionsweges

Zusammenfassend wird an dieser Stelle der Syntheseweg aufgeführt, der erfolgreich zum Thioamid **64** geführt hat (s. Schema 2-33).

Schema 2-33: Retrosynthetische Perspektive auf den erfolgreichen Syntheseweg

2.4.5 Coumaranone

Die oxidierten Benzofurane, die 3-Coumaranone (nach IUPAC 1-Benzofuran-3(2*H*)-one), sollen an dieser Stelle zusätzlich untersucht werden. Zunächst wurde 3-Coumaranon **65** in der 2-Position mit Allylmethylcarbonat **66** doppelt allyliert und bildete das 2,2-Diallyl-3-coumaranon **67**. Bei der Umsetzung mit Tris(dibenzylidenacetone)dipalladium(0) ($\text{Pd}_2(\text{dba})_3$) und *rac*-(±)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl (*rac*-BINAP) als Katalysator^[5] fand keine Umsetzung des Eduktes statt. Erst als Tetrakis(triphenylphosphin)palladium(0) ($\text{Pd}(\text{PPh}_3)_4$) als Katalysator verwendet wurde, ließ sich das Produkt **67** mit einer Ausbeute von 42 % rein erhalten.

Schema 2-34: Synthese von 2,2-Diallyl-3-coumaranon **67**

Die Verbindung **67** wurde im Anschluss mit Natriumborhydrid in Anlehnung an die Publikation von Ghosh^[52] zum entsprechenden Alkohol **68** reduziert. Die Reaktion verlief mit sehr hoher Ausbeute.

Schema 2-35: Reduktion von 2,2-Diallyl-3-coumaranon **67** zu Verbindung **68**

Zur Ausbildung eines Spirozentrums in der 2-Position des Coumaranons wurde danach eine Metathese-Reaktion mit dem Grubbs I-Katalysator analog zu einer früheren Synthese des Arbeitskreises^[53] durchgeführt. Dabei wurden 0.5 mol% an Katalysator eingesetzt. Das gewünschte Produkt wurde nicht erhalten und konnte nur unter Verdopplung der Katalysatormenge auf 1 mol% in der Analytik in kleinsten Mengen nachgewiesen werden. Für die Synthese des Produktes könnte man die Metathese vor der Reduktion durchführen oder bei der Metathese den Grubbs II-Katalysator einsetzen, was aufgrund gewichtigerer Forschungsschwerpunkte nicht mehr versucht wurde.

Schema 2-36: Versuch der Metathese des diallylierten Alkohols **68** zur Spiroverbindung **69**

Die Einführung einer Carbothioamid-Funktion in Verbindung **69** hätte sicherlich zu einem interessanten Wirkstoff geführt, allerdings wurde stattdessen Verbindung **68** mit Natriumhydrid deprotoniert und mit Ethylisothiocyanat **31a** abgefangen. Dabei kam es zu keiner Umsetzung des Eduktes. Die Reaktion zum Thiocarbamat **70** gelang erst unter Verwendung von *n*-Butyllithium als Base.

Schema 2-37: Reaktion des Alkohols **68** zum 1-[[2,2-Bisprop-2-en-1-yl)-2,3-dihydro-1-benzofuran-3-yl]oxy}-*N*-ethylmethanthioamid **70**

Ausgehend von den Coumaranonen sollte ein „gespacertes“ Thioamid synthetisiert werden. Dazu wurde 3-Coumaranon **65** in einer Wittig-Reaktion mit Ethyl(triphenylphosphoranyliden)acetat **71** zum korrespondierenden Ethylester **72** umgesetzt.^[54]

Schema 2-38: Wittig-Reaktion von 3-Coumaranon **65** zum Ethylester **72**

Die weitere Synthesepaltung sah vor, den Ethylester **72** mit einem Amin zum Amid umzusetzen und danach mit Lawessons Reagenz den Carbonyl-Sauerstoff durch ein Schwefelatom zu ersetzen. Diese beiden Reaktionsstufen wurden allerdings nicht mehr durchgeführt.

2.5 Benzothiophene

Wie in verschiedenen Publikationen^[26, 55] gezeigt wurde, folgen in der Reihenfolge der Affinitäten für bestimmte Kaliumkanal-Rezeptor-Kombinationen nach den hochaffinen und agonistisch wirksamen Benzopyranen die Benzothiane. Die Benzothiophene verhalten sich damit zu den Benzothianen wie die Benzofurane zu den Benzopyranen, nämlich als ringverengtes Pendant, und stellen obendrein das Schwefel-Analogon zu den Benzofuranen dar. Damit bieten sie gute Vergleichsmöglichkeiten mit den bereits untersuchten Wirkstoffen.

2.5.1 Synthese des Thioesters

Bei den Thioamiden mit Benzothiophen-Grundgerüst liegt der Fokus ebenso wie bei den Benzothiazolen auf jenen mit Spacer-Gruppe. Dazu wurde, wie bereits in Kapitel 2.4.2 für die Benzofurane erwähnt wurde, eine Syntheseroute über den entsprechenden Thioester gewählt.^[48] Ausgehend von Benzothiophen-2-carboxaldehyd **73** wurde dieser mit (Bis(methylthio)methyl)trimethylsilan **59** zum Olefin **74** umgesetzt.

Schema 2-39: Synthese des Olefins **74**

Das gebildete Olefin **74** wurde anschließend mit Trifluoressigsäure sauer hydrolysiert und lieferte mit sehr hoher Ausbeute den Thioester **75**.

Schema 2-40: Saure Hydrolyse des Olefins **74** zum entsprechenden Thioester **75**

2.5.2 Synthese des Thioamids mit Benzothiophen-Grundgerüst

Die folgende Amidierung wurde wie in Kapitel 2.4.3 an den Benzofuranen beschrieben^[50] in Anwesenheit von Silbertriflat am Thioester **75** mit *tert.*-Butylamin **62** durchgeführt. Auch hier kann das entstehende Amid **76** zu Vergleichszwecken mit bekannten Thioamiden herangezogen werden.

Schema 2-41: Synthese von 2-(1-Benzothiophen-2-yl)-*N-tert.*-butylacetamid **76**

Anschließend wurde der Carbonyl-Sauerstoff im Amid **76** mit Lawessons Reagenz nach derselben Reaktionsvorschrift von Dantale^[51], wie sie auch bei den Benzofuranen angewendet wurde, durch Schwefel ersetzt. Auch hier wurde das gewünschte Thioamid **77** in hoher Ausbeute erhalten.

Schema 2-42: Sauerstoff-Schwefel-Austausch mit Lawessons Reagenz zum 2-(1-Benzothiophen-2-yl)-*N-tert.*-butylethanthioamid **77**

2.5.3 Versuch der Alkylierung von 2-(1-Benzothiophen-2-yl)-*N-tert.*-butylacetamid **76**

Zur Synthese eines Benzothiophen-basierten Thioamids mit einer veränderten Spacer-Gruppe wurde versucht, 2-(1-Benzothiophen-2-yl)-*N-tert.*-butylacetamid **76** nachträglich zu alkylieren. Dazu wurde das Amid mit zwei Äquivalenten *n*-Butyllithium deprotoniert und anschließend mit Ethylbromid **78** umgesetzt. Es entsteht ein Produktgemisch, vermutlich hauptsächlich aus dem *N*-ethylierten Amid **80** und anderen Nebenprodukten. Das gewünschte Produkt **79** wurde nicht beobachtet. Das Produktgemisch konnte nicht in seine Bestandteile aufgespalten werden, da sich die Gemischzusammensetzung in allen säulenchromatographischen Fraktionen nahezu unverändert wiederfand.

Schema 2-43: Versuch der nachträglichen Alkylierung des Amids **76** an der Spacer-Gruppe

2.6 Benzoxepine

Die vorherigen Versuche haben gezeigt, dass eine Ringverkleinerung durchaus zu potenten Kaliumkanalöffnern führen kann. Daher sollte der umgekehrte Fall, also eine Ringerweiterung, untersucht werden. Geht man von den Benzopyranen aus, so führt eine formale Ringerweiterung zu den Benzoxepinen.

Zuerst wurde 2-Allylphenol **81** mit 2-Bromacetophenon **82** zum resultierenden Keton **83** kondensiert.^[56] Diese Kondensation läuft nicht mit Kaliumcarbonat, sondern erst bei Verwendung von Natriumhydrid ab (s. Schema 2-39). Es gelang nicht, das Produkt ausreichend zu isolieren. Daher wurde ein alternativer Weg gewählt.

Schema 2-44: Kondensationsreaktion zu 1-Phenyl-2-(2-allylphenoxy)ethan-1-on **83**

Eine Kondensation nach einer bekannten Synthesevorschrift^[57] mit 2-Allylphenol **81** mit 2,3-Dibrompropen **84** führte zunächst zum Ether **85**.

Schema 2-45: Kondensationsreaktion zu 1-Allyl-2-(2-bromallyloxy)benzol **85**

Danach folgte eine Suzuki-Kupplung^[57], bei der der Bromsubstituent durch einen Phenylring ersetzt wurde. Der Grund für die Einführung eines Phenylrings war, dass einerseits ein Alkyl- oder Arylrest an der 3-Position des resultierenden Benzoxepins eingefügt und andererseits die folgende Ringschlussmetathese nicht durch einen Halogensubstituenten gestört werden sollte, obwohl der Mechanismus der Reaktion das Vorhandensein von Halogenen prinzipiell toleriert. Die Suzuki-Kupplung lief zwar ab, jedoch konnte das entstehende Produkt **87** nicht ausreichend isoliert werden. Daher wurde auf eine Fortführung der Benzoxepin-Synthesen verzichtet.

Schema 2-46: Suzuki-Kupplung zu 1-(2-Phenylallyloxy)-2-allylbenzol **87**

2.7 Benzothiazepine

Ein kleines Teilgebiet dieser Arbeit stellen die Benzothiazepine dar, welche als ringerweitertes Analogon der Benzothiazine zu verstehen und verwandt mit den Benzodiazepinen sind, die in der Pharmazie schon lange Zeit als Arzneimittel Verwendung finden.

Zur Synthese des einfachsten Benzothiazepins, eigentlich des Benzothiazepin-4-ons, wurde eine Kondensation angewandt, die von Rutkauskas^[58] beschrieben wurde. Dabei wurde 2-Aminothiophenol **36** mit Acrylsäure **88** zu 2,3,4,5-Tetrahydro-1,5-benzothiazepin-4-on **89** umgesetzt.

Schema 2-47: Kondensationsreaktion zu 2,3,4,5-Tetrahydro-1,5-benzothiazepin-4-on **89**

Um zu untersuchen, welche Stelle im Benzothiazepinon **89** nach einer Deprotonierung die nucleophilere ist, der Stickstoff oder der Enolat-Kohlenstoff,

wurde die Verbindung mit zwei Äquivalenten *n*-Butyllithium deprotoniert und anschließend mit Methyljodid **90** abgefangen. Dabei fand jedoch keinerlei Umsetzung des Eduktes statt.

Schema 2-48: Versuch der Methylierung von 2,3,4,5-Tetrahydro-1,5-benzothiazepin-4-on **89**

Als nächstes wurde versucht, die Thioamid-Funktion am Stickstoff oder in der 3-Position des Benzothiazepinons **89** einzuführen. Dazu wurden Ansätze mit 1.1 Äquivalenten sowie zwei Äquivalenten *n*-Butyllithium und mit zwei Äquivalenten von *in situ* erzeugtem Lithiumdiisopropylamid (LDA) zur Deprotonierung durchgeführt und jeweils mit Ethylisothiocyanat **31a** umgesetzt. Dabei entstand im Fall von *n*-Butyllithium stets das Additionsprodukt **95** von *n*-Butyllithium mit Ethylisothiocyanat **31a**. Bei der Verwendung von LDA fand kein Umsatz des Eduktes statt. Eventuell könnte man noch andere Basen wie Kaliumhexamethyldisilazid (KHMDS), Lithiumhexamethyldisilazid (LHMDS), Kalium-*tert.*-butanolat oder Natriumhydrid verwenden, die Reaktionszeit mit dem Isothiocyanat erhöhen oder einen Überschuss des Isothiocyanats einsetzen, um das gewünschte Thioamid zu erhalten. Dies wurde aufgrund anderer Forschungsschwerpunkte nicht mehr durchgeführt.

Schema 2-49: Versuch der Thioamidierung des Benzothiazepinons **89**

2.8 Benzodithiepine

Da sich die Benzoxepine und die Benzothiazepine als wenig erfolgversprechend gezeigt hatten, wurde versucht, Thioamide mit Benzodithiepin-Grundgerüst zu synthetisieren, um einige Kaliumkanalöffner untersuchen zu können, die einen benzanellierten Siebenring aufweisen.

2.8.1 Synthese der bromierten Xylol-Derivate

Die Stoffklasse der Benzodithiepine ist ausgehend von *ortho*-Xylol-Derivaten gut zugänglich. Zunächst wurden diese in einer Wohl-Ziegler-Bromierung mit zwei Äquivalenten *N*-Bromsuccinimid (NBS) **97** und dem Radikalstarter Azo-bis-

(isobutyronitril) (AIBN) umgesetzt, um die entsprechenden dibromierten Xylole zu erhalten.^[59] Diese radikalische Reaktion verläuft meistens mit guten Ausbeuten. Bei der Synthese von 1,2-Bis(bromomethyl)-4-chlorbenzol **98c** lag eine Mischung aus dem gewünschten Produkt sowie dem mono- und tribromierten Xylol vor, die sich nicht in ihre Bestandteile trennen ließ.

	R ¹	R ²	Verbindung
96a	H	H	98a (61 %)
96b	OMe	H	98b (75 %)
96c	H	Cl	98c (unsauber)

Schema 2-50: Radikalische Bromierung verschiedener Xylol-Derivate **96a-c**

Außerdem wurde versucht, 2,3-Lutidin (2,3-Dimethylpyridin) **96d** ebenfalls mittels der obigen Reaktion zum 2,3-Bis(bromomethyl)pyridin **98d** umzusetzen. Auch hier lag eine Mischung aus Mono-, Di- und Tribromiden und deren Konstitutionsisomere vor, wobei sich die Bestandteile wiederum nicht voneinander isolieren ließen.

Schema 2-51: Radikalische Bromierung von 2,3-Lutidin **96d**

Weiterhin wurde 4,5-Diphthalsäureanhydrid **99** mit Lithiumaluminiumhydrid in Anlehnung an eine Publikation von Levy^[60] zur entsprechenden Dihydroxymethyl-Verbindung **100** reduziert, wobei diese nur stark verunreinigt erhalten werden konnte. Danach wurde diese nach einer Versuchsvorschrift derselben Publikation in einer nucleophilen Substitution bromiert, wobei ein Gemisch aus dem gewünschten Produkt und dem Monochlorbenzol-Derivat entsteht.

Schema 2-52: Synthesesequenz von 4,5-Diphthalsäureanhydrid **99** über 1,2-Bis(hydroxymethyl)-4,5-dichlorbenzol **100** zu 1,2-Bis(bromomethyl)-4,5-dichlorbenzol **98e**

Außerdem wurde ein weiteres interessantes Derivat ausgehend von 1,3-Benzodioxol **101** mit Paraformaldehyd und Bromwasserstoffsäure nach einer Patentvorschrift^[61] synthetisiert. Dabei konnte 5,6-Bis(bromomethyl)benzo-1,3-dioxol **98f** mit hoher Ausbeute erhalten werden.

Schema 2-53: Synthese von 5,6-Bis(bromomethyl)benzo-1,3-dioxol **98f**

2.8.2 Synthese der Dithiole

Der folgende Syntheseschritt sieht die Bildung von Dithiolen vor, die später mit Ketonen zu Thioacetalen umgesetzt werden können. Dazu wurden die Dibromide **98a-f** nach einer Vorschrift von Boyd^[62] zusammen mit Thioharnstoff mehrere Stunden zum Rückfluss erhitzt. Dabei greift das Schwefelatom im Sinne einer S_N2-Reaktion an der Brommethyl-Gruppe an. Das entstehende Salz addiert anschließend ein Hydroxid-Ion und spaltet durch saure Aufarbeitung Harnstoff ab.

Schema 2-54: Hypothetischer Mechanismus der Mercaptanbildung mit Thioharnstoff am Beispiel von Benzylbromid

Alternativ können Mercaptane auch durch die direkte Reaktion von Bromiden mit Alkalisulfiden erhalten werden, jedoch ist Thioharnstoff besser handhabbar und weniger geruchsintensiv. In Schema 2-55 sind die Reaktionsbedingungen für sämtliche Dithiole inklusive der jeweiligen Ausbeuten aufgeführt. Bei der Synthese von **102b** bildete sich neben dem gewünschten Produkt auch das durch Oxidation entstandene Disulfid.

Schema 2-55: Synthese der Dithiole **102a-e**

2.8.3 Synthese der Benzodithiepine

Das einfachste Benzodithiepin (3,5-Dihydro-1*H*-2,4-benzodithiepin **103**) wurde nach einer Synthesevorschrift von Wan^[63] hergestellt. Dabei wurde das Dibromid **98a** unter reduzierenden Bedingungen mit Dischwefelkohlenstoff umgesetzt, wobei die beiden Schwefelatome jeweils an einer der beiden Brommethyl-Gruppen nucleophil angreifen und so einen Siebenring bilden. Dabei werden sowohl Natriumborhydrid als auch Dischwefelkohlenstoff mit drei Äquivalenten bezüglich des Dibromids **98a** eingesetzt. Grundsätzlich bildet sich allein der Siebenring, anstatt dass zwei Moleküle Dischwefelkohlenstoff pro Molekül Dibromid addiert werden. Dieser Umstand kann zum Beispiel durch kinetische Überlegungen erklärt werden.

Statistisch gesehen befindet sich das zweite Schwefelatom, sobald das erste an der Brommethyl-Gruppe angegriffen hat, näher an der zweiten Brommethyl-Gruppe als eventuell in der Nähe befindliche weitere Dischwefelkohlenstoff-Moleküle.

Schema 2-56: Synthese von 3,5-Dihydro-1H-2,4-benzodithiepin **103**

Um die 3-Position für eine spätere Thioamidierung unzugänglich zu machen, wurden weitere Benzodithiepine hergestellt, die über keine Wasserstoffatome an dieser Stelle mehr verfügen. Dies wurde über Alkylreste oder über die Bildung verschiedener Spiroverbindungen auf Thioacetal-Basis verwirklicht. Diese Benzodithiepine wurden auf unterschiedliche Weise synthetisiert. Dabei wurde auf eine direkte Methylierung, eine mineralische Katalyse mit Montmorillonit KSF, eine Eisenkatalyse und eine säurekatalysierte Thioacetalisierung mit *para*-Toluolsulfonsäure zurückgegriffen, welche in den nachfolgenden Teilkapiteln genauer betrachtet werden.

2.8.3.1 Versuch der direkten Methylierung

Als erstes wurde die direkte Methylierung des Benzodithiepins **103** untersucht. Dazu wurde dieses zunächst nach einer Literatursynthese^[64] mit *n*-Butyllithium deprotoniert, anschließend mit Methyljodid umgesetzt und der gesamte Vorgang ein weiteres Mal wiederholt. Dabei wurde ein Gemisch aus dem einfach methylierten Benzodithiepin **104** und dem zweifach methylierten Benzodithiepin **105a** gebildet, welches sich nicht in seine Bestandteile auftrennen ließ. Zwar kann der Vorgang zur

	R ¹	R ²	Verbindung
106a	Me	Me	105a (99 %)
106b	Me	Pr	105b (51 %)
106c	CF ₃	CF ₃	105c (kein Umsatz)
106d			105d (98 %)
106e			105e (98 %)
106f			105f (98 %)
106g			105g (92 %)
106h			105h (kaum Umsatz)
106i			105i (99 %)
106j			105j (87 %)

Schema 2-58: Säurekatalysierte Thioacetalisierung von 1,2-Phenyldimethanethiol **102a**

Außerdem wurde versucht, auf die oben beschriebene Weise Benzodithiepin-Derivate herzustellen, die am Aromaten verschiedene Substituenten aufweisen. Dabei konnte allerdings keines der beiden Produkte rein erhalten werden. Allem Anschein nach stören diese Substituenten die Bildung eines Thioacetals.

R ¹	R ²	Verbindung
OMe	H	105k (unsauber)
H	Cl	105l (kein Umsatz)

Schema 2-59: Versuch der Thioacetalisierung mit am Aromaten substituierten Dithiolen **102b-c**

Die Bildung des auf dem Benzodioxol-Grundgerüst basierenden Thioacetals **105m** gelang zwar auf die oben beschriebene Weise, jedoch konnte die Verbindung nicht ausreichend von nicht umgesetztem Edukt getrennt werden.

Schema 2-60: Synthese des Benzodioxol-basierten Thioacetals **105m**

2.8.3.3 Thioacetalbildung unter mineralischer Katalyse (Montmorillonit KSF)

Eine weitere untersuchte Methode zur Thioacetalisierung der Dithiole besteht darin, einen mineralischen, leicht sauer reagierenden Katalysator (Montmorillonit KSF) zuzugeben, an dessen Oberfläche die Reaktion ablaufen kann. Diese

Reaktionsvorschrift von Patney^[66] wurde an zwei Beispielen getestet, wobei das Produkt im Fall von **105f** in Spuren und bei dem Syntheseversuch von **105b** überhaupt nicht nachgewiesen werden konnte. Prinzipiell erscheint diese Methode zwar geeignet, allerdings besteht dabei noch Optimierungsbedarf bezüglich der Reaktionsbedingungen wie Temperatur, Reaktionsdauer und Eduktverhältnisse. Vermutlich wird diese Methode nicht die Ausbeuten und Reinheiten der Säurekatalyse erreichen.

	R ¹	R ²	Verbindung
106b	Me	Pr	105b (kein Umsatz)
106f			105f (kaum Umsatz)

Schema 2-61: Versuch der Thioacetalisierung von **102a** unter mineralischer Katalyse

2.8.3.4 Thioacetalbildung unter Eisenkatalyse (Eisen(III)chlorid)

Die Bildung eines Thioacetals kann ebenso durch einen Eisenkatalysator beschleunigt werden. Wie zuvor beim mineralischen Katalysator reagiert auch Eisen(III)chlorid sauer. Die Thioacetalisierung läuft also grundsätzlich im sauren Milieu ab. Die Synthesemethode, die ebenfalls von Patney^[67] publiziert wurde, wurde an der Herstellung zweier Benzodithiepine, **105f** und **105h**, getestet. Dabei konnte nur Verbindung **105f** mit 40 %iger Ausbeute erhalten werden, während bei der Synthese von **105h** vermutlich das Stickstoffatom die Reaktion gestört hat.

	R ¹	R ²	Verbindung
106f			105f (40 %)
106h			105h (kein Umsatz)

Schema 2-62: Versuch der Thioacetalisierung von **102a** unter Eisenkatalyse

2.8.4 Oxidationen der Benzodithiepine

Zur Steigerung der Löslichkeit aufgrund der höheren Polarität und zur Veränderung bzw. Erhöhung der Acidität an der dem Schwefelatom benachbarten Methylengruppe durch Präkoordination von Lithiumorganen über das Sauerstoffatom wurde versucht, ausgewählte Benzodithiepine zu Sulfoxiden oder zu Sulfonen im Sinne einer Baeyer-Villiger-Oxidation zu oxidieren. Zunächst wurde in Anlehnung an eine Vorschrift von Ando^[68] *meta*-Chlorperbenzoesäure (*m*CPBA) als Oxidationsmittel eingesetzt, wobei das Sulfoxid **107** erhalten werden konnte.

Schema 2-63: Oxidation von **103** mit *m*CPBA zum Sulfoxid **107** nach Ando

Als einfachstes an der 3-Position durch Alkylgruppen „blockiertes“ Benzodithiepin wurde Verbindung **105a** auf eine ähnliche Weise wie zuvor zu oxidieren versucht. Angelehnt an die Publikation von Kikilo^[69] wurde die Reaktionsdauer deutlich erhöht. Auf diese Weise konnten zwei Sulfoxide in guten Ausbeuten erhalten werden.

Schema 2-64: Oxidation von Benzodithiepinen mit *m*CPBA zu den Sulfoxiden **108a-d** nach Kikilo

Wird das Benzodithiepin **105a** unter anderen Bedingungen oxidiert, entsteht stets das entsprechende Sulfoxid **108a**. Dies trifft auf eine Verdopplung der Menge an *m*CPBA, sowie auf die Verwendung von Kaliumpermanganat als Oxidationsmittel zu. Die Literaturvorschriften von Chattaway^[70] und Autenrieth^[71], bei denen Kaliumpermanganat verwendet wurde, lieferten im ersten Fall das Sulfoxid und im zweiten Fall nur das Edukt.

Da nun bekannt war, dass eine simple Verdopplung der Menge an *m*CPBA nicht ausreicht, um das Benzodithiepin zum Sulfon zu oxidieren, wurden verschiedene Oxidationsmittel getestet: Kaliumpermanganat und Schwefelsäure nach Autenrieth^[71], Kaliumpermanganat und Kupfer(II)sulfat nach Noureldin^[72], Wasserstoffperoxid in Essigsäure nach Bügler^[73] und Natriumperborat in Essigsäure

nach McKillop^[74]. Allein im Fall von Natriumperborat konnte das Sulfoxid nachgewiesen, aber nicht rein isoliert werden.

Schema 2-65: Versuche der Synthese des Sulfoxids **109** mit verschiedenen Oxidationsmitteln

2.8.5 Synthese der Thioamide mit Benzodithiepin-Grundgerüst

In diesem Kapitel werden die Synthesen der Thioamide mit Benzodithiepin-Grundgerüst aufgeführt. Dabei wird zwischen den Benzodithiepinen selbst und deren Sulfoxiden unterschieden.

2.8.5.1 Benzodithiepin-Thioamide

Das einfachste Benzodithiepin **103** unterscheidet sich in der Reaktivität von allen anderen synthetisierten Benzodithiepinen darin, dass sich die acideste Stelle in der 3-Position befindet und nicht in der 1-Position. Nach einer ähnlichen Synthese von Mori^[75] wurde **103** mit *n*-Butyllithium deprotoniert und anschließend mit verschiedenen Isothiocyanaten umgesetzt. Dabei war nur die Reaktion mit Ethylisothiocyanat **31a** erfolgreich, da bei den Butylisothiocyanaten **31b** und **31d** eine Addition derselben mit *n*-Butyllithium stattgefunden hat (vgl. Schema 2-49).

	R	Verbindung
31a	Et	110a (65 %)
31b	Bu	110b (kein Umsatz)
31d	<i>t</i> Bu	110c (kein Umsatz)

Schema 2-66: Synthese der in der 3-Position thioamidierten Benzodithiepine **110a-c**

Die Thioamidierung in der 1-Position der Benzodithiepine wurde mit *n*-Butyllithium in abs. THF mit den entsprechenden Isothiocyanaten durchgeführt. Das chronologisch erste Thioamid dieser Reihe **111f** sollte zunächst durch eine Lithiierung bei -100 °C erhalten werden, wobei sich herausstellte, dass das Edukt **105f** überhaupt nicht reagierte und sich ansonsten nur das Additionsprodukt von Isothiocyanat und *n*-Butyllithium gebildet hatte. Daraufhin wurde die Temperatur auf -40 °C erhöht und das Produkt konnte erhalten werden. Beim Syntheseversuch von **111c** fiel auf, dass die konkurrierenden Nebenreaktionen schneller ablaufen und daher andere Produkte entstehen. An der Synthese von **111g** wurde getestet, ob die Reaktion durch den

Austausch von THF durch Diethylether wie gewünscht abläuft, was jedoch nicht der Fall war. In Schema 2-67 sind die Produkte der Reaktion inklusive der jeweiligen Ausbeuten aufgeführt.

	R ¹	R ²	R ³	Verbindung
105a	Me	Me	31a Et	111a (24 %)
105b	Me	Pr	31a Et	111b (62 %)
105d			31a Et	111c (kein Umsatz)
105e			31a Et	111d (7 %)
105f			31k Me	111e (kein Umsatz)
105f			31a Et	111f (46 %)
105f			31d <i>t</i> Bu	111g (kein Umsatz)
105g			31a Et	111h (27 %)
105i			31a Et	111i (22 %)
105j			31a Et	111j (20 %)

Schema 2-67: Synthese der Benzodithiepin-basierten Thioamide **111a-j**

Das letzte Thioamid aus der Reihe der Benzodithiepine ist jenes mit Benzodioxol-Struktur (**111k**). Unter denselben Bedingungen wie die in Schema 2-67 aufgeführte Synthese wurde dieses jedoch nur in Spuren im Rohprodukt nachgewiesen und konnte dementsprechend nicht rein erhalten werden. Wird **105m** mit *in situ* erzeugtem LDA lithiiert, ist das Produkt **111k** ebenfalls nicht nachweisbar.

Schema 2-68: Versuch der Synthese des Thioamids **111k**

2.8.5.2 Thioamide der Benzodithiepin-Sulfoxide

Die oxidierten Benzodithiepine, die Sulfoxide, wurden unter ähnlichen Bedingungen synthetisiert wie die nicht oxidierten Benzodithiepin-Thioamide. Das einfachste Sulfoxid ist wie bei den unoxidierten Benzodithiepinen das in der 3-Position unsubstituierte. Bei der Reaktion mit Ethylisothiocyanat **31a** konnte das resultierende Produkt **112** nicht erhalten werden. Eventuell könnte eine alternative Base wie Natriumhydrid oder LDA die Reaktion ermöglichen. Dies wurde aber nicht mehr durchgeführt.

Schema 2-69: Versuch der Synthese des Thioamids **112**

Die weiteren Thioamide, die auf dem Sulfoxid basieren, sind in Schema 2-70 abgebildet und wurden anders als beim Syntheseversuch von **112** mit *in situ* erzeugtem LDA lithiiert. Bei der Synthese von **113a** war die Ausbeute im Prinzip doppelt so hoch wie in Kapitel 4 angegeben, da eine Hälfte des Rohprodukts umkristallisiert wurde und der andere Teil einer Zersetzung bei der säulenchromatographischen Reinigung unterlag. Das Produkt **113c** konnte nicht erhalten werden, da das Edukt **108d** verunreinigt eingesetzt wurde, weil die Isolierung zuvor scheiterte. Obwohl in der Theorie Diastereomere entstehen sollten, zeigten die analytischen Untersuchungen (NMR) keine Hinweise darauf.

	R ¹	R ²	Verbindung
108a	Me	Me	113a (27 % bzw. 54 %)
108b			113b (50 %)
108d			113c (kein Umsatz)

Schema 2-70: Synthese der Thioamide **113a-c** der in der 3-Position alkylierten Benzodithiepin-Sulfoxide

2.8.5.3 Amid eines Benzodithiepins

Es wurde außerdem ein einziger Versuch unternommen, ein Amid auf Benzodithiepin-Basis herzustellen. Nach der Synthesevorschrift von Mori^[75], die auch zu den analogen Thioamiden **110a-c** geführt hatte, wurde **103** mit *tert.*-Butylisocyanat **50** umgesetzt. Statt des gewünschten Produktes konnte nur das Additionsprodukt von *n*-Butyllithium mit dem Isocyanat gefunden werden.

Schema 2-71: Versuch der Synthese eines Amids **114** auf Benzodithiepin-Basis

2.9 Thio- und Isothiochromanone

Die letzten innerhalb dieser Dissertation untersuchten Verbindungsklassen sind die Thio- und Isothiochromanone. Sie sind vergleichbar mit den erwähnten Benzopyranen. Die Isothiochromanone, die innerhalb dieser Arbeit hergestellt wurden, können mit den Isothiochromanonen aus anderen Arbeiten^[28, 30] des Arbeitskreises verglichen werden. Dabei wurden bei den am Aromaten unsubstituierten Isothiochromanonen nur jene synthetisiert, die in der 3-Position einen Alkylsubstituenten aufweisen. Die methoxysubstituierten Derivate sind gänzlich neu und tragen in der 3-Position Wasserstoffatome oder eine Methylgruppe.

2.9.1 Synthese der Benzylsulfanylcarbonsäuren

Für den Aufbau des Isothiochromanon-Grundgerüsts wird angelehnt an eine Publikation von Owen^[76] Benzylthiol **115** mit racemischen 2-Bromcarbonsäuren **116a-c** umgesetzt.

	R	Verbindung
116a	Me	117a (86 %)
116b	Et	117b (77 %)
116c	Pr	117c (unsauber)

Schema 2-72: Synthese der Benzylsulfanylcarbonsäuren **117a-c**

Bei der Synthese von **117c** trat eine Oxidation von **115** zum Dibenzylsulfid auf, welches sich anschließend nicht vom gewünschten Produkt abtrennen ließ. Abhilfe könnte die Durchführung unter Inertbedingungen und/oder die Verkürzung der Reaktionsdauer leisten, was aber nicht mehr durchgeführt wurde.

Schema 2-73: Oxidation von Benzylthiol **115** zum Dibenzylsulfid **118**

Zudem wurden auch Benzylsulfanylcarbonsäuren hergestellt, die über zwei Methoxysubstituenten im Aromaten verfügen. Dazu wurde zuerst 3,5-Dihydroxytoluol **119** in Anlehnung an eine frühere Publikation des Arbeitskreises^[77] zweifach methyliert.

Schema 2-74: Methylierung von 3,5-Dihydroxytoluol **119** zu 3,5-Dimethoxytoluol **120**

Nach einer bekannten Vorschrift^[59] für die radikalische Bromierung wurde, wie auch bei der Synthese der Benzodithiepine, versucht, die benzyliche Methylgruppe zu bromieren. Statt aber das gewünschte 3,5-Dimethoxybenzylbromid **121** zu erhalten,

wurde am aromatischen Kern im Sinne einer elektrophilen aromatischen Substitution bromiert. Dies ist auf die stark aktivierenden Methoxygruppen zurückzuführen, die mit ihrem positiven mesomeren Effekt die Kernbromierung durch eine erhöhte Elektronendichte im Aromaten begünstigen. Zudem aktiviert die Methylgruppe den Aromaten durch ihren positiven induktiven Effekt. Diese Aktivierung ist so stark, dass selbst unter den Bedingungen für eine radikalische Bromierung mit *N*-Bromsuccinimid (NBS) **97** mit AIBN als Radikalstarter die elektrophile Substitution schneller als der radikalische Mechanismus abläuft.

Schema 2-75: Bromierung von 3,5-Dimethoxytoluol **120**

Da die Bromierung in der Seitenkette erfolgte, wurde **121** käuflich erworben und auf dieselbe Weise mit Thioharnstoff zum Benzylthiol umgesetzt wie bei den Benzodithiepinen.^[62] Diese Reaktion verlief auch hier mit sehr hoher Ausbeute, allerdings ist darauf zu achten, die Reaktionsdauer möglichst kurz zu halten, da ansonsten abermals eine Oxidation zu den korrespondierenden Disulfiden stattfindet.

Schema 2-76: Synthese des substituierten Benzylthiols **123**

Das Benzylthiol **123** wurde danach wie das unsubstituierte Benzylthiol **115** mit verschiedenen racemischen 2-Bromcarbonsäuren zu den Benzylsulfanylcarbonsäuren umgesetzt.^[76] Bei der Synthese von **124b** wurde nur das Edukt erhalten. Bei der Zugabe von Natriumiodid wurde das Edukt zunächst teilweise zu **124b** umgesetzt und anschließend mit Ethanol verestert.

	R	Verbindung
116d	H	124a (44 %)
116a	Me	124b (kein Umsatz)

Schema 2-77: Synthese der zweifach methoxysubstituierten Benzylsulfanylcarbonsäuren **124a-b**

Aufgrund der Tendenz mit 2-Brompropansäure **116a** den entsprechenden Ethylester zu bilden, wurde dieser gezielt hergestellt. Nach einem Patent^[78] bzw. einer Vorschrift von Burkard^[79] wurde 3,5-Dimethoxybenzylbromid **121** mit Ethyl-2-mercaptopropionat **125** im Zuge einer Kondensation zum resultierenden Ethylester **126** umgesetzt.

Schema 2-78: Synthese von Ethyl-2-(3,5-dimethoxyphenyl)methylsulfanylpropionat **126**

Der Ester **126** wurde im Anschluss nach einer Publikation von Hardouin^[80] zur Carbonsäure **124b** umgesetzt. Dabei findet bei der Verwendung von Methanol als Lösemittel eine Umesterung zum Methyl ester **127** statt. Wird Methanol gänzlich weggelassen, so findet keine Reaktion des Eduktes statt. Um die Umesterung zu vermeiden, wurde in der Folge Ethanol als Lösemittel gewählt. Außerdem war die Erhöhung der Reaktionsdauer und der Temperatur für einen quantitativen Umsatz unerlässlich.

Schema 2-79: Umesterung (**127**) bzw. Verseifung (**124b**) des Ethylesters **126**

Eine weitere Benzylsulfanylcarbonsäure wurde ausgehend von 4-Chlorbenzylthiol **128** mit racemischer 2-Brompropansäure **116a** synthetisiert.

Schema 2-80: Synthese der chlosubstituierten Benzylsulfanylcarbonsäure **129**

2.9.2 Ringschluss zum Isothiochromanon

Der Ringschluss zum Isothiochromanon-4-on **131a-c** erfolgt nach einer Vorschrift von Kiang.^[81] Formal findet dabei eine Abspaltung von Wasser statt, die durch Phosphorpentoxid begünstigt wird. Außerdem wird Celite, also ungebrannte

Kieselgur, die aus den Schalen fossiler Kieselalgen gewonnen wird, eingesetzt. Einerseits wird durch die Adsorption der Reaktanden am amorphen Siliciumdioxid die Oberfläche vergrößert, an der sich diese statistisch näher aneinander befinden als in der Lösung, andererseits lassen sich am Ende der Reaktion sämtliche feste Bestandteile besser filtrieren. Die Ausbeuten sinken dabei erwartungsgemäß mit zunehmendem sterischen Anspruch des Restes.

	R	Verbindung
130	H	131a (64 %)
117a	Me	131b (23 %)
117b	Et	131c (kein Umsatz)

Schema 2-81: Ringschluss mit Phosphorpentoxid zu den Isothiochroman-4-onen **131a-c**

Zur Steigerung der Ausbeuten wurden noch andere Verfahren zum Ringschluss an Verbindung **117a** untersucht.

Die erste Methode ist analog zu der Synthese der Diazoxide mit PPSE, da auch dort eine Abspaltung von Wasser erfolgte. Prinzipiell entsteht zwar auch das Produkt aber auch eine große Zahl anderer Produkte. Eventuell könnte das Produkt erfolgreich destilliert werden.

Eine weitere untersuchte Methode ist die Wasserabspaltung mit Hilfe von Polyphosphorsäure (PPA) nach Wempe^[82]. Dabei wird das Produkt in kleinen

Mengen gebildet, aber es findet kaum Umsatz statt. Durch den geringen Umsatz lässt sich nur schwer feststellen, ob Nebenreaktionen auftreten. Abhilfe könnte die Verlängerung der Reaktionszeit schaffen. Dies wurde allerdings nicht mehr durchgeführt.

Die dritte Methode verläuft über die Synthese des Carbonsäurechlorids. Die Carbonsäure wird nach einer Publikation von Gundermann^[83] mit Thionylchlorid umgesetzt und anschließend mit Aluminiumchlorid einer intramolekularen Friedel-Crafts-Acylierung unterworfen. Dies ist mit 94 % Ausbeute die erfolgreichste der untersuchten Methoden.

Schema 2-82: Alternative Methoden für den Ringschluss zum 3-Methylisothiochroman-4-on **131b**

Die Reaktion über das Säurechlorid wurde außerdem für die zuvor gescheiterte Synthese von 3-Ethylisothiochroman-4-on **131c** herangezogen und lieferte dieses in akzeptabler Ausbeute.

Schema 2-83: Intramolekulare Friedel-Crafts-Acylierung zum 3-Ethylisothiochroman-4-on **131c**

Die Syntheseroute nach Kiang^[81] wurde auch für die Synthese der methoxysubstituierten Isothiochromanone verwendet, wobei die Reaktionsdauer bei **124a** vier Stunden und bei **124b** bei 40 Stunden lag. Bei einer Reaktionsdauer von sechs Stunden wurde bei der Synthese von **132b** kein Produkt gebildet. Wird der Ester **126** direkt in dieser Synthese eingesetzt, findet keine Umsetzung statt.

	R	Verbindung
124a	H	132a (37 %)
124b	Me	132b (12 %)

Schema 2-84: Ringschluss der methoxysubstituierten Benzylsulfanylcarbonsäuren **124a-b** zu den entsprechenden Isothiochroman-4-onen **132a-b**

Zur Synthese von 6-Chlor-3-methylisothiochroman-4-on **133** wurde der Weg über das Säurechlorid gewählt, allerdings nach alternativen Vorschriften für die Bildung

des Säurechlorids^[40] und für die Friedel-Crafts-Acylierung^[84], bei der das Produkt nicht gebildet wurde.

Schema 2-85: Versuch der intramolekularen Friedel-Crafts-Acylierung von **129** zu **133**

2.9.3 Synthese der Thioamide mit Thio- und Isothiochromanon-Grundgerüst

In diesem Teilkapitel wird die Synthese der Thioamide auf Thio- und Isothiochromanon-Basis beschrieben.

2.9.3.1 Thioamid mit Thiochromanon-Grundstruktur

Das für diese Synthese verwendete Thiochromanon-4-on **134** wurde käuflich erworben. Zunächst wurde versucht, **134** mit LDA zu lithieren und mit Ethylisothiocyanat **31a** umzusetzen. Dabei wird das Produkt **135** nur in Spuren gebildet. Wird stattdessen die direkte Lithierung mit *n*-Butyllithium durchgeführt, so entsteht das Produkt in für die Isolierung ausreichender Menge.

Schema 2-86: Synthese des Thioamids auf Thiochromanon-Basis **135**

2.9.3.2 Thioamid mit Isothiochromanon-Grundstruktur

Die einfachsten in dieser Arbeit behandelten Thioamide mit Isothiochromanon-Grundgerüst sollten nach einer Publikation von Böhme^[85] hergestellt werden. Dabei erfolgte die Deprotonierung mit Kalium-*tert.*-butanolat für den Fall von Ethylisothiocyanat **31a** in Dimethylsulfoxid (DMSO) und für *exo*-Norborylisothiocyanat **31h** und *tert.*-Butylisothiocyanat **31d** in absolutiertem THF. Die Reaktionszeit betrug beim Abfangen mit **31a** und **31d** 16 Stunden, mit **31h** fünf Tage. Die Arbeit von Franke^[30] hatte gezeigt, dass DMSO ohne große Probleme durch THF ersetzt werden kann. Bei diesen Reaktionen wurden die Produkte allerdings nicht oder nur in schlechten Ausbeuten gebildet, was im Fall von **136c** auf den großen sterischen Anspruch des Norbornylrestes zurückzuführen sein könnte.

	R	Verbindung
31a	Et	136a (kein Umsatz)
31d	<i>t</i> Bu	136b (5 %)
31h	Norbornyl	136c (kein Umsatz)

Schema 2-87: Versuch der Synthese der Thioamide **136a-c**

Um die Frage zu klären, inwieweit sich Stereozentren auf die Affinität der potentiellen Kaliumkanalöffner auswirken, wurde zunächst das Isothiochroman-4-on **131a** mit den beiden Enantiomeren von 1-Cyclohexylethylisothiocyanat **31k** ((*R*)-Enantiomer) und **31l** ((*S*)-Enantiomer) umgesetzt. Unter allen getesteten Basen (*n*-Butyllithium, LHMDS, KHMDS, LDA, Kalium-*tert.*-butanolat) hat sich Kalium-*tert.*-butanolat als die beste Wahl erwiesen, obwohl sie in THF nicht gelöst, sondern als Suspension vorliegt. Dennoch wurden mit einigen dieser Basen geringe Umsätze zum jeweiligen Produkt verfolgt. Die gewählte Synthesemethode ist an die Publikation von Böhme^[85] angelehnt.

	Stereopräfix	Verbindung
31k	<i>R</i>	137a (12 %)
31l	<i>S</i>	137b (20 %)

Schema 2-88: Synthese der beiden chiralen Thioamide **137a-b**

An dieser Stelle sei erwähnt, dass die gebildeten Produkte **137a-b**, wie alle Isothiochromanon-Thioamide, die über ein Wasserstoffatom in der 3-Position verfügen, hauptsächlich in der enolischen Form vorliegen und deshalb in dieser Position eventuelle Stereozentren schnell zum Racemat äquilibrieren.

Schema 2-89: Keto-Enol-Tautomerie der Isothiochromanon-Thioamide

Die Umsetzung mit den chiralen Isothiocyanaten **31k-l** wurde auch am 3-Methylisothiochroman-4-on **131b** durchgeführt. Bei dieser Reaktion wurden viele Basen getestet, da eine unerwartete Nebenreaktion stattfand, die später genauer betrachtet wird. Dies ist auch der Grund dafür, dass Verbindung **138a** durch Deprotonierung mit Kaliumhexamethyldisilazid (KHMDs) und Verbindung **138b** mit Kalium-*tert.*-butanolat erhalten wurde. Das Diastereomerenverhältnis liegt bei

ungefähr 2:1, wobei nicht ermittelt wurde, welches der beiden bevorzugt gebildet wurde.

Schema 2-90: Synthese der diastereomeren Thioamide **138a-b**

Bei der ebenfalls nach Böhme^[85] durchgeführten Synthesen der Thioamide mit 3-Methylisothiochroman-4-on-Grundgerüst muss penibel darauf geachtet werden, dass das Kalium-*tert.*-butanolat auf keinen Fall bereits mit Wasser reagiert hat, da sich dabei Kaliumhydroxid bildet, welches beim entstandenen Thioamid zu einer ringöffnenden Retro-Claisen-Kondensation (genauer: Retro-Dieckmann-Kondensation) führt. Diese Reaktion erfolgt bei allen in der 3-Position alkylsubstituierten Isothiochromanon-Thioamiden sehr schnell. So wurde in NMR-Experimenten festgestellt, dass diese mit äquimolarer Menge an Kaliumhydroxid in DMSO bei 60 °C innerhalb von nur fünf Minuten zu einem quantitativen Umsatz zu der resultierenden Benzoesäure führen.

Schema 2-91: Mechanismus der ringöffnenden Retro-Claisen-Kondensation bei den in der 3-Position alkylierten Isothiochromanon-Thioamiden

Als die Neigung zur Ringöffnung bekannt und untersucht wurde, konnten die entsprechenden Benzoesäuren gezielt synthetisiert werden. Die beiden zu **138a-b** analogen Benzoesäuren **139b-c** wurden allerdings noch mit Kalium-*tert.*-butanolat, welches teilweise hydrolysiert war, hergestellt, während die zu **136b** analoge Benzoesäure **139a** mit äquimolaren Mengen an Kalium-*tert.*-butanolat und Kaliumhydroxid erhalten wurde.

	Stereopräfix	Verbindung
31k	<i>R</i>	139b (27 %)
31l	<i>S</i>	139c (5 %)

Schema 2-92: Synthese der Benzoesäuren **139a-c**

Die letzten Thioamide wurden basierend auf den zweifach methoxysubstituierten Isothiochromanonen hergestellt. Bei dem Syntheserversuch von **140a** wurde zum einen DMSO als Lösemittel und zum anderen nur ein Äquivalent Base verwendet. Eventuell wäre der Versuch mit den Bedingungen der Synthesen von **140b-d** erfolgreich verlaufen. Dies wurde aber nicht mehr durchgeführt.

	R ¹	R ²	Verbindung
132a	H	31a Et	140a (kein Umsatz)
132b	Me	31a Et	140b (18 %)
132b	Me	31m Pr	140c (59 %)
132b	Me	31d <i>t</i> Bu	140d (kaum Umsatz)

Schema 2-93: Synthese der Thioamide **140a-d**

Da die Verseifung des Esters **126** erfolgreich verlief, wurde versucht, mit (-)-Chlorameisensäurementhylester **141** eine diastereoselektive Synthese eines Thioamids mit 3-Methylisothiochroman-4-on-Basis zu erreichen. Die Bildung des Menthylesters **142** sollte wegen der relativ nahen Stereoinformation des Menthylrestes eine gewisse Diastereoselektivität aufweisen. Auch diese Synthese fand in Anlehnung an den Artikel von Böhme^[85] mit Kalium-*tert.*-butanolat in THF statt. Der gewünschte Menthylester **142** wurde dabei aber nicht erhalten und so entfielen auch die folgenden Schritte des Austauschs des Menthylrestes durch ein Amin und der dann folgende Schwefel-Sauerstoff-Austausch mit Lawessons Reagenz.

Schema 2-94: Versuch der Bildung des Mentylesters **142**

2.10 Zellphysiologische Untersuchungen der synthetisierten neuen Kaliumkanalöffner^[86]

Die zellphysiologischen Untersuchungen der Wirkstoffe an den verschiedenen Kombinationen aus Rezeptoreinheit und Kanaleinheit werden im Arbeitskreis von Prof. Dr. H. Lemoine am Institut für Lasermedizin der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf durchgeführt. Dabei liegt das Augenmerk zum einen auf den Radioligandbindungsstudien ($[^3\text{H}]\text{P1075}$), die zur Ermittlung der Bindungsaffinität (K_D bzw. $\text{p}K_D$) der Substanzen zum entsprechenden SUR dienen, und zum anderen darauf, wie die Kanaleinheiten auf diese Bindung reagieren. Das Öffnen und Schließen des Kaliumkanals lässt sich am Membranpotential der entsprechenden Zelle ablesen. Dazu wird auf ein spezielles Fluoreszenzverfahren zurückgegriffen, bei dem der Fluoreszenzfarbstoff DiBAC₄(3) Verwendung findet. Zur Kontrolle der agonistischen Wirkung einer Substanz wird eine Blindprobe mit dem Antagonisten Glibenclamid **1** durchgeführt. Mit Hilfe der Fluoreszenzmessung lässt sich die halbmaximal wirksame Konzentration der jeweiligen Substanz ermitteln (EC_{50} bzw. pEC_{50}). Die für diese *in vitro*-Untersuchungen verwendeten HEK293-Zellen (human embrionic kidney) exprimieren stabil die murine Kaliumkanal/Rezeptor-Kombination SUR2B/ $\text{K}_{\text{ir}}6.1$ ^[87], welche stellvertretend für die Zellen der glatten Gefäßmuskulatur untersucht werden, die CHO-Zellen (chinese hamster ovary) die menschliche Kaliumkanal/Rezeptor-Kombination SUR1/ $\text{K}_{\text{ir}}6.2$.

In den folgenden Teilkapiteln sind alle im Zuge dieser Arbeit synthetisierten Verbindungen aufgeführt, wobei nicht an allen jede Art von Messung durchgeführt wurde.

2.10.1 Physiologische Ergebnisse der Diazoxid-Derivate

In den nachstehenden Tabellen sind alle Ergebnisse^[86] der physiologischen Experimente aufgeführt, wobei leere Zellen bedeuten, dass die jeweilige Messung nicht durchgeführt wurde:

Tabelle 2-1: Vergleich der Bindungsaffinitäten (pK_D) und der Werte für die Hyperpolarisation des Membranpotentials (pEC_{50}) an HEK293-Zellen (SUR2B/ $K_{ir}6.1$) der alkylierten Diazoxid-Derivate im Vergleich mit Diazoxid **4**

Diazoxid-Derivate		HEK293-Zellen (SUR2B/ $K_{ir}6.1$)				CHO-Zellen (SUR1/ $K_{ir}6.2$)		Selektivität
[³ H]P1075 Radioligandbindung		DiBAC ₄ (3) Membranpotentialeffekt		DiBAC ₄ (3) Membranpotentialeffekt		Δ ASD	
		Nr.	R	pK_D	ASD	pEC_{50}	ASD		
4	CH ₃	4.97	0.02	5.14	0.02	4.72	0.02	0.42	0.03
15a	Cyclohexyl	5.85	0.02	5.65	0.02	4.31	0.06	1.34	0.06
15b	Cyclohexylmethyl	5.94	0.03	5.83	0.03	4.32	0.08	1.51	0.08
15c	Cyclopentyl	6.23	0.03	6.09	0.02	5.39	0.02	0.70	0.03
15d	Cyclopentylmethyl	5.97	0.03	5.66	0.03	4.43	0.02	1.23	0.04
15e	Cyclobutyl	6.02	0.02	6.22	0.02	5.14	0.02	1.08	0.03
15f	Cyclobutylmethyl	5.86	0.02	5.84	0.02	5.09	0.04	0.75	0.05
15g	Cyclopropyl	5.65	0.02	6.04	0.03	5.47	0.02	0.57	0.04
15h	4- <i>tert.</i> -Butylcyclohexyl	4.50	0.09	-	-	-	-	-	-
15j	Pentyl	5.65	0.04	-	-	-	-	-	-
15k	Ethenyl	5.07	0.06	-	-	-	-	-	-
15l	1-Butenyl	5.32	0.02	5.46	0.02	4.67	0.02	0.79	0.03
15m	2-Methylprop-1-enyl	5.67	0.02	5.41	0.02	3.55	0.07	1.86	0.07

$\Delta = pEC_{50}(\text{SUR2B}/K_{ir}6.1) - pEC_{50}(\text{SUR1}/K_{ir}6.2)$, ASD = asymptotische Standardabweichung (asymptotic standard deviation)

Tabelle 2-2: Vergleich der Bindungsaffinitäten (pK_D) an HEK293-Zellen (SUR2B/ $K_{ir}6.1$) der heteroalkylierten Diazoxid-Derivate

Diazoxid-Derivate		HEK293-Zellen (SUR2B/ $K_{ir}6.1$)
[³ H]P1075 Radioligandbindung	
Nr.	R	pK_D	ASD
17c	Methoxyethyl	4.58	0.02
17d	Ethoxymethyl	4.28	0.03

ASD = asymptotische Standardabweichung (asymptotic standard deviation)

Tabelle 2-3: Vergleich der Bindungsaffinitäten (pK_D) und der Werte für die Hyperpolarisation des Membranpotentials (pEC_{50}) an HEK293-Zellen (SUR2B/ $K_{ir}6.1$) der aromatisch substituierten Diazoxid-Derivate

Diazoxid-Derivate		HEK293-Zellen (SUR2B/ $K_{ir}6.1$)				CHO-Zellen (SUR1/ $K_{ir}6.2$)		Selektivität
[³ H]P1075 Radioligandbindung		DiBAC ₄ (3) Membranpotentialeffekt		DiBAC ₄ (3) Membranpotentialeffekt			
Nr.	R	pK_D	ASD	pEC_{50}	ASD	pEC_{50}	ASD	Δ	ASD
19a	Phenyl	5.17	0.03	4.98	0.03	4.34	0.03	0.64	0.05
19b	Benzyl	5.57	0.03	5.55	0.03	4.31	0.01	1.24	0.03
19c	4-Nitrobenzyl	5.30	0.03	-	-	-	-	-	-
19e	2-Phenylethyl	5.43	0.03	-	-	-	-	-	-
19f	<i>rac</i> -1-Phenylethyl	5.62	0.03	-	-	-	-	-	-
19g	(<i>S</i>)-1-Phenylethyl	-	-	-	-	-	-	-	-
19h	(<i>R</i>)-1-Phenylethyl	-	-	-	-	-	-	-	-
19i	2-(3-Methoxyphenyl)ethyl	5.36	0.03	-	-	-	-	-	-
19n	Naphthalin-2-ylmethyl	4.16	0.15	-	-	-	-	-	-
19o	6-Methoxynaphthalin-2-yl	zu lipophil für Messungen							
19p	Pyridin-2-yl	3.92	0.05	-	-	-	-	-	-
19q	Thiophen-2-yl	5.41	0.02	5.13	0.02	4.30	0.02	0.83	0.03
19r	Thiophen-2-ylmethyl	5.57	0.06	-	-	-	-	-	-

$\Delta = pEC_{50}(\text{SUR2B}/K_{ir}6.1) - pEC_{50}(\text{SUR1}/K_{ir}6.2)$, ASD = asymptotische Standardabweichung (asymptotic standard deviation)

Aufgrund der Ergebnisse können einige Schlussfolgerungen gezogen werden:

- Die Verbindungen **15a**, **15c**, **15e** und **15g** variieren bezüglich der Ringgrößen und weisen allesamt eine höhere Affinität und einen größeren Einfluss auf das Membranpotential auf als das Stammdiazoxid **4**. Dabei liegen die Konzentrationen im submikromolaren Bereich und erreichen damit fünf- bis zehnmal so hohe Wirksamkeit an HEK293-Zellen wie **4**. Dennoch fällt der Zuwachs der Wirkung an CHO-Zellen im Vergleich schwächer aus, das heißt, die Selektivität ist im Vergleich mit **4** signifikant gestiegen. Im Vergleich mit kleineren Ringgrößen weist **15a** eine geringfügig kleinere Wirksamkeit auf, allerdings eine deutlich niedrigere an CHO-Zellen.
- Die Einführung einer Methylengruppe zwischen Diazoxid-Grundstruktur und Rest in der 3-Position zur Erhöhung des sterischen Anspruchs und der Flexibilität hat deutliche Auswirkungen auf die Affinität und die Wirksamkeit. Wird **19a** mit **19b** verglichen, so zeigt sich für **19b** eine vierfach höhere Selektivität als bei **19a**. Diese Beobachtung zeigt sich auch bei den Verbindungen **19q-r**. Die direkte Bindung eines Phenylrings an das Diazoxid-Grundgerüst scheint für Affinität und Wirksamkeit nicht von Vorteil zu sein.
- Die Verbindungen **15b**, **15d** und **15f** zeigen eine klare Abhängigkeit zwischen Ringgröße und Selektivität. Je größer der Cycloalkylring ist, desto höher ist die Selektivität. Dabei bleibt die Aktivität am SUR2B-K_{ATP}-Kanal relativ konstant, aber die Affinität am SUR1-K_{ATP}-Kanal sinkt deutlich. Die Selektivität steigert sich bis zu Verbindung **15b** auf 1.51.
- Keine der aufgeführten Verbindungen weist eine Selektivität zugunsten der SUR1-K_{ATP}-Kanäle auf, wie es bei mit Verbindung **7** vergleichbaren Derivaten der Fall ist.
- Ein sehr rigider Rest wie in Verbindung **15h** senkt die Affinität immens.
- Die alkyl- oder alkenylsubstituierten Derivate **15j-m** weisen ebenfalls relativ hohe Affinitäten auf. Die Tendenzen zeigen, dass diese mit zunehmender Verzweigung und Größe des Restes immer mehr ansteigt. Verbindung **15m** besitzt an SUR1-K_{ATP}-Kanälen nur eine äußerst schwache Wirksamkeit, weswegen die Selektivität auf 1.86 (72-fach höhere Wirkung an SUR2B als an SUR1) ansteigt.

- Die Einführung von Etherfunktionen (**17c-d**) lässt die Affinität stark sinken (Vergleich mit **15j**).
- Bei den aromatisch und heteroaromatisch substituierten Diazoxiden ähneln sich die Affinitäten. Werden die aromatischen Reste zu groß (**19n**), fällt die Affinität stark ab. Ebenso ist das Derivat mit einem Pyridinrest (**19p**) kaum affin.

Tabelle 2-4: Vergleich der Bindungsaffinitäten (pK_D) an HEK293-Zellen (SUR2B/ K_r 6.1) der verbrückten Diazoxid-Derivate

Diazoxid-Derivate		HEK293-Zellen (SUR2B/ K_r 6.1)
$[^3\text{H}]$ P1075 Radioligandbindung	
Nr.	R	pK_D	ASD
29c		zu lipophil für Messungen	
29e		5.05	0.05
29f		-	-

ASD = asymptotische Standardabweichung (asymptotic standard deviation)

Eine Interpretation bzw. ein Vergleich der Daten der zweikernigen Diazoxide ist aufgrund fehlender untersuchter analoger Substanzen nicht möglich. Prinzipiell ist eine signifikante Bindungsaffinität zu beobachten. Wichtig ist es hier, einigermaßen

wasserlösliche Derivate zu synthetisieren, für die die gewählte Untersuchungsmethode geeignet ist.

2.10.2 High Performance Computing der Volumina der Diazoxid-Derivate

Das Verhältnis zwischen der Größe des jeweiligen Restes in der 3-Position der Diazoxid-Derivate und deren Bindungsaffinität wurde mittels High Performance Computing (HPC) untersucht. Dabei wurden aufgrund der Dichtefunktionaltheorie (DFT), die hauptsächlich von W. Kohn^[88] entwickelt wurde, mit der Rechenmethode B3LYP/6-311G** und MOPAC-Parametern im Rechenprogramm Gaussian 03 die Volumina berechnet.

In Tabelle 2-5 werden die Ergebnisse zusammen mit den Bindungsaffinitäten aufgeführt.

Tabelle 2-5: Ergebnisse des High Performance Computing (HPC)

Diazoxid-Derivate		MOPAC-Rechnungen (B3LYP/6-311G**)		HEK293-Zellen (SUR2B/K _{ir} 6.1)		Selektivität
Volumen pro Molekül	Volumen des Restes R	[³ H]P1075 Radioligandbindung			
Nr.	R	V [Å ³]	V [Å ³]	pK _D	ASD	Δ	ASD
15a	Cyclohexyl	352.08	133.06	5.85	0.02	1.34	0.06
15b	Cyclohexylmethyl	416.35	197.32	5.94	0.03	1.51	0.08
15c	Cyclopentyl	340.81	121.78	6.23	0.03	0.70	0.03
15d	Cyclopentylmethyl	338.42	119.40	5.97	0.03	1.23	0.04
15e	Cyclobutyl	326.11	107.08	6.02	0.02	1.08	0.03
15f	Cyclobutylmethyl	334.76	115.74	5.86	0.02	0.75	0.05
15g	Cyclopropyl	312.56	93.53	5.65	0.02	0.57	0.04
15m	2-Methylprop-1-enyl	250.88	31.85	5.67	0.02	1.86	0.07

Aus den Ergebnissen ergibt sich kein direkter Zusammenhang der Volumina der Reste mit der jeweiligen Bindungsaffinität des entsprechenden Diazoxid-Derivats. Es ist jedoch eine leichte Tendenz zu beobachten, dass größere Reste eine etwas höhere Affinität aufweisen. Abgesehen von einer Ausnahme bei **15m** lässt sich sagen, dass sie Selektivität bei größeren Resten tendenziell höher ist.

Abbildung 2-1: Abhängigkeit der Bindungsaffinität pK_D und der Selektivität Δ vom Volumen des Restes R

2.10.3 Physiologische Ergebnisse der Benzothiazol-Derivate

In der nachstehenden Tabelle sind die Ergebnisse^[86] der physiologischen Experimente aufgeführt:

Tabelle 2-6: Vergleich der Bindungsaffinitäten (pK_D) und der Werte für die Hyperpolarisation des Membranpotentials (pEC_{50}) an HEK293-Zellen (SUR2B/ $K_{ir}6.1$) der Benzothiazol-basierten Thioamide

Benzothiazol-Thioamide			HEK293-Zellen (SUR2B/ $K_{ir}6.1$)				CHO-Zellen (SUR1/ $K_{ir}6.2$)		Selektivität
$[^3H]P1075$ Radioligandbindung		DiBAC ₄ (3) Membranpotentialeffekt		DiBAC ₄ (3) Membranpotentialeffekt			
Nr.	R ¹	R ²	pK_D	ASD	pEC_{50}	ASD	pEC_{50}	ASD	Δ	ASD
41c	Me	Et	4.83	0.03	5.07	0.02	3.45	0.09	> 1.4	-
41d	Me	<i>t</i> Bu	5.39	0.03	5.45	0.03	3.30	0.02	> 2.0	-
41g	Et	Et	5.03	0.03	5.14	0.03	3.69	0.03	> 1.3	-
41h	Et	<i>t</i> Bu	5.10	0.04	-	-	-	-	-	-

$\Delta = pEC_{50}(SUR2B/K_{ir}6.1) - pEC_{50}(SUR1/K_{ir}6.2)$, ASD = asymptotische Standardabweichung (asymptotic standard deviation)

Tabelle 2-7: Vergleich der Bindungsaffinitäten (pK_D) an HEK293-Zellen (SUR2B/ $K_{ir}6.1$) der methoxysubstituierten Benzothiazol-basierten Thioamide

Benzothiazol-Thioamide			HEK293-Zellen (SUR2B/ $K_{ir}6.1$)
$[^3H]P1075$ Radioligandbindung	
Nr.	X ¹	X ²	pK_D	ASD
43a	OCH ₃	H	4.58	0.02
43b	H	OCH ₃	4.28	0.03

ASD = asymptotische Standardabweichung (asymptotic standard deviation)

Tabelle 2-8: Vergleich der Bindungsaffinitäten (pK_D) an HEK293-Zellen (SUR2B/ $K_{ir}6.1$) der „ungespacerten“ Benzothiazol-basierten Thioamide

Benzothiazol-Thioamide		HEK293-Zellen (SUR2B/ $K_{ir}6.1$)
[³ H]P1075 Radioligandbindung	
Nr.	R	pK_D	ASD
45a	2-Chlorethyl	4.03	0.03
45b	Norbornyl	4.24	0.03
45f	3-Nitrophenyl	3.94	0.15

ASD = asymptotische Standardabweichung (asymptotic standard deviation)

Zum Vergleich und um zu zeigen, dass die Thioamid-Funktion essentiell für die Wirksamkeit ist, werden die Messergebnisse der Benzothiazol-basierten Amide in Tabelle 2-9 aufgeführt.

Tabelle 2-9: Vergleich der Bindungsaffinitäten (pK_D) und der Werte für die Hyperpolarisation des Membranpotentials (pEC_{50}) an HEK293-Zellen (SUR2B/ $K_{ir}6.1$) der Benzothiazol-basierten Amide

Benzothiazol-Amide		HEK293-Zellen (SUR2B/ $K_{ir}6.1$)				CHO-Zellen (SUR1/ $K_{ir}6.2$)		Selektivität
[³ H]P1075 Radioligandbindung		DiBAC ₄ (3) Membranpotentialeffekt		DiBAC ₄ (3) Membranpotentialeffekt			
Nr.	R'	pK_D	ASD	pEC_{50}	ASD	pEC_{50}	ASD	Δ	ASD
51	H	4.12	0.02	-	-	-	-	-	-
52	Me	4.30	0.03	3.97	0.02	3.5	0.1	-*	-*

Δ = $pEC_{50}(\text{SUR2B}/K_{ir}6.1) - pEC_{50}(\text{SUR1}/K_{ir}6.2)$, ASD = asymptotische Standardabweichung (asymptotic standard deviation), * = pEC_{50} -Werte sind extrapoliert worden

Die Messergebnisse lassen die folgenden Schlussfolgerungen zu:

- Im Vergleich mit anderen „ungespacerten“ Verbindungen bewegen sich die Bindungsaffinitäten von **45a-b** und **45f** in gleichen Größenordnungen. Nitrogruppen oder Halogene führen zu keiner Steigerung der Affinitäten. Die

Affinitäten der „gespacerten“ Thioamide sind höher als die der „ungespacerten“ Thioamide.

- Die „gespacerten“ Thioamide **41c-d** und **41g-h** weisen gute Affinitäten und Wirkungen am SUR2B-K_{ATP}-Kanal auf, während die Wirksamkeit am SUR1-K_{ATP}-Kanal sehr gering ist. Dadurch kommen hohe Selektivitäten, die teilweise sogar bei mehr als 100-facher Bevorzugung des SUR2B-K_{ATP}-Kanals liegen (**41d**) zustande. Besonders bemerkenswert ist die äußerst schwache Wirkung ($pEC_{50} = 2.5 \pm 1.5 \%$) von **41d** am SUR1-K_{ATP}-Kanal. Das Maximum der Affinität bei Variation des Restes R¹ scheint zwischen einer Methyl- und einer Ethylgruppe zu liegen, während eine *tert.*-Butylgruppe als R² stets zu einer höheren Affinität führt als eine Ethylgruppe.
- Methoxygruppen am Aromaten haben einen gewissen Einfluss auf die Affinität, wobei diese in der 6-Position zu keiner Änderung und in der 5-Position zu einem Anstieg führen (Vergleich mit Verbindung **19a** der Publikation ($pK_D = 4.31 \pm 0.03$)).
- Die Affinitäten der analogen Amide **51** und **52** bleiben stark hinter denen der Thioamide zurück, was die These stützt, dass die Thioamidfunktion das essentielle Pharmakophor ist.

Die Kristallstrukturanalyse der wirksamsten und selektivsten Thioamide aus der Benzothiazolreihe, Verbindungen **41c-d**, wird herangezogen, um die wichtigsten strukturellen Aspekte für einen erfolgreichen Kaliumkanalöffner zu bestimmen (Abbildung 2-2). Der Wasserstoffbrücken-Donor (NH der Thioamidfunktion) und der dazugehörige Wasserstoffbrücken-Akzeptor (Stickstoffatom im Benzothiazol) bewirken eine Aggregation des Moleküls zu seinem Dimer.

Abbildung 2-2: Kristallstruktur von **41c** (oben) und **41d** (unten) mit eingezeichneten intermolekularen Wasserstoffbrücken-Bindungen

Bei näherer Betrachtung scheint es drei wichtige Eigenschaften der Substanzen zu geben, die einen großen Einfluss auf die Affinitäten und Wirksamkeiten haben:

- 1.) Eine Domäne, die durch Wasserstoffbrückenbindung gekennzeichnet ist
- 2.) Eine Region mit hoher Elektronendichte, die aus den freien Elektronenpaaren des Schwefelatoms resultiert
- 3.) Eine lipophile Seitenkette an der Thioamid-Funktion

Aufgrund dieser gemachten Beobachtungen wurde das Drei-Bindungsstellen-Modell entwickelt, welches durch die Experimente in dieser Arbeit untermauert wurde.

Abbildung 2-3: Drei-Bindungsstellen-Modell des Kaliumkanalöffners **41d**

2.10.4 Physiologische Ergebnisse weiterer Thioamide und Amide benzanellierter Heterozyklen

Die physiologischen Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst.

Tabelle 2-10: Vergleich der Bindungsaffinitäten (pK_D) und eines Wertes für die Hyperpolarisation des Membranpotentials (pEC_{50}) an HEK293-Zellen (SUR2B/ K_{ir} 6.1) weiterer Thioamide und Amide

Weitere Thioamide und Amide		HEK293-Zellen (SUR2B/ K_{ir} 6.1)				CHO-Zellen (SUR1/ K_{ir} 6.2)	
		$[^3H]P1075$ Radioligandbindung		DiBAC ₄ (3) Membranpotentialeffekt		DiBAC ₄ (3) Membranpotentialeffekt	
Nr.		pK_D	ASD	pEC_{50}	ASD	pEC_{50}	ASD
63		4.42	0.03	-	-	-	-
64		5.33	0.03	-	-	-	-
70		3.88	0.04	8.5 % (Wildtyp)	1.3 %	4.9 %	1.7 %
77		4.92	0.03	-	-	-	-

ASD = asymptotische Standardabweichung (asymptotic standard deviation)

Auch hier zeigt sich deutlich die Notwendigkeit der Thioamidfunktion im Vergleich zu dem analogen Amid. Das Thiophen-Derivat **77** ist weniger affin als das Benzofuran-Derivat **64**, was wahrscheinlich daran liegt, dass das Schwefelatom weicher und damit ein schwächerer Wasserstoffbrücken-Akzeptor ist, wenn dies auf das Drei-

Bindungsstellen-Modell aus Abbildung 2-3 angewendet wird. Bemerkenswert ist der große Membranpotentialeffekt von **70** am Wildtyp der HEK293-Zellen, der fast im nanomolaren Bereich liegt.

2.10.5 Physiologische Ergebnisse der Benzodithiepin-Derivate

Die beiden folgenden Tabellen beinhalten die Affinitäten der Benzodithiepine und der entsprechenden Sulfoxide.

Tabelle 2-11: Vergleich der Bindungsaffinitäten (pK_D) an HEK293-Zellen (SUR2B/ $K_{ir}6.1$) der Benzodithiepin-basierten Thioamide

Benzodithiepin-Thioamide		HEK293-Zellen (SUR2B/ $K_{ir}6.1$)	
		$[^3H]P1075$ Radioligandbindung	
Nr.		pK_D	ASD
110a		4.587	0.042
111a		4.34	0.02
111b		4.53	0.04
111d		3.33	0.25

111f		4.678	0.062
111h		zu lipophil für Messungen	
111i		4.25	0.03
111j		4.60	0.04
113a		3.79	0.05
113b		4.995	0.036

ASD = asymptotische Standardabweichung (asymptotic standard deviation)

Es können erste Schlussfolgerungen aus diesen Messwerten gezogen werden, wobei für die Verifikation derselben noch mehr Derivate benötigt würden:

- Offene aliphatische Reste weisen eventuell eine Tendenz auf, dass längere Ketten zu höheren Affinitäten führen (Vergleich **111a** mit **111b**).

- Cyclische Reste dürfen zum Erhalt der Affinität nicht zu groß sein (Vergleich **111d** mit **111f** und **111j**).
- Die Einführung eines Sauerstoffatoms in den Spirocyclus führt dazu, dass die Affinität signifikant sinkt (Vergleich **111f** mit **111i**).
- Die Bildung eines Sulfoxids führt bei den offenen aliphatischen Resten zu einem Abfall der Affinität, bei cyclischen Resten scheint dies zu einem Anstieg zu führen (Vergleich **111a** mit **113a** und **111f** mit **113b**).

2.10.6 Physiologische Ergebnisse der Thio- und Isothiochromanon-Derivate

Die physiologischen Messdaten können den folgenden Tabellen entnommen werden.

Tabelle 2-12: Vergleich der Bindungsaffinitäten (pK_D) an HEK293-Zellen (SUR2B/ $K_{ir}6.1$) der Thio- und Isothiochromanon-basierten Thioamide

Thio- und Isothiochromanon-Thioamide					HEK293-Zellen (SUR2B/ $K_{ir}6.1$)	
					[³ H]P1075 Radioligandbindung	
Nr.	X ¹	X ²	R ¹	R ²	pK_D	ASD
135	S	CH ₂	H	Et	4.287	0.053
136b	CH ₂	S	Me	<i>t</i> Bu	4.181	0.026
137a	CH ₂	S	H	(<i>R</i>)-Cyclohexylethyl	5.185	0.049
137b	CH ₂	S	H	(<i>S</i>)-Cyclohexylethyl	4.891	0.029
138a	CH ₂	S	Me	(<i>R</i>)-Cyclohexylethyl	4.779	0.028
138b	CH ₂	S	Me	(<i>S</i>)-Cyclohexylethyl	4.190	0.029

ASD = asymptotische Standardabweichung (asymptotic standard deviation)

Tabelle 2-13: Vergleich der Bindungsaffinitäten (pK_D) an HEK293-Zellen (SUR2B/ K_{ir} 6.1) der Thioamide der Benzoesäure-Derivate

Thioamide der Benzoesäure-Derivate		HEK293-Zellen (SUR2B/ K_{ir} 6.1)
[³ H]P1075 Radioligandbindung	
Nr.	R	pK_D	ASD
139a	<i>t</i> Bu	4.441	0.024
139b	(<i>R</i>)-Cyclohexylethyl	5.079	0.035
139c	(<i>S</i>)-Cyclohexylethyl	5.456	0.045

ASD = asymptotische Standardabweichung (asymptotic standard deviation)

Tabelle 2-14: Vergleich der Bindungsaffinitäten (pK_D) an HEK293-Zellen (SUR2B/ K_{ir} 6.1) der Thioamide der methoxysubstituierten Isothiochromanon-basierten Thioamide

Thioamide der methoxysubstituierten Isothiochromanone		HEK293-Zellen (SUR2B/ K_{ir} 6.1)
[³ H]P1075 Radioligandbindung	
Nr.	R	pK_D	ASD
140b	Et	3.650	0.083
140c	Pr	3.467	0.095

ASD = asymptotische Standardabweichung (asymptotic standard deviation)

Es lassen sich die folgenden Tendenzen aus den Messwerten ableiten:

- Isothiochromanone sind affiner als Thiochromanone.
- Ein Stereozentrum am Thioamid hat einen signifikanten Einfluss auf die Affinität.
- Erstaunlich ist die Tatsache, dass die Benzoesäure-Derivate über eine ähnlich hohe Affinität, teilweise sogar höhere verfügen als die geschlossenen Isothiochromanone.
- Methoxysubstituenten verringern die Bindungsaffinität erheblich.

- Bei den Isothiochromanonen **137a** und **137b** fällt auf, dass das Derivat mit dem (*R*)-konfigurierten Rest R^2 eine signifikant höhere Bindungsaffinität aufweist als das Derivat mit dem (*S*)-konfigurierten Rest R^2 . Bei den Benzoessäure-Derivaten verhält sich dieser Sachverhalt umgekehrt. Es muss erwähnt werden, dass das Kohlenstoffatom in der 3-Position des Isothiochromanons sowie das dem Schwefelatom benachbarte chirale Kohlenstoffatom der Benzoessäure epimere Zentren darstellen und daher Diastereomerenmische untersucht wurden.

Aufgrund der Kristallstrukturanalysen, die zum Teil im Zuge einer parallel verlaufenden Arbeit^[30] erstellt wurden, zeigt sich, dass das Drei-Bindungsstellen-Modell der Benzothiazole auch auf die Isothiochromanone und Benzoessäuren anwendbar ist. Auch hier liegen die entsprechenden Wasserstoffbrückenbindungen, eine hohe Elektronendichte am Schwefelatom sowie ein lipophiler, sterisch anspruchsvoller Rest vor. Die Strukturen der Isothiochromanone und der Benzoessäuren verhalten sich diesbezüglich sehr ähnlich, was an den folgenden Abbildungen zu erkennen ist.

Abbildung 2-4: Kristallstruktur von *N*,3-Dimethyl-4-oxo-3,4-dihydro-1*H*-2-benzothiopyran-3-carbothioamid^[30]

Abbildung 2-5: Kristallstruktur von 3-Methyl-4-oxo-*N*-propyl-3,4-dihydro-1*H*-2-benzothiopyran-3-carbothioamid^[30]

Abbildung 2-6: Kristallstruktur von **139a** in monomerer (oben) und in für Carbonsäuren typischer dimerer Struktur

Aufgrund der oben gezeigten Strukturen lässt sich das Drei-Bindungsstellen-Modell an die Isothiochromanone und die analogen Benzoesäuren anpassen, wobei nicht geklärt wurde, inwiefern die Carboxyl-Funktion einen Einfluss auf das Bindungsverhalten der Substanzen am Rezeptor hat, da sie sich in der Kristallstruktur in großer Ferne zu den restlichen wichtigen Strukturelementen befindet.

Abbildung 2-7: Angepasstes Drei-Bindungsstellen-Modell für die Isothiochromanon-Thioamide (links) und die Benzoesäure-basierten Thioamide (rechts)

3. Zusammenfassung / Summary

3.1 Zusammenfassung

Das Ziel dieser Arbeit ist die Synthese neuartiger Kaliumkanalöffner für den K_{ATP} -Kanal (SUR2B/Kir6.1), die durch ihre Wirkungsweise zu einer Erschlaffung der glatten arteriellen Gefäßmuskulatur führen und damit eine Senkung des Blutdrucks zur Folge haben. Im Rahmen dieser Arbeit konnten insgesamt 65 verschiedene Substanzen synthetisiert werden, die im Anschluss am Institut für Lasermedizin der HHU Düsseldorf von Prof. Lemoine und seinen Mitarbeitern erfolgreich auf ihre Affinität und Wirksamkeit untersucht werden konnten.

Die große Anzahl an neuen Diazoxid-Derivaten führte zu umfassenden Ergebnissen bezüglich ihrer Wirkungsweise. Diese zeigten, dass kleine Reste an der 3-Position des Diazoxid-Gerüsts eine Steigerung der Affinitäten (bis zum 10-fachen im Vergleich mit Diazoxid **4**) an beiden untersuchten Kaliumkanal-Typen zur Folge haben, während sterisch sehr anspruchsvolle und unpolare Reste zwar ebenfalls zu einer Affinitätssteigerung am SUR2B-Typ, aber gleichzeitig zu einer Senkung bzw. Auslöschung der Affinität am SUR1-Typ führten. Dabei zeigen bis auf drei Ausnahmen alle einkernigen Diazoxid-Derivate höhere Bindungsaffinitäten als die Stammsubstanz Diazoxid **4**, und in jedem Fall eine zum Teil erheblich höhere Selektivität bezüglich der unterschiedlichen Kaliumkanal-Typen, die stets auf der Seite des SUR2B-Typs lag, was auch gewünscht war. Der Membranpotentialeffekt der Stammsubstanz Diazoxid **4** ist am SUR2B-Typ etwa 2.6-mal höher als am SUR1-Typ, während die in dieser Arbeit synthetisierten Verbindungen eine bis zu 72-mal größere Wirkung am SUR2B-Typ erzielen als am SUR1-Typ. Das Konzept der mehrkernigen Diazoxide, die zeitgleich an mehreren Rezeptoreinheiten binden sollten, scheint möglich, jedoch erreichten die Bindungsaffinitäten nicht die erhofften höheren Werte.

Abbildung 3-1: Diazoxid **4** ($R^1 = \text{CH}_3$) und die entsprechenden Derivate

Außerdem wurde ein Modell^[86] entwickelt, welches drei verschiedene Bindungsstellen an einem SUR-Protein postuliert; eine für Sulfonylharnstoffe (Antagonisten), eine für Kaliumkanalöffner (Agonisten wie die benzenellierten Heterocyclen dieser Arbeit) und eine neue separate und spezifische Bindungsstelle für Diazoxid **4** und seine Derivate.

Abbildung 3-2: Bindungsaffinitäten (pK_D), Konzentrationen bei halbmaximaler Wirkung (pEC_{50}) und Selektivität der untersuchten Diazoxid-Derivate im Vergleich mit Diazoxid **4**

Im Zuge der physiologischen Untersuchungen einer Serie neuer Benzothiazole, die ebenfalls im Rahmen dieser Arbeit synthetisiert wurden, wurde ein neuartiges Drei-Bindungsstellen-Modell entwickelt, welches auf Struktur-Aktivitäts-Beziehungen und Kristallstrukturanalysen beruht. Dieses Modell berücksichtigt die Hauptmerkmale der hier entwickelten Kaliumkanalöffner und scheint durch die physiologischen Ergebnisse, die für andere benzenellierte Heterocyclen, unter anderem Isothiochromanone (siehe unten), erhalten wurden, verifiziert worden zu sein. Gemäß dem Drei-Bindungsstellen-Modell sollten SUR2B-selektive Kaliumkanalöffner einen lipophilen, sterisch anspruchsvollen Rest, einen Bereich mit Wasserstoffbrückenbindungen sowie eine Region hoher Elektronendichte aufweisen, die zusammen das aktive Pharmakophor bilden.

Abbildung 3-3: Drei-Bindungsstellen-Modell am Beispiel von **41d**

Zusammen mit den Verbindungen einer Vorgängerarbeit^[5] wurden Benzofuran-, Benzothiazol- und Benzothiophen-Derivate mit einer Thioamid-Funktion synthetisiert und erstmals auf ihre Wirksamkeit als Kaliumkanalöffner untersucht. Dabei wurden die besten Ergebnisse für die Benzothiazole erzielt, bei denen der Heterocyclen über eine verzweigte aliphatische Brücke mit der Thioamid-Funktion verbunden ist, die nur ein Kohlenstoff-Atom enthält. Die Einführung dieser sterisch anspruchsvollen, lipophilen Reste führt zu teils sehr hohen Selektivitäten. Teilweise ist die Wirkung am SUR2B-Typ mehr als 100-mal höher als am SUR1-Typ (**41d**). Diese Selektivität

übersteigt also bei den Benzothiazolen die Selektivität des in der klinischen Anwendung befindlichen Diazoxids **4** bei Weitem.

Abbildung 3-4: Bindungsaffinitäten (pK_D), Konzentrationen bei halbmaximaler Wirkung (pEC_{50}) und Selektivität der untersuchten Thioamide mit benzenellierten heterocyclischen Grundstrukturen

Die neuen Thio- und Isothiochromanone, die im Zuge dieser Arbeit synthetisiert wurden, wurden ebenfalls erstmals in Hinsicht auf ihre Affinität an den entsprechenden Kaliumkanälen untersucht. Basierend auf diesen Studien und unterstützt durch zusätzliche Kristallstrukturanalysen einiger repräsentativer Verbindungen dieser Substanzklasse konnte das Drei-Bindungsstellen-Modell an die Isothiochromanone und gleichermaßen an die aus jenen entstandenen ringgeöffneten Carbonsäuren angepasst werden, um deren physiologische Aktivität sinnvoll zu begründen. Dieses Modell zeigt die bis dahin bekannten essentiell

notwendigen Strukturelemente potentieller Kaliumkanalöffner und kann daher zur Modellierung bzw. Synthesepaltung neuer Wirkstoffe herangezogen werden.

Abbildung 3-5: Angepasstes Drei-Bindungsstellen-Modell für die Isothiochromanon-Thioamide (links) und die Benzoesäure-basierten Thioamide (rechts)

Bei den Isothiochromanon-Thioamiden hat ein Stereozentrum, welches sich benachbart zur Thioamid-Funktion befindet (siehe Abb. 3-6), einen merklichen Einfluss auf die Bindungsaffinität. Dies konnte durch die Stereoisomere **138a** und **138b** verdeutlicht werden: erstere Verbindung, die am relevanten Stereozentrum (*R*)-konfiguriert ist, zeigt eine etwas höhere Affinität als **138b** mit einer (*S*)-Konfiguration. Dabei muss beachtet werden, dass beide Verbindungen durch das Stereozentrum im heterocyclischen Ring als Gemisch aus Diastereomeren (d.r. etwa 2:1) vorliegen.

Abbildung 3-6: Beispiele für die Affinität beeinflussende Stereozentren in der Stoffklasse der Isothiochromanone

Im Allgemeinen sind Isothiochromanone affiner als Thiochromanone. Bei den Bindungsaffinitäten fällt außerdem auf, dass Methoxygruppen am carboaromatischen Ring der Isothiochromanone die Affinität nahezu auslöschen. Dennoch ließen sich mit den Isothiochromanonen, die über einen ausreichend großen, lipophilen Rest an der Thioamid-Funktion verfügen, gute Bindungsaffinitäten mit pK_D -Werten von bis zu ca. 5.5 erreichen, was wiederum höher ist als die Affinität des Diazoxids **4**. Überraschenderweise sind Benzoesäure-Derivate, die zunächst durch Zufall über eine Öffnung des Isothiochromanonringes erhalten wurden, etwas affiner als die korrespondierenden geschlossenen Isothiochromanone.

Abbildung 3-7: Bindungsaffinitäten (pK_D) der untersuchten Thioamide mit Thio- und Isothiochromanon-Grundgerüsten

Die physiologischen Untersuchungen verschiedener Amide im Vergleich zu den Thioamiden ergaben, dass die Thioamid-Funktion für die Affinität und die Wirksamkeit essentiell ist. Somit wurde der entscheidende Status der funktionellen Gruppe als Pharmakophor bewiesen.

Insgesamt wurde eine Vielzahl neuer Substanzen, die sich stark in ihrer Struktur unterscheiden, durch mehrstufige Synthesen zugänglich gemacht und als Kaliumkanalöffner bewertet, wobei vielfältige aktive Wirkstoffe entdeckt wurden. Durch neue, in dieser Arbeit synthetisierte Diazoxid-Derivate konnte die Hypothese zweier unterschiedlicher Bindungsstellen am Kaliumkanal bestätigt werden. Die Thioamide mit heterocyclischen Grundstrukturen führten zur Entwicklung von Kaliumkanalöffnern mit hoher Affinität und – noch bemerkenswerter – hoher Selektivität. Ein Drei-Bindungsstellen-Modell wurde ausgehend von Struktur-

Aktivitäts-Beziehungen und Kristallstrukturanalysen abgeleitet und könnte sich als wertvolles Werkzeug zur Entwicklung neuer hochaktiver Kaliumkanalöffner erweisen.

3.2 Summary

This thesis aims at the synthesis of novel potassium channel openers for the K_{ATP} channel (SUR2B/Kir6.1) that cause the relaxation of smooth arterial muscles thus leading to a reduced blood pressure. In the course of the doctoral work, 65 different drugs could be synthesized, which were successfully evaluated for their binding affinity and efficacy by the group of Professor Lemoine at the Institute for Laser Medicine of the HHU Düsseldorf.

The variety of new diazoxide derivatives synthesized led to comprehensive results regarding their mode of action. These results showed that small residues in the 3-position of the diazoxide structure increased the affinity (up to 10-fold compared to diazoxide **4**) for both potassium-channel types that were tested. Sterically demanding and nonpolar residues increase the affinity at the SUR2B type, but decrease or even annihilate the affinity at the SUR1 type. All single-core diazoxide derivatives, except for three compounds, show higher binding affinities than the parent diazoxide **4**, and for all of them, a substantial and, in part, even exceptionally high selectivity regarding the two types potassium channels – in all cases in favor of the SUR2B type, as desired. The membrane potential effect of parent diazoxide **4** is 2.6-fold higher at the SUR2B type than the SUR1 type. The derivatives prepared in the course of this work exhibit an up to 72-fold higher effect at the SUR2B- than at the SUR1-type. The concept of the multicore diazoxides that are assumed to bind to several receptor units, seems realistic; however the observed affinities did not reach the anticipated degree.

Figure 3-1: Diazoxide **4** ($R^1 = \text{CH}_3$) and the corresponding derivatives

Furthermore, a model^[86] has been developed, which postulates three different binding sites at a SUR-protein: one for sulfonyl ureas (antagonists), one for potassium channel openers (agonists like the benzanellated heterocycles of this work), and a new separate binding site, specific for diazoxide **4** and its derivatives.

Figure 3-2: Binding affinities (pK_D), concentrations at half-maximal effect (pEC_{50}) and selectivity of the examined diazoxide derivatives in comparison with diazoxide **4**

In the course of the physiological testing of a series of new benzothiazoles, also synthesized in this thesis, a novel three-binding-site model was developed, based upon structure-activity-relationship and crystal structure analyses. The model takes into account the main characteristics of the potassium channel openers developed here and seems to be verified by the physiological results obtained for other benzenellated heterocycles, inter alia isothiochromanones (see below). According to the three-binding-site model, SUR2B-selective potassium channel opener should feature a lipophilic, bulky residue, a hydrogen-bonding domain, and a high-electron-density region, all together forming the active pharmacophore.

Figure 3-3: Three-binding-site model using the example of **41d**

Continuing the work in a preceding thesis,^[5] novel benzofuran-, benzothiazole- and benzothiophene-derivatives with a thioamide function were synthesized and, for the first time, evaluated as potassium channel openers. The best results were obtained with the benzothiazoles wherein the heterocycle is linked with the thioamide function by means of a branched aliphatic bridge containing just one carbon atom. The incorporation of sterically demanding lipophilic residues lead to partly enormous selectivity. In some cases the effect at the SUR2B type is more than 100-fold higher than at the SUR1 type (**41d**). This selectivity of the benzothiazoles exceeds the selectivity of the clinically used diazoxide **4** by far.

Figure 3-4: Binding affinities (pK_D), concentrations at half-maximal Effect (pEC_{50}) and selectivity of the examined thioamides with benzanellated heterocyclic structures

The new thiochromanones and isothiochromanones, also synthesized in the course of this work, were also evaluated for the first time with respect to their affinity at the corresponding potassium channels. Based upon these studies and supported by additional crystal structure analyses of some representative compounds of this series, the three-binding-site model of the benzothiazoles could be adjusted to the isothiochromanones in even to the ring-opened carboxylic acids derived therefrom, in order to rationalize their physiological activity. This model shows the hitherto known essential structural elements of potent potassium channel openers and therefore might be used for planning syntheses and modeling new active agents.

Figure 3-5: Adjusted three-binding-site model for the isothiochromanone thioamides (left) and the benzoic acid-based thioamides (right)

In the isothiochromanones, a stereogenic center adjacent to the thioamide function has a noticeable influence on the binding affinity. This is illustrated by the stereoisomers **138a** and **138b**: the former compound, (*R*)-configured at the relevant center, exhibits a somewhat higher affinity than **138b** with (*S*)-configuration. One has to be aware that both compounds are diastereomeric mixtures (d.r. approximately 2:1) due to the chiral center in the heterocyclic ring.

Figure 3-6: Influence of the absolute configuration on the affinity in the isothiochromanone series

In general, the isothiochromanones are more affine than the thiochromanones. Methoxy substituents in the carboaromatic ring of isothiochromanones nearly

extinguish the affinity. Nevertheless, isothiochromanones that feature a sufficiently voluminous and lipophilic residue at the thioamide group, provide high binding affinities with pK_D values up to about 5.5, which again is higher than the affinity of diazoxide **4**. It was quite surprising that benzoic acid derivatives obtained by serendipity due to opening of the isothiochromanone ring, are slightly more affine than the corresponding closed isothiochromanones.

Figure 3-7: Binding affinities (pK_D) of the studied thioamides with thio- and isothiochromanone structure

The physiological tests of several amides in comparison with thioamides reveal that the thioamide function is essential for the affinity and efficacy. Thus, the crucial role of this functional group as a pharmacophore has been proven.

In summary, a large variety of new drugs, highly different in their structure, was made available by multi-step syntheses and evaluated as potassium-channel openers, and

various active agents were identified. By means of new diazoxide derivatives synthesized in this thesis, the hypothesis of two different binding sites at the potassium channel could be verified. The thioamides with heterocyclic structures led to the development of potassium-channel openers with high affinity and – even more remarkable – high selectivity. A three-binding-site model deduced from structure-activity relationship and crystal structures might become a useful tool for developing new and highly active potassium channel openers.

4. Experimenteller Teil

4.1 Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Mitarbeitern des Arbeitskreises von Prof. Dr. M. Braun für das außerordentlich gute Arbeitsklima und für die zahlreichen fachlichen wie auch alltäglichen Gespräche bedanken.

Insbesondere möchte ich mich bei meinem langjährigen Laborkollegen Herrn Dr. T. Hediger, ohne den die Arbeit im „Männerlabor“ weit weniger Vergnügen und Abwechslung bereitet hätte, für das stets gute Arbeitsklima und seine Hilfsbereitschaft bedanken. Ohne ihn hätte es längst nicht so viel zu Lachen und Ausflüge in die verschiedenen Metalspielarten und musikalischen Katastrophen gegeben.

Für die Bereitstellung der zellphysiologischen Ergebnisse der dargestellten Verbindungen und eines aktuellen Arbeitsplatzrechners und für die gute Zusammenarbeit danke ich Herrn Prof. Dr. H. Lemoine sowie seinen Mitarbeitern Herrn Dr. C. Schmidt, Herrn A. Sachs und Frau D. Grittner des Instituts für Lasermedizin der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.

Weiterhin bedanke ich mich bei Herrn Dr. S. Beutner für die gut organisierte Zusammenarbeit bei der Betreuung verschiedenster chemischer Praktika und Seminare.

Nicht zuletzt danke ich meinen Praktikumsstudent/innen Frau M. Sc. A. Götzinger, Herrn B. Sc. S. Hildebrandt, Frau B. Sc. V. Grote, Herrn B. Sc. M. Franke und Frau D. Chrobok, die mich bei meiner Forschungstätigkeit tatkräftig unterstützt und auch neue Überlegungen eingebracht haben.

Ebenso gilt mein Dank allen aktuellen Mitarbeitern des Arbeitskreises. Herrn Dipl.-Chem. R. Opitz und Frau Dr. K. Weimann danke ich für die gute

Nachbarschaft und die zahlreichen interessanten Gespräche über das Sporttauchen. Frau Dipl.-Chem. A. Domann danke ich für ihre Bereitschaft mit verschiedenen Chemikalien oder Lösemitteln auszuhelfen, die Arbeit, die sie in unseren Kühlschränken gesteckt hat und für die Ruhe, die sie auszustrahlen vermochte. Herrn Dipl.-Chem. R. Visse möchte ich im Gegensatz dazu für die teils sehr lustige Abwechslung im Laboralltag danken wie beispielsweise Ausflüge in die Ichthyologie, Musik oder die neuesten Internetvorkommnisse. Für die Gespräche über die sportliche Qualität von Fortuna Düsseldorf und über das Verhalten in der Ehe danke ich Herrn Dipl.-Chem. M. Derks. Bei Herrn Dr. F. Kruska bedanke ich mich für seine Reiseerfahrungen, Unterstützung bei der Computer- und Softwareverwaltung und die humoristische Angriffsfläche, die sein Labor zu bieten hatte.

Frau S. Houben danke ich für die langjährige Unterstützung auf organisatorischem und bürokratischem Gebiet ebenso wie für ihre Fähigkeit den reibungslosen Ablauf der Forschungsarbeiten durch rechtzeitiges Auffüllen verschiedenster Materialien aufrecht zu erhalten. Außerdem danke ich ihr für verschiedene für mich durchgeführte Synthesen.

Bei Herrn E. Schönstein bedanke ich mich für die fast täglichen Kaffeepausen inklusive journalistischer Versorgung, für die zahlreichen privaten Gespräche und für die freizeithliche Abwechslung mittels abendlicher Spieleabende.

Den ehemaligen Mitarbeitern des Arbeitskreises möchte ich ebenfalls für die gute Einarbeitung in den Arbeitskreis und dessen Ablauf und die Kollegialität danken. Besonders hervorheben möchte ich hierbei Herrn Dr. S. Lachenicht für die langjährige Freundschaft und die Unterstützung bei computertechnischen Problemen bedanken. Herrn Dr. W. Kotter danke ich für die vielen geschichtlichen und musikalischen Ausflüge nach Feierabend.

Mein Dank gilt außerdem dem Arbeitsteam des Instituts für Anorganische Chemie I, namentlich Herrn Dr. P. Tommes und Herrn R. Bürgel, für die Anfertigung der Massenspektren und die durch sie erfolgte Einarbeitung in den Messbetrieb der Massenspektrometrie. Für die Aufnahme der NMR-Spektren danke ich Herrn P. Behm und Frau M. Beuer. Dem Serviceteam der Pharmazeutischen Chemie

danke ich für die Erstellung der Elementaranalysen. Bei Herrn Prof. Dr. W. Frank und Frau E. Hammes danke ich für die Anfertigung der Kristallstrukturanalysen.

Für die teilweise Durchsicht dieser Arbeit danke ich Herrn Dipl.-Chem. Raphael Opitz.

An dieser Stelle möchte ich meiner gesamten Familie den allergrößten Dank aussprechen, auch jenen, die diesen Tag leider nicht mehr miterleben können, aber dennoch immer an mich geglaubt haben. Sie alle haben mich in meinem Bestreben stets unterstützt und mir den Rückhalt gegeben, den ich brauchte. Ganz besonders möchte ich meiner lieben Ehefrau Janette danken, die mit mir schon jahrelang gemeinsam den Weg des Lebens bestreitet und mich immer vorbehaltlos und liebevoll unterstützt hat. Ohne sie wäre ich nie an der Position angekommen, an der ich jetzt stehe.

Meinem gesamten Freundeskreis danke ich für die vielen gemeinsamen Stunden in der Freizeit und die große Unterstützung die mir immer wieder entgegengebracht worden ist.

Danke!

4.2 Geräte

Für die durchgeführten Analysen, Synthesen und Reinigungen der behandelten Substanzen sind folgende Geräte und Chemikalien eingesetzt worden:

$^1\text{H-NMR}$:	Bruker Avance DRX - 200 (200 MHz)
	Bruker Avance III - 300 (300 MHz)
	Bruker Avance DRX - 500 (500 MHz / QNP- bzw. TBI-Kopf)
	Bruker Avance III - 600 (600 MHz)

¹³ C-NMR:	Bruker DRX-500 (125 MHz / QNP- bzw. TBI-Kopf) Bruker Avance III - 600 (150 MHz)
Massenspektrometrie:	GC/MS: GC/MS-System Finnigan Trace DSQ mit Finnigan Trace GC Ultra (Thermo Electron Corp.) EI: Varian MAT 8200, Triple-Quadrupol-Massenspektrometer TSQ 7000 (Finnigan MAT) ESI: Ion-Trap-API-Massenspektrometer Finnigan LCQ Deca (Thermo Quest) ESI (hochauflösend): UHR-QTOF maXis 4G (Bruker Daltonics) oder Bruker FT-ICR: APEX III (7.0 T) (Universität Bielefeld)
Elementaranalyse:	Perkin Elmer Series II CHN-Analyzer 2400
Dünnschichtchromatographie:	Aluminiumfolien beschichtet mit Kieselgel 60 und Fluoreszenzindikator F ₂₅₄ (Merck)
Säulenchromatographie:	Kieselgel 60 (0.04 – 0.063 mm) (Fluka, Macherey-Nagel)
Innenthermometer:	Hanna HI 93530

Drehschieberpumpe: Vacuubrand RD-4

4.3 Trocknung und Aufbewahrung von Lösemitteln

Dichlormethan

Zur Trocknung von Dichlormethan wird dieses in einem an die Stickstofflinie angeschlossenen Dephlegmator mehrere Stunden über Calciumhydrid zum Rückfluss erhitzt. Kurz vor Gebrauch wird das Dichlormethan in einen Vorlagekolben frisch abdestilliert und mittels einer sekurierten Spritze über die Serumkappe aus diesem entnommen.

Diethylether, Tetrahydrofuran

Technischer Ether wird zunächst mindestens einige Stunden über Kaliumhydroxid zum Rückfluss erhitzt und so vorgetrocknet und von Peroxiden befreit. Anschließend wird dieser abdestilliert und für mehrere Stunden in einem Kolben mit eingepresstem Natriumdraht (ca. 5 g/l) und einer Spatelspitze Benzophenon zum Rückfluss erhitzt bis die Abwesenheit von Wasser durch die tiefblaue Färbung des Benzophenylketylradikals angezeigt wird. Die erforderlichen Mengen werden frisch abdestilliert und mittels einer sekurierten Spritze über die Serumkappe aus dem Vorlagekolben entnommen.

Dimethylsulfoxid (DMSO)

Zur Reinigung und Trocknung von DMSO wird dieses zunächst einige Stunden über Calciumhydrid (ca. 25 g/l) zum Rückfluss erhitzt und anschließend unter Unterdruck in einen Vorlagekolben destilliert, der einige Gramm Molekularsieb (3 Å) enthält. Dieser wird mit einer Serumkappe verschlossen, um benötigte Mengen unter Ausschluss von Wasser mit einer sekurierten Spritze entnehmen zu können.

Toluol

Toluol wird in einem Rundkolben mehrere Stunden über eingepresstem Natriumdraht zum Rückfluss erhitzt, in einen mit einer Serumkappe verschlossenen Vorlagekolben abdestilliert und über Molekularsieb (4 Å) aufbewahrt.

4.4 Allgemeine Hinweise zum Arbeiten unter Inertbedingungen

Wegen der Sauerstoff- und Feuchtigkeitsempfindlichkeit der meisten metallorganischen Verbindungen und Reaktionen benötigt man Inertbedingungen. Diese werden im Labormaßstab durch das Verwenden einer kombinierten Stickstoff-Vakuum-Linie erreicht. Über diese Linie können angeschlossene Reaktionsapparaturen über Dreiwegehähne wahlweise mit der Stickstoffversorgung oder mit der Drehschieberpumpe verbunden werden. Der Bereich der Linie, in dem der Stickstoff kontinuierlich im Überdruck vorliegen muss, ist zu diesem Zweck mit einem Überdruckventil (Klapperventil mit integriertem Blasenähler), welches mit Bleikugeln beschwert ist, versehen. Durch das Ventil wird das Eindringen von Feuchtigkeit und Luftsauerstoff verhindert und zudem gewährleistet, dass kein zu großer Überdruck innerhalb der gesamten Glasapparatur entsteht, der zu Schäden an derselben führen könnte. Bevor der Stickstoff aus der Ringleitung in die Linie gelangt, wird er zunächst zur Kontrolle des Flusses durch einen mit Siliconöl gefüllten Blasenähler und anschließend zum Entfernen von Feuchtigkeit durch ein mit Sicapent (Phosphorpentoxid mit Feuchtigkeitsindikator auf einem Trägermaterial) gefülltes U-Rohr geleitet. Um zu verhindern, dass flüchtige Substanzen in die Drehschieberpumpe gelangen, befinden sich zwischen dieser und der Stickstoff-Vakuum-Linie zwei mit flüssigem Stickstoff gekühlte Kühlfallen.

Vor einer luft- und feuchtigkeitsempfindlichen Reaktion wird die an der Linie angeschlossene Apparatur mittels der Pumpe für mindestens einige Minuten evakuiert und anschließend mit Stickstoff belüftet. Diese Kombination wird Sekurieren genannt und in der Regel dreimal durchgeführt. Sämtliche offenen Schliffe an der Apparatur werden entweder mit Glasstopfen und Siliconfett oder mit

Serumkappen aus Kautschuk verschlossen. Werden in einer Reaktion Feststoffe oder hochsiedende Verbindungen als Edukte eingesetzt, können diese bereits vor dem Sekurieren in die Apparatur eingebracht werden. Niedersiedende Substanzen wie auch Lösemittel werden nach dem Sekurieren mittels einer zuvor ebenfalls sekurierten (Einweg)Spritze und Edelstahlkanüle durch eine Serumkappe in die Apparatur gegeben. Müssen große Mengen oder Feststoffe erst im weiteren Verlauf der Reaktion zugegeben werden, kann dies auch im kräftigen Stickstoffgegenstrom bei geöffnetem Schliff der Apparatur erfolgen.

Sollen Flüssigkeiten von einem in einen anderen Kolben überführt werden, so geschieht dies mittels einer Doppelkanüle oder einer Spritze mit Kanüle. Für das Verfahren per Doppelkanüle wird diese zunächst durch die Serumkappe in den Ausgangskolben eingeführt und eine kurze Zeit mit Stickstoff gespült. Anschließend werden das andere Ende der Doppelkanüle sowie eine einzelne weitere Kanüle durch die Serumkappe des Zielkolbens gestochen. Am Ausgangskolben wird ein Stickstoffüberdruck angelegt, das Ende der Doppelkanüle in die Lösung eingeführt und durch die Serumkappe des Zielkolbens eine weitere Kanüle gestochen, die den Überdruck nach außen ableitet.

4.5 Herstellung und Verwendung von Kältemischungen

Für Reaktionen, die bei einer Temperatur unterhalb der Raumtemperatur stattfinden, bedient man sich verschiedener Kältemischungen. Zur Erzeugung einer Temperatur von 0 °C werden in einem Dewargefäß fünf Volumenteile zerstoßenes Eis und ein Volumenteil Natriumchlorid vermengt. Durch Verändern des Mischungsverhältnisses der beiden Komponenten können so Temperaturen zwischen 0 °C und -21 °C eingestellt werden, wobei bei einem Verhältnis von drei Volumenteilen Eis und einem Volumenteil Natriumchlorid die untere Temperaturgrenze erreicht wird.

Temperaturen von -78 °C werden durch das Herunterkühlen eines geeigneten Lösemittels, wie Aceton oder *n*-Pentan, mit zerstoßenem Trockeneis in einem

Dewargefäß erreicht. Alternativ kann zur Kühlung des Lösemittels auch flüssiger Stickstoff eingesetzt werden.

Wird Petrolether (40 / 60) oder *n*-Pentan in einem Dewargefäß mit flüssigem Stickstoff heruntergekühlt, können Reaktionstemperaturen von -100 °C erreicht werden.

Bei sämtlichen Reaktionen in der Kälte wird die Temperatur mittels eines Innenthermometers (Hanna Instruments H93530 mit Drahtfühler HI 7665 Typ F) in der Reaktionsmischung selbst und bei Bedarf zusätzlich in der Kältemischung kontrolliert.

4.6 Versuche zur Synthese der Diazoxid-Derivate

4.6.1 Allgemeine Arbeitsvorschrift zur Synthese der chloresubstituierten Diazoxid-Derivate

In einem 50 ml-Zweihalskolben mit Rückflusskühler und Stopfen werden etwa 12.5 ml Polyphosphorsäuretrimethylsilylester vorgelegt und in einem Silikonölbad (160 °C) unter Rühren erhitzt. Anschließend werden über den zu diesem Zweck geöffneten zweiten Hals 5.00 mmol der entsprechenden Carbonsäure **14a-n**, **16a-d** und **18a-s** sowie 1.03 g (5.00 mmol) 2-Amino-5-chlorbenzolsulfonamid **13** in dem heißen Silylester gelöst. Der Reaktionsansatz wird bei dieser Temperatur 3 h gerührt. Die noch heiße Reaktionsmischung wird danach vorsichtig in 250 ml Wasser gegossen, für 2 h bei Raumtemperatur gerührt und der gebildete Feststoff abfiltriert. Dieses Rohprodukt wird aus Ethanol umkristallisiert.

Ausgehend von dieser allgemeinen Arbeitsvorschrift wurden die folgenden Produkte erhalten und charakterisiert:

4.6.1.1 7-Chlor-3-cyclohexyl-4H-1λ⁶,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion 15a

Gemäß der allgemeinen Arbeitsvorschrift werden 1.03 g (5.00 mmol) 2-Amino-5-chlorbenzolsulfonamid **13** und 640 mg (5.00 mmol) Cyclohexancarbonsäure **14a** in 12.5 ml PPSE eingesetzt. Das Rohprodukt wird aus Ethanol umkristallisiert.

Ausbeute: 1.12 g (3.75 mmol) 75 % d. Th.

Schmelzpunkt: 315 °C

¹H-NMR (500 MHz, d₆-Dimethylsulfoxid): δ [ppm] = 1.13 - 1.26 (m, 2H, Cyclohexyl), 1.26 - 1.35 (m, 2H, Cyclohexyl), 1.41 - 1.51 (m, 2H, Cyclohexyl), 1.63 - 1.70 (m, 1H, Cyclohexyl 1-H), 1.76 - 1.83 (m, 2H, Cyclohexyl), 1.84 - 1.92 (m, 2H, Cyclohexyl), 7.37 (d, *J* = 8.8 Hz, 1H, 5-H), 7.72 (dd, *J* = 8.6 Hz, *J* = 2.0 Hz, 1H, 6-H), 7.82 (d, *J* = 1.8 Hz, 1H, 8-H), 12.03 (s, 1H, -NH).

¹³C-NMR (125 MHz, d₆-Dimethylsulfoxid): δ [ppm] = 25.0 (Cyclohexyl C-3, C-5), 25.0 (Cyclohexyl C-4), 29.5 (Cyclohexyl C-2, C-6), 43.7 (Cyclohexyl C-1), 119.8 (C-5), 122.2 (C-8), 122.7 (C-7), 129.4 (C-8'), 133.1 (C-6), 134.1 (C-4'), 163.4 (C-3).

MS (EI, 70 eV): *m/z* (%): 298 (4) [M]⁺, 243 (59), 232 (15), 189 (12), 125 (100), 90 (35).

Elementaranalyse: C₁₃H₁₅ClN₂O₂S (298.79 g/mol)

Berechnete Werte: %C 52.26, %H 5.06, %N 9.38

Experimentell bestimmte Werte: %C 52.15, %H 5.07, %N 9.37

4.6.1.2 7-Chlor-3-(cyclohexylmethyl)-4H-1λ⁶,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion 15b

Gemäß der allgemeinen Arbeitsvorschrift werden 1.03 g (5.00 mmol) 2-Amino-5-chlorbenzolsulfonamid **13** und 710 mg (5.00 mmol) Cyclohexylessigsäure **14b** in 12.5 ml PPSE eingesetzt. Das Rohprodukt wird aus Ethanol umkristallisiert.

Ausbeute: 0.81 g (2.59 mmol) 52 % d. Th.

Schmelzpunkt: 279 °C

¹H-NMR (500 MHz, d₆-Dimethylsulfoxid): δ [ppm] = 1.06 - 1.14 (m, 2H, Cyclohexyl), 1.10 - 1.25 (m, 4H, Cyclohexyl), 1.64 - 1.72 (m, 4H, Cyclohexyl), 1.77 - 1.87 (m, 1H, Cyclohexyl 1-H), 2.41 (d, *J* = 7.3 Hz, 2H, CH₂-Brücke), 7.36 (d, *J* = 8.8 Hz, 1H, 5-H), 7.73 (dd, *J* = 8.8 Hz, *J* = 1.8 Hz, 1H, 6-H), 7.84 (d, *J* = 1.9 Hz, 1H, 8-H), 12.12 (s, 1H, -NH).

¹³C-NMR (125 MHz, d₆-Dimethylsulfoxid): δ [ppm] = 25.2 (Cyclohexyl C-3, C-5), 25.4 (Cyclohexyl C-4), 31.9 (Cyclohexyl C-1), 35.6 (Cyclohexyl C-2, C-6), 42.5 (CH₂-Brücke), 119.5 (C-5), 121.9 (C-8), 122.5 (C-7), 129.4 (C-8'), 133.0 (C-6), 133.7 (C-4'), 159.5 (C-3).

MS (EI, 70 eV): *m/z* (%): 312 (5) [M]⁺, 230 (100), 190 (4), 125 (8), 98 (9).

Elementaranalyse: C₁₄H₁₇ClN₂O₂S (312.82 g/mol)

Berechnete Werte: %C 53.75, %H 5.48, %N 8.96

Experimentell bestimmte Werte: %C 52.73, %H 5.47, %N 8.87

4.6.1.3 7-Chlor-3-cyclopentyl-4*H*-1λ⁶,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion **15c**

Gemäß der allgemeinen Arbeitsvorschrift werden 1.03 g (5.00 mmol) 2-Amino-5-chlorbenzolsulfonamid **13** und 570 mg (5.00 mmol) Cyclopentancarbonsäure **14c** in 12.5 ml PPSE eingesetzt. Das Rohprodukt wird aus Ethanol umkristallisiert.

Ausbeute: 1.28 g (4.50 mmol) 90 % d. Th.

Schmelzpunkt: 288 °C

¹H-NMR (500 MHz, d₆-Dimethylsulfoxid): δ [ppm] = 1.55 - 1.65 (m, 2H, Cyclopentyl), 1.68 - 1.82 (m, 4H, Cyclopentyl), 1.93 - 2.01 (m, 2H, Cyclopentyl), 2.98 (quin, *J* = 7.9 Hz, 1H, Cyclopentyl 1-H), 7.38 (d, *J* = 8.8 Hz, 1H, 5-H), 7.73 (dd, *J* = 8.8 Hz, *J* = 1.8 Hz, 1H, 6-H), 7.83 (d, *J* = 1.9 Hz, 1H, 8-H), 12.11 (s, 1H, -NH).

^{13}C -NMR (125 MHz, d_6 -Dimethylsulfoxid): δ [ppm] = 25.4 (Cyclopentyl C-3, C-4), 30.7 (Cyclohexyl C-2, C-5), 44.5 (Cyclopentyl C-1), 119.8 (C-5), 122.3 (C-8), 122.7 (C-7), 129.5 (C-8'), 133.2 (C-6), 134.1 (C-4'), 163.7 (C-3).

MS (EI, 70 eV): m/z (%): 284 (18) $[\text{M}]^+$, 256 (12), 243 (100), 189 (18), 125 (45), 90 (10).

Elementaranalyse: $\text{C}_{14}\text{H}_{17}\text{ClN}_2\text{O}_2\text{S}$ (312.82 g/mol)

Berechnete Werte: %C 50.61, %H 4.60, %N 9.84

Experimentell bestimmte Werte: %C 49.93, %H 4.58, %N 9.49

4.6.1.4 7-Chlor-3-(cyclopentylmethyl)-4*H*-1 λ^6 ,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion 15d

Gemäß der allgemeinen Arbeitsvorschrift werden 1.03 g (5.00 mmol) 2-Amino-5-chlorbenzolsulfonamid **13** und 640 mg (5.00 mmol) Cyclopentylessigsäure **14d** in 12.5 ml PPSE eingesetzt. Das Rohprodukt wird aus Ethanol umkristallisiert.

Ausbeute: 0.92 g (3.08 mmol) 62 % d. Th.

Schmelzpunkt: 278 °C

^1H -NMR (500 MHz, d_6 -Dimethylsulfoxid): δ [ppm] = 1.17 - 1.26 (m, 2H, Cyclopentyl), 1.47 - 1.56 (m, 2H, Cyclopentyl), 1.56 - 1.66 (m, 2H, Cyclopentyl), 1.71 - 1.79 (m, 2H, Cyclopentyl), 2.23 - 2.30 (m, 1H, Cyclopentyl 1-H), 2.53 (d, J = 7.6 Hz, 2H, CH_2 -Brücke), 7.36 (d, J = 8.8 Hz, 1H, 5-H), 7.72 (dd, J = 8.8 Hz, J = 2.4 Hz, 1H, 6-H), 7.83 (d, J = 2.3 Hz, 1H, 8-H), 12.13 (s, 1H, -NH).

^{13}C -NMR (125 MHz, d_6 -Dimethylsulfoxid): δ [ppm] = 24.3 (Cyclopentyl C-3, C-4), 31.5 (Cyclohexyl C-2, C-5), 37.5 (Cyclopentyl C-1), 41.0 (CH_2 -Brücke), 119.7 (C-5), 122.1 (C-8), 122.7 (C-7), 129.5 (C-8'), 133.1 (C-6), 134.0 (C-4'), 160.1 (C-3).

MS (EI, 70 eV): m/z (%): 298 (3) $[\text{M}]^+$, 257 (2), 230 (100), 205 (2), 190 (7), 126 (18), 90 (6).

Elementaranalyse: C₁₃H₁₅ClN₂O₂S (298.79 g/mol)

Berechnete Werte: %C 52.26, %H 5.06, %N 9.38

Experimentell bestimmte Werte: %C 52.11, %H 5.12, %N 9.21

4.6.1.5 7-Chlor-3-cyclobutyl-4*H*-1λ⁶,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion **15e**

Gemäß der allgemeinen Arbeitsvorschrift werden 1.03 g (5.00 mmol) 2-Amino-5-chlorbenzolsulfonamid **13** und 500 mg (5.00 mmol) Cyclobutancarbonsäure **14e** in 12.5 ml PPSE eingesetzt. Das Rohprodukt wird aus Ethanol umkristallisiert.

Ausbeute: 0.28 g (1.03 mmol) 21 % d. Th.

Schmelzpunkt: 303.5 °C

¹H-NMR (500 MHz, d₆-Dimethylsulfoxid): δ [ppm] = 1.78 - 1.87 (m, 1H, Cyclobutyl), 1.93 - 2.03 (m, 1H, Cyclobutyl), 2.18 - 2.25 (m, 2H, Cyclobutyl), 2.26 - 2.35 (m, 2H, Cyclobutyl), 3.47 (quin, *J* = 8.5 Hz, 1H, Cyclobutyl 1-H), 7.36 (d, *J* = 8.8 Hz, 1H, 5-H), 7.72 (dd, *J* = 8.7 Hz, *J* = 2.3 Hz, 1H, 6-H), 7.83 (d, *J* = 2.0 Hz, 1H, 8-H), 11.95 (s, 1H, -NH).

¹³C-NMR (125 MHz, d₆-Dimethylsulfoxid): δ [ppm] = 17.2 (Cyclobutyl C-3), 25.3 (Cyclobutyl C-2, C-4), 38.6 (Cyclobutyl C-1), 119.9 (C-5), 122.3 (C-8), 122.7 (C-7), 129.3 (C-8'), 133.1 (C-6), 134.2 (C-4'), 162.0 (C-3).

MS (EI, 70 eV): *m/z* (%): 270 (78) [M]⁺, 255 (9), 243 (7), 205 (28), 189 (90), 125 (100), 90 (16).

Elementaranalyse: C₁₁H₁₁ClN₂O₂S (270.74 g/mol)

Berechnete Werte: %C 48.80, %H 4.10, %N 10.35

Experimentell bestimmte Werte: %C 48.27, %H 4.23, %N 9.84

4.6.1.6 7-Chlor-3-(cyclobutylmethyl)-4*H*-1λ⁶,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion **15f**

Gemäß der allgemeinen Arbeitsvorschrift werden 1.03 g (5.00 mmol) 2-Amino-5-chlorbenzolsulfonamid **13** und 570 mg (5.00 mmol) Cyclobutylessigsäure **14f** in 12.5 ml PPSE eingesetzt. Das Rohprodukt wird aus Ethanol umkristallisiert.

Ausbeute: 1.28 g (4.50 mmol) 90 % d. Th.

Schmelzpunkt: 252 °C

¹H-NMR (500 MHz, d₆-Dimethylsulfoxid): δ [ppm] = 1.71 - 1.90 (m, 4H, Cyclobutyl), 2.02 - 2.09 (m, 2H, Cyclobutyl), 2.64 (d, *J* = 7.6 Hz, 2H, CH₂-Brücke), 2.66 - 2.76 (m, 1H, Cyclobutyl 1-H), 7.35 (d, *J* = 8.8 Hz, 1H, 5-H), 7.72 (dd, *J* = 8.8 Hz, *J* = 2.3 Hz, 1H, 6-H), 7.82 (d, *J* = 2.3 Hz, 1H, 8-H), 12.11 (s, 1H, -NH).

¹³C-NMR (125 MHz, d₆-Dimethylsulfoxid): δ [ppm] = 18.0 (Cyclopentyl C-3), 27.3 (Cyclopentyl C-2, C-4), 32.9 (Cyclohexyl C-1), 41.6 (CH₂-Brücke), 119.7 (C-5), 122.1 (C-8), 122.7 (C-7), 129.5 (C-8'), 133.1 (C-6), 134.0 (C-4'), 160.1 (C-3).

MS (EI, 70 eV): *m/z* (%): 284 (10) [M]⁺, 255 (9), 230 (100), 205 (2), 191 (7), 125 (22), 90 (6).

Elementaranalyse: C₁₂H₁₃ClN₂O₂S (284.76 g/mol)

Berechnete Werte: %C 50.61, %H 4.60, %N 9.84

Experimentell bestimmte Werte: %C 49.70, %H 4.81, %N 9.05

4.6.1.7 7-Chlor-3-cyclopropyl-4*H*-1λ⁶,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion **15g**

Gemäß der allgemeinen Arbeitsvorschrift werden 1.03 g (5.00 mmol) 2-Amino-5-chlorbenzolsulfonamid **13** und 430 mg (5.00 mmol) Cyclopropancarbonsäure **14g** in 12.5 ml PPSE eingesetzt. Das Rohprodukt wird aus Ethanol umkristallisiert.

Ausbeute: 0.67 g (2.61 mmol) 52 % d. Th.

Schmelzpunkt: 294 °C

$^1\text{H-NMR}$ (500 MHz, d_6 -Dimethylsulfoxid): δ [ppm] = 1.02 - 1.14 (m, 4H, Cyclopropyl), 1.88 - 1.95 (m, 1H, Cyclopropyl 1-H), 7.36 (d, J = 8.8 Hz, 1H, 5-H), 7.73 (dd, J = 8.8 Hz, J = 2.4 Hz, 1H, 6-H), 7.81 (d, J = 2.4 Hz, 1H, 8-H), 12.44 (s, 1H, -NH).

$^{13}\text{C-NMR}$ (125 MHz, d_6 -Dimethylsulfoxid): δ [ppm] = 9.8 (Cyclopropyl C-2, C-3), 14.4 (Cyclopropyl C-1), 119.5 (C-5), 122.6 (C-8), 122.8 (C-7), 129.4 (C-8'), 133.1 (C-6), 134.0 (C-4'), 162.3 (C-3).

MS (EI, 70 eV): m/z (%): 256 (62) $[\text{M}]^+$, 189 (100), 125 (67), 90 (9).

Elementaranalyse: $\text{C}_{10}\text{H}_9\text{ClN}_2\text{O}_2\text{S}$ (256.71 g/mol)

Berechnete Werte: %C 46.79, %H 3.53, %N 10.91

Experimentell bestimmte Werte: %C 46.56, %H 3.58, %N 10.63

4.6.1.8 3-(4-*tert.*-Butylcyclohexyl)-7-chlor-4*H*-1 λ^6 ,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion 15h

Gemäß der allgemeinen Arbeitsvorschrift werden 1.03 g (5.00 mmol) 2-Amino-5-chlorbenzolsulfonamid **13** und 920 mg (5.00 mmol) *tert.*-Butylcyclohexancarbonsäure **14h** (Isomerengemisch aus *cis* und *trans*) in 12.5 ml PPSE eingesetzt. Das Rohprodukt wird aus Ethanol umkristallisiert.

Ausbeute: 1.05 g (2.96 mmol) 59 % d. Th.

Schmelzpunkt: 386.6 °C

$^1\text{H-NMR}$ (500 MHz, d_6 -Dimethylsulfoxid): δ [ppm] = 0.86 (s, 9H, *tert.*-Butyl), 1.00 - 1.09 (m, 3H, Cyclohexyl), 1.41 - 1.51 (m, 2H, Cyclohexyl), 1.80 - 1.90 (m, 2H, Cyclohexyl), 1.93 - 2.01 (m, 2H, Cyclohexyl), 2.39 - 2.45 (m, 1H, Cyclohexyl 1-H), 7.38 (d, J = 8.8 Hz, 1H, 5-H), 7.73 (dd, J = 8.8 Hz, J = 2.4 Hz, 1H, 6-H), 7.83 (d, J = 2.3 Hz, 1H, 8-H), 12.02 (s, 1H, -NH).

MS (EI, 70 eV): m/z (%): 354 (63) $[\text{M}]^+$, 339 (48), 297 (100), 243 (25), 230 (19), 126 (28), 90 (6).

Elementaranalyse: C₁₃H₁₅ClN₂O₂S (298.79 g/mol)

Berechnete Werte: %C 57.53, %H 6.53, %N 7.89

Experimentell bestimmte Werte: %C 57.34, %H 6.52, %N 7.94

4.6.1.9 3-(Bicyclo[2.2.1]heptan-2-yl)-7-chlor-4*H*-1λ⁶,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion **15i**

Abweichend von der allgemeinen Arbeitsvorschrift werden 1.03 g (5.00 mmol) 2-Amino-5-chlorbenzolsulfonamid **13** und 701 mg (5.00 mmol) Norbornan-2-carbonsäure **14i** in 12.5 ml PPSE für 5 h bei 80 °C gerührt. Das gewünschte Produkt kann nicht erhalten werden.

4.6.1.10 7-Chlor-3-pentyl-4*H*-1λ⁶,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion **15j**

Abweichend von der allgemeinen Arbeitsvorschrift werden 627 mg (3.04 mmol) 2-Amino-5-chlorbenzolsulfonamid **13** und 353 mg (3.04 mmol) Capronsäure (Hexansäure) **14j** in 12.5 ml PPSE für 5 h bei 80 °C gerührt. Das Rohprodukt wird in wässriger Natriumhydroxid-Lösung (0.2 mol/l) gelöst, anschließend mit Salzsäure (1 mol/l) ausgefällt, filtriert und mit wenig dest. Wasser gewaschen.

Ausbeute: 478 mg (1.67 mmol) 55 % d. Th.

Schmelzpunkt: 186.7 °C

¹H-NMR (500 MHz, d₆-Dimethylsulfoxid): δ [ppm] = 0.85 - 0.86 (m, 3H, Pentyl 5-H), 1.26 - 1.35 (m, 4H, Pentyl 3-H, 4-H), 1.63 - 1.70 (m, 2H, Pentyl 2-H), 2.54 (t, *J* = 7.6 Hz, 2H, Pentyl 1-H), 7.37 (d, *J* = 8.8 Hz, 1H, 5-H), 7.72 (dd, *J* = 8.8 Hz, *J* = 2.3 Hz, 1H, 6-H), 7.83 (d, *J* = 2.3 Hz, 1H, 8-H), 12.19 (s, 1H, -NH).

¹³C-NMR (125 MHz, d₆-Dimethylsulfoxid): δ [ppm] = 13.7 (Pentyl C-5), 21.7 (Pentyl C-4), 25.6 (Pentyl C-2), 30.3 (Pentyl C-3), 35.1 (Pentyl C-1), 119.7 (C-5), 122.1 (C-8'), 122.7 (C-8), 129.5 (C-7), 133.1 (C-6), 134.0 (C-4'), 160.5 (C-3).

MS (EI, 70 eV): m/z (%): 224 (13), 208 (35), 189 (9), 126 (14), 99 (41), 71 (40).

Elementaranalyse: C₁₂H₁₅ClN₂O₂S (286.78 g/mol)

Berechnete Werte: %C 50.26, %H 5.27, %N 9.77

Experimentell bestimmte Werte: %C 50.20, %H 5.74, %N 8.46

4.6.1.11 7-Chlor-3-ethenyl-4*H*-1λ⁶,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion **15k**

Gemäß der allgemeinen Arbeitsvorschrift werden 1.03 g (5.00 mmol) 2-Amino-5-chlorbenzolsulfonamid **13** und 521 mg (5.00 mmol) 3-Methoxypropionsäure **14k** in 12.5 ml PPSE eingesetzt. Das Rohprodukt wird in wässriger Natriumhydroxid-Lösung (0.2 mol/l) gelöst, anschließend mit Salzsäure (1 mol/l) ausgefällt, filtriert und mit wenig dest. Wasser gewaschen.

Ausbeute: 0.53 g (2.18 mmol) 44 % d. Th.

Schmelzpunkt: 246.6 °C

¹H-NMR (500 MHz, d₆-Dimethylsulfoxid): δ [ppm] = 6.02 (dd, *J* = 9.1 Hz, *J* = 2.3 Hz, 1H, Diazoxid-CH=CH₂), 6.45 - 6.56 (m, 2H, Diazoxid-CH=CH₂), 7.43 (d, *J* = 8.8 Hz, 1H, 5-H), 7.76 (dd, *J* = 8.8 Hz, *J* = 2.3 Hz, 1H, 6-H), 7.88 (d, *J* = 2.3 Hz, 1H, 8-H), 12.38 (s, 1H, -NH).

¹³C-NMR (125 MHz, d₆-Dimethylsulfoxid): δ [ppm] = 107 (Diazoxid-CH=CH₂), 118 (Diazoxid-CH=CH₂), 119 (C-5), 124 (C-8), 128 (C-7), 137 (C-6), 150 (C-3).

MS (EI, 70 eV): m/z (%): 191 (24), 188 (70), 125 (100).

Elementaranalyse: C₉H₇ClN₂O₂S (242.68 g/mol)

Berechnete Werte: %C 44.54, %H 2.91, %N 11.54

Experimentell bestimmte Werte: %C 43.29, %H 3.33, %N 10.84

4.6.1.12 7-Chlor-3-(but-1-en-1-yl)-4H-1λ⁶,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion 15l

Gemäß der allgemeinen Arbeitsvorschrift werden 1.03 g (5.00 mmol) 2-Amino-5-chlorbenzolsulfonamid **13** und 500 mg (5.00 mmol) Cyclopropylessigsäure **14l** in 12.5 ml PPSE eingesetzt. Das Rohprodukt wird aus Ethanol umkristallisiert.

Ausbeute: 0.50 g (1.85 mmol) 37 % d. Th.

Schmelzpunkt: 258 °C

¹H-NMR (500 MHz, d₆-Dimethylsulfoxid): δ [ppm] = 1.08 (t, *J* = 7.4 Hz, 3H, Diazoxid-CH=CH-CH₂-CH₃), 2.32 (dq, *J* = 7.4 Hz, *J* = 1.3 Hz, 2H, Diazoxid-CH=CH-CH₂-CH₃), 6.15 (d, *J* = 15.4 Hz, 1H, Diazoxid-CH=CH-CH₂-CH₃), 7.39 (d, *J* = 8.8 Hz, 1H, 5-H), 7.74 (dd, *J* = 8.8 Hz, *J* = 2.3 Hz, 1H, 6-H), 7.84 (d, *J* = 2.3 Hz, 1H, 8-H), 12.21 (s, 1H, -NH).

¹³C-NMR (125 MHz, d₆-Dimethylsulfoxid): δ [ppm] = 12.0 (Diazoxid-CH=CH-CH₂-CH₃), 25.0 (Diazoxid-CH=CH-CH₂-CH₃), 120.1 (Diazoxid-CH=CH-CH₂-CH₃), 120.7 (C-5), 122.7 (C-8), 122.9 (C-8'), 129.7 (C-7), 133.1 (C-6), 134.0 (C-4'), 149.4 (Diazoxid-CH=CH-CH₂-CH₃), 153.1 (C-3).

MS (EI, 70 eV): *m/z* (%): 270 (64) [M]⁺, 205 (15), 189 (100), 125 (78), 90 (11).

Elementaranalyse: C₁₁H₁₁ClN₂O₂S (270.74 g/mol)

Berechnete Werte: %C 48.80, %H 4.10, %N 10.35

Experimentell bestimmte Werte: %C 48.60, %H 4.24, %N 10.31

4.6.1.13 7-Chlor-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)-4H-1λ⁶,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion 15m

Gemäß der allgemeinen Arbeitsvorschrift werden 1.03 g (5.00 mmol) 2-Amino-5-chlorbenzolsulfonamid **13** und 500 mg (5.00 mmol) 3,3-Dimethylacrylsäure **14m** in 12.5 ml PPSE eingesetzt. Das Rohprodukt wird aus Ethanol umkristallisiert.

Ausbeute: 0.85 g (3.14 mmol) 63 % d. Th.

Schmelzpunkt: 283 °C

¹H-NMR (500 MHz, d₆-Dimethylsulfoxid): δ [ppm] = 1.98 (d, *J* = 0.8 Hz, 3H, (*Z*)-CH₃), 2.23 (d, *J* = 1.0 Hz, 3H, (*E*)-CH₃), 5.95 - 5.97 (m, 1H, Diazoxid-CH=C-(CH₃)₂), 7.35 (d, *J* = 8.8 Hz, 1H, 5-H), 7.72 (dd, *J* = 8.8 Hz, *J* = 2.3 Hz, 1H, 6-H), 7.82 (d, *J* = 2.4 Hz, 1H, 8-H), 12.04 (s, 1H, -NH).

¹³C-NMR (125 MHz, d₆-Dimethylsulfoxid): δ [ppm] = 20.5 ((*Z*)-CH₃), 27.8 ((*E*)-CH₃), 116.2 (Diazoxid-CH=C-(CH₃)₂), 119.8 (C-5), 122.0 (C-8'), 122.6 (C-8), 129.4 (C-7), 133.1 (C-6), 134.1 (C-4'), 153.4 (C-3), 155.8 (Diazoxid-CH=C-(CH₃)₂).

MS (EI, 70 eV): *m/z* (%): 270 (100) [M]⁺, 205 (40), 189 (54), 125 (84), 90 (12), 82 (23).

Elementaranalyse: C₁₁H₁₁ClN₂O₂S (270.74 g/mol)

Berechnete Werte: %C 48.80, %H 4.10, %N 10.35

Experimentell bestimmte Werte: %C 48.76, %H 4.11, %N 10.36

4.6.1.14 7-Chlor-3-(pent-4-in-1-yl)-4*H*-1λ⁶,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion 15n

Abweichend von der allgemeinen Arbeitsvorschrift werden 1.03 g (5.00 mmol) 2-Amino-5-chlorbenzolsulfonamid **13** und 561 mg (5.00 mmol) Hexinsäure **14n** in 12.5 ml PPSE für 5 h bei 80 °C gerührt. Das gewünschte Produkt kann nicht erhalten werden.

4.6.1.15 7-Chlor-3-(2-methoxyethyl)-4*H*-1λ⁶,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion 17c

Abweichend von der allgemeinen Arbeitsvorschrift werden 1.03 g (5.00 mmol) 2-Amino-5-chlorbenzolsulfonamid **13** und 521 mg (5.00 mmol) 3-Methoxypropionsäure **16c** in 12.5 ml PPSE für 5 h bei 80 °C gerührt. Das Rohprodukt wird in wässriger Natriumhydroxid-Lösung (0.2 mol/l) gelöst, anschließend mit Salzsäure (1 mol/l) ausgefällt, filtriert und mit wenig dest. Wasser gewaschen.

Ausbeute: 184 mg (0.67 mmol) 14 % d. Th.

Schmelzpunkt: 146.9 °C

¹H-NMR (500 MHz, d₆-Dimethylsulfoxid): δ [ppm] = 2.79 (t, *J* = 6.1 Hz, 2H, Diazoxid-CH₂-CH₂-O-CH₃), 3.26 (s, 3H, Diazoxid-CH₂-CH₂-O-CH₃), 3.68 (t, *J* = 6.1 Hz, 2H, Diazoxid-CH₂-CH₂-O-CH₃), 7.37 (d, *J* = 8.8 Hz, 1H, 5-H), 7.74 (dd, *J* = 8.8 Hz, *J* = 2.4 Hz, 1H, 6-H), 7.85 (d, *J* = 2.3 Hz, 1H, 8-H), 12.24 (s, 1H, -NH).

¹³C-NMR (125 MHz, d₆-Dimethylsulfoxid): δ [ppm] = 35.9 (Diazoxid-CH₂-CH₂-O-CH₃), 58.1 (Diazoxid-CH₂-CH₂-O-CH₃), 68.2 (Diazoxid-CH₂-CH₂-O-CH₃), 119.7 (C-5), 122.2 (C-8'), 122.8 (C-8), 129.6 (C-7), 133.2 (C-6), 133.9 (C-4'), 158.5 (C-3).

MS (EI, 70 eV): *m/z* (%): 258 (100), 243 (29), 189 (18), 124 (94), 90 (20), 63 (62).

Elementaranalyse: C₁₀H₁₁ClN₂O₃S (274.72 g/mol)

Berechnete Werte: %C 43.72, %H 4.04, %N 10.20

Experimentell bestimmte Werte: %C 43.67, %H 3.67, %N 10.24

4.6.1.16 7-Chlor-3-(ethoxymethyl)-4*H*-1λ⁶,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion 17d

Abweichend von der allgemeinen Arbeitsvorschrift werden 1.03 g (5.00 mmol) 2-Amino-5-chlorbenzolsulfonamid **13** und 521 mg (5.00 mmol) 2-Ethoxyessigsäure **16d** in 12.5 ml PPSE für 5 h bei 80 °C gerührt. Das Rohprodukt wird in wässriger Natriumhydroxid-Lösung (0.2 mol/l) gelöst, anschließend mit Salzsäure (1 mol/l) ausgefällt, filtriert und mit wenig dest. Wasser gewaschen.

Ausbeute: 522 mg (1.90 mmol) 38 % d. Th.

Schmelzpunkt: 183.5 °C

¹H-NMR (500 MHz, d₆-Dimethylsulfoxid): δ [ppm] = 1.19 (t, *J* = 7.0 Hz, 3H, Diazoxid-CH₂-O-CH₂-CH₃), 3.60 (q, *J* = 7.0 Hz, 2H, Diazoxid-CH₂-O-CH₂-CH₃), 4.35 (s, 2H, Diazoxid-CH₂-O-CH₂-CH₃), 7.60 (d, *J* = 8.9 Hz, 1H, 5-H), 7.71 (dd, *J* = 8.9 Hz, *J* = 2.3 Hz, 1H, 6-H), 7.84 (d, *J* = 2.3 Hz, 1H, 8-H), 12.09 (s, 1H, -NH).

^{13}C -NMR (125 MHz, d_6 -Dimethylsulfoxid): δ [ppm] = 14.7 (Diazoxid- $\text{CH}_2\text{-O-CH}_2\text{-CH}_3$), 66.5 (Diazoxid- $\text{CH}_2\text{-O-CH}_2\text{-CH}_3$), 69.4 (Diazoxid- $\text{CH}_2\text{-O-CH}_2\text{-CH}_3$), 120.4 (C-5), 122.6 (C-8'), 122.7 (C-8), 130.0 (C-7), 133.2 (C-6), 133.8 (C-4'), 157.6 (C-3).

MS (EI, 70 eV): m/z (%): 230 (100), 190 (19), 165 (7), 126 (98), 63 (15).

Elementaranalyse: $\text{C}_{10}\text{H}_{11}\text{ClN}_2\text{O}_3\text{S}$ (274.72 g/mol)

Berechnete Werte: %C 43.72, %H 4.04, %N 10.20

Experimentell bestimmte Werte: %C 43.51, %H 4.21, %N 9.79

4.6.1.17 7-Chlor-3-[2-(methylsulfanyl)ethyl]-4*H*-1 λ^6 ,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion **17a**

Abweichend von der allgemeinen Arbeitsvorschrift werden 1.03 g (5.00 mmol) 2-Amino-5-chlorbenzolsulfonamid **13** und 521 mg (5.00 mmol) 3-(Methylsulfanyl)propionsäure **16a** in 12.5 ml PPSE für 5 h bei 80 °C gerührt. Das gewünschte Produkt kann in der Analytik nicht nachgewiesen werden.

4.6.1.18 7-Chlor-3-(pyrrolidin-2-yl)-4*H*-1 λ^6 ,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion **17b**

Gemäß der allgemeinen Arbeitsvorschrift werden 1.03 g (5.00 mmol) 2-Amino-5-chlorbenzolsulfonamid **13** und 576 mg (5.00 mmol) *L*-(-)-Prolin **16b** in 12.5 ml PPSE eingesetzt. Das gewünschte Produkt kann in der Analytik nicht nachgewiesen werden.

4.6.1.19 7-Chlor-3-phenyl-4H-1λ⁶,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion 19a

Gemäß der allgemeinen Arbeitsvorschrift werden 1.03 g (5.00 mmol) 2-Amino-5-chlorbenzolsulfonamid **13** und 610 mg (5.00 mmol) Benzoesäure **18a** in 12.5 ml PPSE eingesetzt. Das Rohprodukt wird aus Ethanol umkristallisiert.

Ausbeute: 0.65 g (2.22 mmol) 44 % d. Th.

Schmelzpunkt: 354.9 °C

¹H-NMR (500 MHz, d₆-Dimethylsulfoxid): δ [ppm] = 7.61 - 7.65 (m, 2H, Phenyl 3-H, Phenyl 5-H), 7.67 (d, *J* = 8.9 Hz, 1H, 5-H), 7.69 - 7.74 (m, 1H, Phenyl 4-H), 7.81 (dd, *J* = 8.9 Hz, *J* = 2.3 Hz, 1H, 6-H), 7.93 (d, *J* = 2.3 Hz, 1H, 8-H), 8.02 - 8.06 (m, 2H, Phenyl 2-H, Phenyl 6-H), 12.33 (s, 1H, -NH).

¹³C-NMR (125 MHz, d₆-Dimethylsulfoxid): δ [ppm] = 120.8 (C-5), 122.4 (C-8), 122.6 (C-7), 128.2 (Phenyl C-2, Phenyl C-6), 128.8 (Phenyl C-3, Phenyl C-5), 130.0 (C-8'), 131.5 (Phenyl C-1), 133.0 (Phenyl C-4), 133.3 (C-6), 134.4 (C-4'), 154.8 (C-3).

MS (EI, 70 eV): *m/z* (%): 292 (3) [M]⁺, 189 (62), 125 (100), 104 (17), 98 (18), 90 (18), 77 (28).

Elementaranalyse: C₁₃H₉ClN₂O₂S (292.74 g/mol)

Berechnete Werte: %C 53.34, %H 3.10, %N 9.57

Experimentell bestimmte Werte: %C 53.11, %H 2.89, %N 9.51

4.6.1.20 3-Benzyl-7-chlor-4H-1λ⁶,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion 19b

Gemäß der allgemeinen Arbeitsvorschrift werden 1.03 g (5.00 mmol) 2-Amino-5-chlorbenzolsulfonamid **13** und 680 mg (5.00 mmol) Phenylelessigsäure **18b** in 12.5 ml PPSE eingesetzt. Das Rohprodukt wird aus Ethanol umkristallisiert.

Ausbeute: 1.05 g (3.42 mmol) 68 % d. Th.

Schmelzpunkt: 263 °C

$^1\text{H-NMR}$ (500 MHz, d_6 -Dimethylsulfoxid): δ [ppm] = 3.89 (s, 2H, CH_2 -Brücke), 7.27 - 7.31 (m, 1H, Phenyl 4-H), 7.34 - 7.37 (m, 4H, Phenyl 2-H, Phenyl 3-H, Phenyl 5-H, Phenyl 6-H), 7.40 (d, $J = 8.8$ Hz, 1H, 5-H), 7.74 (dd, $J = 8.8$ Hz, $J = 2.3$ Hz, 1H, 6-H), 7.85 (d, $J = 2.3$ Hz, 1H, 8-H), 12.43 (s, 1H, -NH).

$^{13}\text{C-NMR}$ (125 MHz, d_6 -Dimethylsulfoxid): δ [ppm] = 41.4 (CH_2 -Brücke), 119.9 (C-5), 122.1 (C-8'), 122.7 (C-8), 127.1 (Phenyl C-4), 128.5 (Phenyl C-2, Phenyl C-6), 129.0 (Phenyl C-3, Phenyl C-5), 129.7 (C-7), 133.3 (Phenyl C-1), 134.0 (C-6), 134.8 (C-4'), 158.7 (C-3).

MS (EI, 70 eV): m/z (%): 306 (2) $[\text{M}]^+$, 241 (4), 189 (18), 125 (100), 98 (19), 91 (82), 77 (9).

Elementaranalyse: $\text{C}_{14}\text{H}_{11}\text{ClN}_2\text{O}_2\text{S}$ (306.77 g/mol)

Berechnete Werte: %C 54.81, %H 3.61, %N 9.13

Experimentell bestimmte Werte: %C 53.57, %H 3.55, %N 8.80

4.6.1.21 **3-Benzyl-7-chlor-4*H*-1 λ^6 ,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion (Mikrowelle) 19b**

Gemäß der allgemeinen Arbeitsvorschrift werden 1.03 g (5.00 mmol) 2-Amino-5-chlorbenzolsulfonamid **13** und 680 mg (5.00 mmol) Phenylelessigsäure **18b** in 12.5 ml PPSE eingesetzt, aber stattdessen bei maximal 100 W für 10 min in der Mikrowelle unter Rühren auf 160 °C bzw. 93 °C (bei konstanter Leistung von 100 W) erhitzt. Bei beiden Versuchen kann das gewünschte Produkt in der Analytik nicht identifiziert werden.

4.6.1.22 7-Chlor-3-[(4-nitrophenyl)methyl]-4H-1λ⁶,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion 19c

Abweichend von der allgemeinen Arbeitsvorschrift werden 1.03 g (5.00 mmol) 2-Amino-5-chlorbenzolsulfonamid **13** und 906 mg (5.00 mmol) 4-Nitrophenylessigsäure **18c** in 12.5 ml PPSE für 5 h bei 80 °C gerührt. Das Rohprodukt wird in wässriger Natriumhydroxid-Lösung (0.2 mol/l) gelöst, anschließend mit Salzsäure (1 mol/l) ausgefällt, filtriert und mit wenig dest. Wasser gewaschen.

Ausbeute: 1.04 g (2.97 mmol) 59 % d. Th.

Schmelzpunkt: 238.7 °C

¹H-NMR (500 MHz, d₆-Dimethylsulfoxid): δ [ppm] = 4.10 (s, 2H, CH₂-Brücke), 7.37 - 7.43 (m, 1H, 5-H), 7.59 - 7.63 (d, 2H, *J* = 8.6 Hz, Phenyl 2-H, Phenyl 6-H), 7.75 (dd, *J* = 8.8 Hz, *J* = 2.2 Hz, 1H, 6-H), 7.85 (d, *J* = 2.1 Hz, 8-H), 8.16 (d, *J* = 8.6 Hz, 2H, Phenyl 3-H, Phenyl 5-H), 12.59 (s, 1H, -NH).

¹³C-NMR (125 MHz, d₆-Dimethylsulfoxid): δ [ppm] = 40.7 (CH₂-Brücke), 119.9 (C-5), 122.8 (C-8), 123.1 (Phenyl C-3), 123.3 (Phenyl C-5), 129.3 (C-8'), 130.7 (Phenyl C-2), 130.8 (Phenyl C-6), 133.4 (C-6), 134.9 (C-7), 142.5 (C-4'), 146.3 (Phenyl C-1), 157.8 (Phenyl C-4), 168.6 (C-3).

MS (EI, 70 eV): *m/z* (%): 289 (14), 205 (38), 188 (65), 163 (21), 125 (100), 106 (12), 89 (50), 78 (18), 63 (28).

Elementaranalyse: C₁₄H₁₀ClN₃O₄S (351.76 g/mol)

Berechnete Werte: %C 47.80, %H 2.87, %N 11.95

Experimentell bestimmte Werte: %C 47.35, %H 3.07, %N 11.20

4.6.1.23 3-(Aminobenzyl)-7-chlor-4*H*-1λ⁶,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion 19d

Gemäß der allgemeinen Arbeitsvorschrift werden 1.03 g (5.00 mmol) 2-Amino-5-chlorbenzolsulfonamid **13** und 756 mg (5.00 mmol) *D*-(-)- α -Phenylglycin **18d** in 12.5 ml PPSE eingesetzt. Alternativ wird derselbe Ansatz für 5 h bei 80 °C durchgeführt. Das gewünschte Produkt kann in beiden Fällen in der Analytik nicht nachgewiesen werden.

4.6.1.24 7-Chlor-3-(2-phenylethyl)-4*H*-1λ⁶,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion 19e

Gemäß der allgemeinen Arbeitsvorschrift werden 1.03 g (5.00 mmol) 2-Amino-5-chlorbenzolsulfonamid **13** und 751 mg (5.00 mmol) 3-Phenylpropionsäure **18e** in 12.5 ml PPSE eingesetzt. Das Rohprodukt wird in wässriger Natriumhydroxid-Lösung (0.2 mol/l) gelöst, anschließend mit Salzsäure (1 mol/l) ausgefällt, filtriert und mit wenig dest. Wasser gewaschen.

Ausbeute: 1.28 g (3.99 mmol) 80 % d. Th.

Schmelzpunkt: 256.3 °C

¹H-NMR (500 MHz, d₆-Dimethylsulfoxid): δ [ppm] = 2.85 (t, J = 7.8 Hz, 2H, Diazoxid-CH₂-CH₂-Ph), 3.00 (t, J = 7.7 Hz, 2H, Diazoxid-CH₂-CH₂-Ph), 7.18 - 7.22 (m, 1H, Phenyl 4-H), 7.25 - 7.31 (m, 4H, Phenyl 2-H, Phenyl 3-H, Phenyl 5-H, Phenyl 6-H), 7.33 (d, J = 8.8 Hz, 1H, 5-H), 7.71 (dd, J = 8.8 Hz, J = 2.4 Hz, 1H, 6-H), 7.84 (d, J = 2.4 Hz, 1H, 8-H), 12.17 (s, 1H, -NH).

¹³C-NMR (125 MHz, d₆-Dimethylsulfoxid): δ [ppm] = 31.5 (Diazoxid-CH₂-CH₂-Ph), 36.9 (Diazoxid-CH₂-CH₂-Ph), 119.8 (C-5), 122.2 (C-8'), 122.7 (C-8), 126.2 (Phenyl C-4), 128.2 (Phenyl C-3, Phenyl C-5), 128.4 (Phenyl C-2, Phenyl C-6), 129.4 (C-7), 133.1 (C-6), 161.2 (C-3).

MS (EI, 70 eV): m/z (%): 255 (37), 179 (19), 130 (77), 125 (51), 104 (20), 91 (100), 63 (19).

Elementaranalyse: C₁₅H₁₃ClN₂O₂S (320.79 g/mol)

Berechnete Werte: %C 56.16, %H 4.08, %N 8.73

Experimentell bestimmte Werte: %C 56.11, %H 4.16, %N 8.59

4.6.1.25 *rac*-7-Chlor-3-(1-phenylethyl)-4*H*-1λ⁶,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion 19f

Gemäß der allgemeinen Arbeitsvorschrift werden 1.03 g (5.00 mmol) 2-Amino-5-chlorbenzolsulfonamid **13** und 751 mg (5.00 mmol) *rac*-2-Phenylpropionsäure **18f** in 12.5 ml PPSE eingesetzt. Das Rohprodukt wird aus Ethanol umkristallisiert.

Ausbeute: 0.98 g (3.05 mmol) 61 % d. Th.

Schmelzpunkt: 237 °C

¹H-NMR (500 MHz, d₆-Dimethylsulfoxid): δ [ppm] = 1.52 (d, *J* = 7.0 Hz, 3H, -CH₃), 4.04 (q, *J* = 6.9 Hz, 1H, Diazoxid-CH-), 7.27 - 7.31 (m, 1H, Phenyl 4-H), 7.34 - 7.42 (m, 5H, 5-H, Phenyl 2-H, Phenyl 3-H, Phenyl 5-H, Phenyl 6-H), 7.72 (dd, *J* = 8.9 Hz, *J* = 2.3 Hz, 1H, 6-H), 7.85 (d, *J* = 2.3 Hz, 1H, 8-H), 12.24 (s, 1H, -NH).

¹³C-NMR (125 MHz, d₆-Dimethylsulfoxid): δ [ppm] = 19.0 (-CH₃), 44.6 (Diazoxid-CH-), 119.9 (C-5), 122.2 (C-8), 122.7 (Phenyl C-4), 127.2 (Phenyl C-3, Phenyl C-5), 127.3 (C-8'), 128.7 (Phenyl C-2, Phenyl C-6), 129.7 (C-7), 133.3 (C-6), 134.0 (C-4'), 140.8 (Phenyl C-1), 161.7 (C-3).

MS (EI, 70 eV): *m/z* (%): 320 (67) [M]⁺, 255 (60), 189 (23), 179 (10), 125 (43), 105 (100), 91 (10), 77 (21).

**4.6.1.26 7-Chlor-3-[(1S)-1-phenylethyl]-4H-1λ⁶,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion
19g**

Gemäß der allgemeinen Arbeitsvorschrift werden 1.03 g (5.00 mmol) 2-Amino-5-chlorbenzolsulfonamid **13** und 751 mg (5.00 mmol) (S)-(+)-2-Phenylpropionsäure **18g** in 12.5 ml PPSE eingesetzt. Das Rohprodukt wird aus Ethanol umkristallisiert.

Ausbeute: 1.18 g (3.68 mmol) 74 % d. Th.

¹H-NMR (500 MHz, d₆-Dimethylsulfoxid): δ [ppm] = 1.52 (d, *J* = 7.0 Hz, 3H, -CH₃), 4.04 (q, *J* = 6.9 Hz, 1H, Diazoxid-CH-), 7.26 - 7.31 (m, 1H, Phenyl 4-H), 7.34 - 7.42 (m, 5H, 5-H, Phenyl 2-H, Phenyl 3-H, Phenyl 5-H, Phenyl 6-H), 7.72 (dd, *J* = 8.9 Hz, *J* = 2.4 Hz, 1H, 6-H), 7.85 (d, *J* = 2.2 Hz, 1H, 8-H), 12.24 (s, 1H, -NH).

¹³C-NMR (125 MHz, d₆-Dimethylsulfoxid): δ [ppm] = 19.0 (-CH₃), 44.6 (Diazoxid-CH-), 119.9 (C-5), 122.2 (C-8), 122.7 (Phenyl C-4), 127.2 (Phenyl C-3, Phenyl C-5), 127.3 (C-8'), 128.6 (Phenyl C-2, Phenyl C-6), 129.7 (C-7), 133.3 (C-6), 133.9 (C-4'), 140.8 (Phenyl C-1), 161.7 (C-3).

MS (EI, 70 eV): *m/z* (%): 320 (99) [M]⁺, 255 (100), 189 (36), 179 (15), 125 (71), 105 (51), 91 (17), 77 (26).

Elementaranalyse: C₁₅H₁₃ClN₂O₂S (320.79 g/mol)

Berechnete Werte: %C 56.16, %H 4.08, %N 8.73

Experimentell bestimmte Werte: %C 56.09, %H 4.09, %N 8.72

**4.6.1.27 7-Chlor-3-[(1R)-1-phenylethyl]-4H-1λ⁶,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion
19h**

Gemäß der allgemeinen Arbeitsvorschrift werden 1.03 g (5.00 mmol) 2-Amino-5-chlorbenzolsulfonamid **13** und 751 mg (5.00 mmol) (R)-(+)-2-Phenylpropionsäure **18h** in 12.5 ml PPSE eingesetzt. Das Rohprodukt wird aus Ethanol umkristallisiert.

Ausbeute: 0.56 g (1.75 mmol) 35 % d. Th.

Die analytischen Daten sind analog zum Enantiomer.

4.6.1.28 7-Chlor-3-[(2-(3-methoxyphenyl)ethyl)-4H-1λ⁶,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion 19i

Gemäß der allgemeinen Arbeitsvorschrift werden 1.03 g (5.00 mmol) 2-Amino-5-chlorbenzolsulfonamid **13** und 901 mg (5.00 mmol) 3-(3-Methoxyphenyl)propionsäure **18i** in 12.5 ml PPSE eingesetzt. Das Rohprodukt wird aus Ethanol umkristallisiert.

Ausbeute: 1.01 g (2.89 mmol) 56 % d. Th.

Schmelzpunkt: 204.7 °C

¹H-NMR (500 MHz, d₆-Dimethylsulfoxid): δ [ppm] = 2.86 (t, *J* = 7.7 Hz, 2H, Diazoxid-CH₂-CH₂-Ar), 2.97 (t, *J* = 7.6 Hz, 2H, Diazoxid-CH₂-CH₂-Ar), 3.71 (s, 3H, -O-CH₃), 6.73 - 6.78 (m, 1H, Phenyl 4-H), 6.82 - 6.86 (m, 2H, Phenyl 2-H, Phenyl 6-H), 7.19 (t, *J* = 7.9 Hz, 1H, Phenyl 5-H), 7.34 (d, *J* = 8.8 Hz, 1H, 5-H), 7.72 (dd, *J* = 8.8 Hz, *J* = 2.4 Hz, 1H, 6-H), 7.85 (d, *J* = 2.3 Hz, 1H, 8-H), 12.19 (s, 1H, -NH).

¹³C-NMR (125 MHz, d₆-Dimethylsulfoxid): δ [ppm] = 31.5 (Diazoxid-CH₂-CH₂-Ar), 36.8 (Diazoxid-CH₂-CH₂-Ar), 55.3 (-O-CH₃), 111.9 (Phenyl C-2), 113.8 (Phenyl C-4), 120.5 (C-5), 122.2 (C-8), 122.7 (Phenyl C-6), 122.8 (C-8'), 129.5 (C-7), 129.6 (Phenyl C-5), 133.3 (C-4'), 133.9 (C-6), 141.5 (Phenyl C-1), 159.2 (Phenyl C-3), 159.6 (C-3).

MS (EI, 70 eV): *m/z* (%): 285 (5), 207 (3), 179 (9), 125 (50), 111 (69).

Elementaranalyse: C₁₆H₁₅ClN₂O₃S (350.82 g/mol)

Berechnete Werte: %C 54.78, %H 4.31, %N 7.99

Experimentell bestimmte Werte: %C 55.18, %H 4.31, %N 7.43

4.6.1.29 3-(1-Amino-2-phenylethyl)-7-chlor-4*H*-1λ⁶,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion 19j

Gemäß der allgemeinen Arbeitsvorschrift werden 1.03 g (5.00 mmol) 2-Amino-5-chlorbenzolsulfonamid **13** und 826 mg (5.00 mmol) *D*-(+)-Phenylalanin **18j** in 12.5 ml PPSE eingesetzt. Das gewünschte Produkt kann in der Analytik nicht nachgewiesen werden.

4.6.1.30 7-Chlor-3-(2-hydroxyphenyl)-4*H*-1λ⁶,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion 19k

Gemäß der allgemeinen Arbeitsvorschrift werden 1.03 g (5.00 mmol) 2-Amino-5-chlorbenzolsulfonamid **13** und 690 mg (5.00 mmol) Salicylsäure **18k** in 12.5 ml PPSE eingesetzt. Das Rohprodukt wird aus Ethanol umkristallisiert. Das gewünschte Produkt kann nicht rein erhalten werden.

MS (EI, 70 eV): *m/z* (%): 308 (100) [M]⁺, 256 (7), 215 (4), 189 (47), 125 (40), 90 (8).

4.6.1.31 7-Chlor-3-[(2-hydroxyphenyl)methyl]-4*H*-1λ⁶,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion 19l

Gemäß der allgemeinen Arbeitsvorschrift werden 1.03 g (5.00 mmol) 2-Amino-5-chlorbenzolsulfonamid **13** und 760 mg (5.00 mmol) *ortho*-Hydroxyphenylelessigsäure **18l** in 12.5 ml PPSE eingesetzt. Das gewünschte Produkt kann in der Analytik nicht identifiziert werden.

4.6.1.32 3-(2-Acetylphenyl)-7-chlor-4*H*-1λ⁶,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion **19m**

Gemäß der allgemeinen Arbeitsvorschrift werden 1.03 g (5.00 mmol) 2-Amino-5-chlorbenzolsulfonamid **13** und 901 mg (5.00 mmol) Acetylsalicylsäure **18m** in 12.5 ml PPSE eingesetzt. Das gewünschte Produkt kann in der Analytik nicht nachgewiesen werden.

4.6.1.33 7-Chlor-3-(naphthalin-2-ylmethyl)-4*H*-1λ⁶,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion **19n**

Gemäß der allgemeinen Arbeitsvorschrift werden 1.03 g (5.00 mmol) 2-Amino-5-chlorbenzolsulfonamid **13** und 931 mg (5.00 mmol) 2-(Naphthalin-2-yl)essigsäure **18n** in 12.5 ml PPSE eingesetzt. Das Rohprodukt wird aus Ethanol umkristallisiert.

Ausbeute: 1.21 g (3.39 mmol) 68 % d. Th.

Schmelzpunkt: 287.5 °C

¹H-NMR (500 MHz, d₆-Dimethylsulfoxid): δ [ppm] = 4.07 (s, 2H, CH₂-Brücke), 7.42 (d, *J* = 8.9 Hz, 1H, 5-H), 7.48 - 7.55 (m, 3H, Naphthyl), 7.75 (dd, *J* = 8.9 Hz, *J* = 2.2 Hz, 1H, 6-H), 7.85 (d, *J* = 2.0 Hz, 1H, 8-H), 7.86 - 7.93 (m, 4H, Naphthyl), 12.48 (s, 1H, -NH).

¹³C-NMR (125 MHz, d₆-Dimethylsulfoxid): δ [ppm] = 41.5 (CH₂-Brücke), 119.9 (C-5), 122.1 (Naphthyl), 122.7 (C-8), 125.9 (C-7), 126.3 (Naphthyl), 127.2 (Naphthyl), 127.5 (Naphthyl), 127.7 (Naphthyl), 128.0 (Naphthyl), 129.7 (C-8'), 132.0 (Naphthyl), 132.3 (Naphthyl), 132.8 (Naphthyl), 133.3 (C-6), 134.0 (C-4'), 158.7 (C-3).

MS (EI, 70 eV): *m/z* (%): 356 (100) [M]⁺, 291 (82), 256 (8), 230 (12), 217 (5), 167 (64), 141 (37), 128 (11), 125 (13), 115 (19), 98 (18).

Elementaranalyse: C₁₈H₁₃ClN₂O₂S (356.83 g/mol)

Berechnete Werte: %C 60.59, %H 3.67, %N 7.85

Experimentell bestimmte Werte: %C 60.51, %H 3.50, %N 7.74

4.6.1.34 7-Chlor-3-(6-methoxynaphthalin-2-yl)-4H-1λ⁶,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion **19o**

Gemäß der allgemeinen Arbeitsvorschrift werden 1.03 g (5.00 mmol) 2-Amino-5-chlorbenzolsulfonamid **13** und 1.01 g (5.00 mmol) 6-Methoxy-2-naphthoesäure **18o** in 12.5 ml PPSE eingesetzt. Das Rohprodukt wird aus Ethanol umkristallisiert.

Ausbeute: 876 mg (2.35 mmol) 47 % d. Th.

Schmelzpunkt: 359.6 °C

¹H-NMR (500 MHz, d₆-Dimethylsulfoxid): δ [ppm] = 3.90 (s, 3H, -OCH₃), 7.17 (dd, *J* = 8.9 Hz, *J* = 2.5 Hz, 1H, Naphthyl 7-H), 7.31 (d, *J* = 8.8 Hz, 1H, 5-H), 7.34 (d, *J* = 2.4 Hz, 1H, Naphthyl 5-H), 7.41 (dd, *J* = 8.8 Hz, *J* = 2.5 Hz, 1H, Naphthyl 8-H), 7.55 (d, *J* = 2.5 Hz, 1H, Naphthyl 1-H), 7.80 (d, *J* = 8.7 Hz, 1H, 8-H), 7.96 (d, *J* = 9.0 Hz, 1H, 4-H), 8.38 (dd, *J* = 8.6 Hz, *J* = 1.6 Hz, 6-H), 8.70 (m, 1H, 8-H).

¹³C-NMR (125 MHz, d₆-Dimethylsulfoxid): δ [ppm] = 55.1 (-O-CH₃), 105.7 (Naphthyl C-7), 118.4 (C-5), 121.2 (Naphthyl), 124.8 (C-8), 124.9 (C-8'), 125.7 (Naphthyl), 126.0 (Naphthyl), 127.1 (Naphthyl), 127.7 (Naphthyl), 127.9 (C-7), 130.3 (Naphthyl), 130.3 (Naphthyl), 134.8 (Naphthyl), 135.0 (C-6), 146.6 (C-4'), 157.7 (C-3), 158.0 (Naphthyl C-6).

MS (EI, 70 eV): *m/z* (%): 372 (12) [M]⁺, 265 (1), 234 (1), 209 (1), 183 (19), 141 (2), 97 (2), 44 (100).

4.6.1.35 7-Chlor-3-(pyridin-2-yl)-4H-1λ⁶,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion **19p**

Abweichend von der allgemeinen Arbeitsvorschrift werden 1.03 g (5.00 mmol) 2-Amino-5-chlorbenzolsulfonamid **13** und 616 mg (5.00 mmol) Picolinsäure (Pyridin-2-carbonsäure) **18p** in 12.5 ml PPSE für 5 h bei 80 °C gerührt. Das Rohprodukt wird

in wässriger Natriumhydroxid-Lösung (0.2 mol/l) gelöst, anschließend mit Salzsäure (1 mol/l) ausgefällt, filtriert und mit wenig dest. Wasser gewaschen.

Ausbeute: 356 mg (1.21 mmol) 24 % d. Th.

Schmelzpunkt: 286.5 °C

¹H-NMR (500 MHz, d₆-Dimethylsulfoxid): δ [ppm] = 7.77 (dd, *J* = 7.5 Hz, *J* = 4.8 Hz, 1H, Pyridin 4-H), 7.81 (dd, 1H, *J* = 9.0 Hz, *J* = 2.0 Hz, 6-H), 7.93 (d, *J* = 2.2 Hz, 1H, 8-H), 7.99 (d, *J* = 8.9 Hz, 1H, 5-H), 8.13 (dd, *J* = 7.8 Hz, *J* = 1.1 Hz, 1H, Pyridin 5-H), 8.31 (d, *J* = 7.9 Hz, 1H, Pyridin 3-H), 8.84 (d, *J* = 4.6 Hz, Pyridin 6-H), 12.77 (s, 1H, -NH).

¹³C-NMR (125 MHz, d₆-Dimethylsulfoxid): δ [ppm] = 121.5 (C-5), 122.6 (C-8, Pyridin C-3), 123.1 (Pyridin C-5), 127.9 (C-8'), 130.3 (C-7), 133.4 (C-6), 133.9 (C-4'), 138.5 (Pyridin C-4), 147.3 (Pyridin C-2), 149.1 (Pyridin C-6), 151.7 (C-3).

MS (EI, 70 eV): *m/z* (%): 231 (46), 125 (57), 105 (81), 78 (58).

Elementaranalyse: C₁₂H₈ClN₃O₂S (293.73 g/mol)

Berechnete Werte: %C 49.07, %H 2.75, %N 14.31

Experimentell bestimmte Werte: %C 49.31, %H 2.81, %N 14.09

4.6.1.36 7-Chlor-3-(thiophen-2-yl)-4*H*-1λ⁶,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion **19q**

Gemäß der allgemeinen Arbeitsvorschrift werden 1.03 g (5.00 mmol) 2-Amino-5-chlorbenzolsulfonamid **13** und 640 mg (5.00 mmol) Thiophen-2-carbonsäure **18q** in 12.5 ml PPSE eingesetzt. Das Rohprodukt wird aus Ethanol umkristallisiert.

Ausbeute: 0.66 g (2.21 mmol) 44 % d. Th.

Schmelzpunkt: 406.3 °C

¹H-NMR (500 MHz, d₆-Dimethylsulfoxid): δ [ppm] = 7.32 - 7.36 (m, 1H, Thiophen 4-H), 7.63 (d, 1H, *J* = 8.9 Hz, 5-H), 7.80 (dd, *J* = 8.8 Hz, *J* = 2.4 Hz, 1H, 6-H), 7.90 (d,

$J = 2.3$ Hz, 1H, 8-H), 8.03 - 8.07 (m, 1H, Thiophen 3-H), 8.19 - 8.23 (m, 1H, Thiophen 5-H), 12.29 (s, 1H, -NH).

^{13}C -NMR (125 MHz, d_6 -Dimethylsulfoxid): δ [ppm] = 120.5 (C-5), 122.6 (C-8), 122.7 (C-7), 128.8 (Thiophen C-2), 129.9 (C-8'), 132.0 (Thiophen C-5), 133.3 (Thiophen C-3), 133.4 (Thiophen C-4), 134.6 (C-6), 135.1 (C-4'), 149.6 (C-3).

MS (EI, 70 eV): m/z (%): 298 (77) $[\text{M}]^+$, 234 (3), 189 (100), 125 (84), 110 (16), 98 (9), 90 (14).

Elementaranalyse: $\text{C}_{11}\text{H}_7\text{ClN}_2\text{O}_2\text{S}_2$ (298.77 g/mol)

Berechnete Werte: %C 44.22, %H 2.36, %N 9.38

Experimentell bestimmte Werte: %C 44.21, %H 2.33, %N 9.32

4.6.1.37 7-Chlor-3-(thiophen-2-ylmethyl)-4H-1 λ^6 ,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion **19r**

Gemäß der allgemeinen Arbeitsvorschrift werden 1.03 g (5.00 mmol) 2-Amino-5-chlorbenzolsulfonamid **13** und 710 mg (5.00 mmol) 2-Thiophenessigsäure **18r** in 12.5 ml PPSE eingesetzt. Das Rohprodukt wird zunächst aus Ethanol und der daraus resultierende Feststoff aus Methanol umkristallisiert. Die Kristallisation findet bei 4 °C statt.

Ausbeute: 0.58 g (1.85 mmol) 37 % d. Th.

Schmelzpunkt: 233 °C

^1H -NMR (500 MHz, d_6 -Dimethylsulfoxid): δ [ppm] = 4.11 (s, 2H, CH_2 -Brücke), 7.01 (dd, $J = 5.2$ Hz, $J = 3.5$ Hz, 1H, Thiophen 3-H), 7.06 (dd, 1H, $J = 3.4$ Hz, $J = 1.0$ Hz, Thiophen 4-H), 7.39 (d, $J = 8.8$ Hz, 1H, 5-H), 7.46 (dd, $J = 5.1$ Hz, $J = 1.3$ Hz, 1H, Thiophen 5-H), 7.75 (dd, 1H, $J = 8.8$ Hz, $J = 2.4$ Hz, 6-H), 7.86 (d, 1H, $J = 2.4$ Hz, 8-H), 12.29 (s, 1H, -NH).

^{13}C -NMR (125 MHz, d_6 -Dimethylsulfoxid): δ [ppm] = 35.9 (CH_2 -Brücke), 119.9 (C-5), 122.1 (C-8'), 122.8 (C-8), 125.9 (Thiophen C-5), 126.9 (Thiophen C-4), 127.2

(Thiophen C-3), 129.8 (C-7), 133.3 (Thiophen C-2), 133.9 (C-6), 135.7 (C-4'), 157.8 (C-3).

MS (EI, 70 eV): m/z (%): 312 (100) [M]⁺, 248 (41), 203 (13), 189 (49), 125 (65), 97 (93), 90 (10).

Elementaranalyse: C₁₂H₉ClN₂O₂S₂ (312.80 g/mol)

Berechnete Werte: %C 46.08, %H 2.90, %N 8.96

Experimentell bestimmte Werte: %C 46.08, %H 2.78, %N 8.81

4.6.1.38 7-Chlor-3-(*o*-carboran-2-yl)-4*H*-1λ⁶,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion **19s**

Abweichend von der allgemeinen Arbeitsvorschrift werden 1.03 g (5.00 mmol) 2-Amino-5-chlorbenzolsulfonamid **13** und 941 mg (5.00 mmol) *ortho*-Carborancarbonsäure **18s** in 12.5 ml PPSE für 5 h bei 80 °C gerührt. Das gewünschte Produkt kann in der Analytik nicht nachgewiesen werden.

4.6.1.39 7-Chlor-3-(cyclohexylmethyl)-*N*-ethyl-1,1-dioxo-4*H*-1λ⁶,2,4-benzothiadiazin-4-carbothioamid **22**

In einem 50 ml-Zweihalskolben werden 313 mg (1.00 mmol) 7-Chlor-3-(cyclohexylmethyl)-4*H*-1λ⁶,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion **15b** vorgelegt und sekuriert. Es werden 20 ml *N,N*-Dimethylformamid und 79 mg (2.00 mmol) Natriumhydrid (60 %ige Suspension in Öl) zugegeben und zwei Stunden bei Raumtemperatur gerührt. Dann werden 0.09 ml (1.00 mmol) Ethylisothiocyanat **31a** zugetropft und über Nacht bei Raumtemperatur gerührt.. Die Reaktionsmischung wird mit 20 ml dest. Wasser hydrolysiert, dreimal mit je 25 ml Diethylether extrahiert, über Natriumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Das gewünschte Produkt kann in der Analytik nicht nachgewiesen werden.

4.6.2 Synthese der Vorstufen der verbrückten Diazoxide und der o-Carborancarbonsäure 18s

4.6.2.1 1,17-Dibrom-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecan 24

In einem 100 ml-Dreihalskolben mit Rückflusskühler, Tropftrichter und KPG-Rührer werden 4.83 g (17.1 mmol) 3,6,9,12,15-Pentaoxaheptadecan-1,17-diol **23** vorgelegt. Unter Rühren werden nun 1.45 g (5.37 mmol) Phosphortribromid über den Tropftrichter innerhalb von 90 min zugegeben. Anschließend wird das Produkt im Vakuum destilliert.

Ausbeute: 6.00 g (14.7 mmol) 86 % d. Th.

$^1\text{H-NMR}$ (500 MHz, d_6 -Dimethylsulfoxid): δ [ppm] = 3.50 - 3.60 (m, 20H, CH_2 -Gruppen, $\text{Br-CH}_2\text{-CH}_2\text{-O-}$), 3.73 (t, $J = 5.8$ Hz, 4H, $\text{Br-CH}_2\text{-CH}_2\text{-O-}$).

4.6.2.2 4,7,10,13,16-Pentaoxanonadecandinitril 25 über die Kolbe-Nitrilsynthese

In einem 50 ml-Einhalskolben mit Rückflusskühler werden 3.00 g (7.35 mmol) 1,17-Dibrom-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecan **24**, 1.00 g (20.4 mmol) Natriumcyanid und 0.12 g (0.82 mmol) Natriumiodid in 20 ml über Molekularsieb 3 Å getrocknetem Aceton aufgenommen und 20 h zum Rückfluss erhitzt. Man lässt den Ansatz abkühlen, saugt vom Salz ab, das mit 5 ml Aceton gewaschen wird und vernichtet den Filterrückstand in einer leicht alkalischen 20 %igen Eisen(II)sulfat-Lösung. Das Filtrat wird in 20 ml Wasser gegossen und viermal mit je 30 ml Chloroform extrahiert. Die vereinigten organischen Extrakte werden über Natriumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Das gewünschte Produkt konnte in der Analytik nicht nachgewiesen werden.

4.6.2.3 3-(2-Carboxyethoxy)propionsäure **27**

In einem 50 ml-Einhalskolben mit Rückflusskühler werden 2.00 g (16.1 mmol) 3-(2-Cyanoethoxy)propionitril **26** unter Rühren mit 5.5 ml konz. Salzsäure versetzt. Die Reaktionsmischung wird 24 h bei 50 °C und 12 h bei Raumtemperatur gerührt. Danach werden 25 ml Diethylether zugegeben. Das ausgefällte Ammoniumchlorid wird abfiltriert und das Rohprodukt über Natriumsulfat getrocknet. Das Lösemittel wird am Rotationsverdampfer entfernt. Das Produkt kristallisiert nach einiger Zeit aus. Es bilden sich weiße Kristalle.

Ausbeute: 1.20 g (7.41 mmol) 46 % d. Th.

¹H-NMR (500 MHz, d₆-Dimethylsulfoxid): δ [ppm] = 2.41 (t, *J* = 6.3 Hz, 4H, -O-CH₂-CH₂-COOH), 3.56 (t, *J* = 6.3 Hz, 4H, -O-CH₂-CH₂-COOH), 12.16 (s, 2H, -O-CH₂-CH₂-COOH).

¹³C-NMR (125 MHz, d₆-Dimethylsulfoxid): δ [ppm] = 34.8 (-O-CH₂-CH₂-COOH), 66.1 (-O-CH₂-CH₂-COOH), 172.8 (-O-CH₂-CH₂-COOH).

4.6.2.4 *ortho*-Carborancarbonsäure **18s**: Carboxylierung von *ortho*-Carboran **20**

In einem sekurierten 100 ml-Zweihalskolben werden 0.50 g (3.47 mmol) *ortho*-Carboran **20** vorgelegt in 40 ml abs. Diethylether gelöst und auf -78 °C abgekühlt. Dann gibt man 2.4 ml (3.81 mmol) *n*-Butyllithium (1.6 M in *n*-Hexan) zu und rührt den Ansatz bei dieser Temperatur 20 min lang. Es werden 1.30 g gemörserteres Trockeneis zugegeben und 1 h bei -78 °C gerührt. Anschließend wird die Reaktionsmischung auf Raumtemperatur erwärmt und überschüssiger Diethylether am Rotationsverdampfer entfernt. Darauf wird die Reaktionsmischung mit 30 ml dest. Wasser hydrolysiert, überschüssiges *ortho*-Carboran **20** zweimal mit je 15 ml *n*-Hexan extrahiert und die wässrige Phase mit Salzsäure (3 mol/l) angesäuert. Diese wird anschließend viermal mit je 20 ml *n*-Hexan extrahiert, die vereinigten

organischen Phasen über Natriumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt.

Ausbeute: 0.64 g (3.40 mmol) 98 % d. Th. (Lit. 97 %)

$^1\text{H-NMR}$ (500 MHz, d_6 -Dimethylsulfoxid): δ [ppm] = 1.67 - 3.24 (m, 10H, -BH), 4.05 (s, 1H, -CH), 9.99 (s, 1H, -COOH).

MS (EI, 70 eV): m/z (%): 188 (100) $[\text{M}]^+$, 158 (15), 143 (93), 129 (19), 60 (30), 44 (32).

IR (KBr) $[\text{cm}^{-1}]$: 3080.4, 2589.4, 1724.0, 1491.2, 1427.7, 1279.4, 1194.7, 1127.6, 1092.0, 1060.3, 1011.3, 897.0, 833.3, 732.4, 711.7, 622.0, 577.0, 476.4, 426.8.

4.6.2.5 *ortho*-Carborancarbonsäurechlorid 21

In einem 100 ml-Einhalskolben mit Claisenaufsatz und Abgang zur Stickstoff-Vakuum-Linie werden 0.60 g (3.19 mmol) *ortho*-Carborancarbonsäure **18s** vorgelegt und sekuriert. Danach werden 60 ml (830 mmol) frisch destilliertes Thionylchlorid sowie 0.6 ml *N,N*-Dimethylformamid zugegeben und der Ansatz 5 h bei 90 °C gerührt. Anschließend werden das Lösemittel und überschüssiges Thionylchlorid im Vakuum entfernt, der Rückstand mit Wasser versetzt und dreimal mit je 100 ml Ethylacetat extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen werden mit 25 ml ges. Natriumchlorid-Lösung gewaschen über Natriumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Nach der säulenchromatographischen Reinigung ist das Produkt in der Analytik nicht mehr nachweisbar.

4.6.3 Allgemeine Arbeitsvorschrift für die Synthese der verbrückten Diazoxide 29a-f

In einem 50 ml-Zweihalskolben mit Rückflusskühler und Stopfen werden etwa 12.5 ml Polyphosphorsäuretrimethylsilylester vorgelegt und in einem

Silikonölbad (160 °C) unter Rühren erhitzt. Anschließend werden über den zu diesem Zweck geöffneten zweiten Hals 2.50 mmol der entsprechenden Dicarbonsäure **28a-f** sowie 1.03 g (5.00 mmol) 2-Amino-5-chlorbenzolsulfonamid **13** in dem heißen Silylester gelöst. Der Reaktionsansatz wird bei dieser Temperatur 3 h gerührt. Die noch heiße Reaktionsmischung wird danach vorsichtig in 250 ml Wasser gegossen, für 2 h bei Raumtemperatur gerührt und der gebildete Feststoff abfiltriert. Dieses Rohprodukt wird aus Ethanol umkristallisiert.

Ausgehend von dieser allgemeinen Arbeitsvorschrift wurden die folgenden Produkte erhalten und charakterisiert:

4.6.3.1 7-Chlor-3-({4-[(7-chlor-1,1-dioxo-4*H*-1 λ ⁶,2,4-benzothiadiazin-3-yl)methyl]phenyl)methyl)-4*H*-1 λ ⁶,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion **29a**

Abweichend von der allgemeinen Arbeitsvorschrift werden 1.03 g (5.00 mmol) 2-Amino-5-chlorbenzolsulfonamid **13** und 485 mg (2.50 mmol) *p*-Phenyldiessigsäure **28a** in 12.5 ml PPSE für 5 h bei 80 °C gerührt. Das gewünschte Produkt kann nicht erhalten werden.

4.6.3.2 7-Chlor-3-[2-(7-chlor-1,1-dioxo-4*H*-1 λ ⁶,2,4-benzothiadiazin-3-yl)ethinyl]-4*H*-1 λ ⁶,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion **29b**

Gemäß der allgemeinen Arbeitsvorschrift werden 1.03 g (5.00 mmol) 2-Amino-5-chlorbenzolsulfonamid **13** und 285 mg (2.50 mmol) Acetyldicarbonsäure **28b** in 12.5 ml PPSE eingesetzt. Das gewünschte Produkt kann in der Analytik nicht nachgewiesen werden.

4.6.3.3 7-Chlor-3-(2-{4-[2-(7-chlor-1,1-dioxo-4*H*-1 λ ⁶,2,4-benzothiadiazin-3-yl)ethyl]phenyl}ethyl)-4*H*-1 λ ⁶,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion **29c**

Gemäß der allgemeinen Arbeitsvorschrift werden 1.03 g (5.00 mmol) 2-Amino-5-chlorbenzolsulfonamid **13** und 556 mg (2.50 mmol) 1,4-Phenyldipropionsäure **28c** in 12.5 ml PPSE eingesetzt. Das Rohprodukt wird in wässriger Natriumhydroxid-Lösung (0.2 mol/l) gelöst, anschließend mit Salzsäure (1 mol/l) ausgefällt, filtriert und mit wenig dest. Wasser gewaschen.

Ausbeute: 738 mg (1.31 mmol) 52 % d. Th.

Schmelzpunkt: 368.9 °C

¹H-NMR (500 MHz, d₆-Dimethylsulfoxid): δ [ppm] = 2.84 (t, J = 7.7 Hz, 4H, Diazoxid-CH₂-CH₂-Ph-), 2.96 (t, J = 7.7 Hz, 4H, Diazoxid-CH₂-CH₂-Ph-), 7.20 (s, 4H, Phenyl 2-H, Phenyl 3-H, Phenyl 5-H, Phenyl 6-H), 7.37 (d, J = 8.8 Hz, 2H, 5-H), 7.72 (d, J = 8.8 Hz, J = 2.3 Hz, 2H, 6-H), 7.84 (d, J = 2.2 Hz, 2H, 8-H), 12.31 (s, 2H, -NH).

¹³C-NMR (125 MHz, d₆-Dimethylsulfoxid): δ [ppm] = 31.1 (Diazoxid-CH₂-CH₂-Ph-), 36.8 (Diazoxid-CH₂-CH₂-Ph-), 119.7 (C-5), 122.2 (C-8'), 122.7 (C-8), 128.3 (Phenyl C-2, Phenyl C-3, Phenyl C-5, Phenyl C-6), 129.5 (C-7), 133.2 (C-6), 133.9 (C-4'), 137.9 (Phenyl C-1, Phenyl C-4), 159.6 (C-3).

MS (EI, 70 eV): m/z (%): 373 (12), 269 (14), 127 (52), 117 (100), 104 (32), 63 (18).

4.6.3.4 3-[3-Amino-3-(7-chlor-1,1-dioxo-4*H*-1 λ ⁶,2,4-benzothiadiazin-3-yl)propyl]-7-chlor-4*H*-1 λ ⁶,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion **29d**

Gemäß der allgemeinen Arbeitsvorschrift werden 1.03 g (5.00 mmol) 2-Amino-5-chlorbenzolsulfonamid **13** und 368 mg (2.50 mmol) *L*-Glutaminsäure **28d** in 12.5 ml PPSE eingesetzt. Das gewünschte Produkt kann in der Analytik nicht nachgewiesen werden.

4.6.3.5 7-Chlor-3-[(2-{2-[(7-chlor-1,1-dioxo-4*H*-1λ⁶,2,4-benzothiadiazin-3-yl)methoxy]ethoxy)methyl]-4*H*-1λ⁶,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion 29e

Gemäß der allgemeinen Arbeitsvorschrift werden 1.03 g (5.00 mmol) 2-Amino-5-chlorbenzolsulfonamid **13** und 555 mg (2.50 mmol) 3,6,9-Trioxaundecandisäure **28e** in 12.5 ml PPSE eingesetzt. Das Rohprodukt wird in wässriger Natriumhydroxid-Lösung (0.2 mol/l) gelöst, anschließend mit Salzsäure (1 mol/l) ausgefällt, filtriert und mit wenig dest. Wasser gewaschen.

Ausbeute: 124 mg (0.22 mmol) 9 % d. Th.

Schmelzpunkt: 204.9 °C

¹H-NMR (500 MHz, d₆-Dimethylsulfoxid): δ [ppm] = 3.60 - 3.64 (m, 4H, Diazoxid-CH₂-O-CH₂-CH₂-O-), 3.68 - 3.73 (m, 4H, Diazoxid-CH₂-O-CH₂-CH₂-O-), 4.41 (s, 4H, Diazoxid-CH₂-O-CH₂-CH₂-O-), 7.58 (d, *J* = 8.9 Hz, 2H, 5-H), 7.74 (dd, *J* = 8.9 Hz, *J* = 2.4 Hz, 2H, 6-H), 7.86 (d, *J* = 2.3 Hz, 2H, 8-H), 12.04 (s, 2H, -NH).

¹³C-NMR (125 MHz, d₆-Dimethylsulfoxid): δ [ppm] = 69.4 (Diazoxid-CH₂-O-CH₂-CH₂-O-), 69.9 (Diazoxid-CH₂-O-CH₂-CH₂-O-), 70.3 (Diazoxid-CH₂-O-CH₂-CH₂-O-), 120.3 (C-5), 122.5 (C-8'), 122.7 (C-8), 129.9 (C-7), 133.2 (C-6), 133.7 (C-4'), 157.5 (C-3).

MS (EI, 70 eV): *m/z* (%): 335 (73), 291 (45), 273 (100), 231 (40), 190 (16), 127 (20), 65 (13).

Elementaranalyse: C₂₀H₂₀Cl₂N₄O₇S₂ (563.43 g/mol)

Berechnete Werte: %C 42.63, %H 3.58, %N 9.94

Experimentell bestimmte Werte: %C 40.95, %H 3.60, %N 9.94

4.6.3.6 7-Chlor-3-{2-[(7-chlor-1,1-dioxo-4*H*-1λ⁶,2,4-benzothiadiazin-3-yl)methoxy]phenoxy)methyl}-4*H*-1λ⁶,2,4-benzothiadiazin-1,1-dion **29f**

Gemäß der allgemeinen Arbeitsvorschrift werden 1.03 g (5.00 mmol) 2-Amino-5-chlorbenzolsulfonamid **13** und 565 mg (2.50 mmol) *ortho*-Phenylendioxydiessigsäure **29f** in 12.5 ml PPSE eingesetzt. Das Rohprodukt wird in wässriger Natriumhydroxid-Lösung (0.2 mol/l) gelöst, anschließend mit Salzsäure (1 mol/l) ausgefällt, filtriert und mit wenig dest. Wasser gewaschen.

Ausbeute: 0.76 g (1.34 mmol) 54 % d. Th.

Schmelzpunkt: 288.2 °C

¹H-NMR (500 MHz, d₆-Dimethylsulfoxid): δ [ppm] = 5.04 (s, 4H, CH₂-Brücken), 7.02 (dd, *J* = 6.0 Hz, *J* = 3.6 Hz, 2H, Phenyl 4-H, Phenyl 5-H), 7.13 (dd, 2H, *J* = 6.0 Hz, *J* = 3.6 Hz, Phenyl 3-H, Phenyl 6-H), 7.54 (d, *J* = 8.9 Hz, 2H, 5-H), 7.69 (dd, *J* = 8.9 Hz, *J* = 2.4 Hz, 2H, 6-H), 7.75 (d, 2H, *J* = 2.3 Hz, 8-H), 12.57 (s, 2H, -NH).

¹³C-NMR (125 MHz, d₆-Dimethylsulfoxid): δ [ppm] = 68.6 (CH₂-Brücken), 115.8 (Phenyl C-3, Phenyl C-6), 120.2 (C-5), 122.5 (Phenyl C-4, Phenyl C-5), 122.7 (C-8), 122.7 (C-8'), 130.0 (C-7), 133.2 (C-6), 133.6 (C-4'), 147.5 (Phenyl C-1, Phenyl C-2), 156.0 (C-3).

MS (EI, 70 eV): *m/z* (%): 339 (16), 230 (100), 189 (22), 127 (32), 121 (20), 52 (11).

4.7 Versuche zur Synthese der Benzoxazol-basierten Thioamide

4.7.1 2-(1,3-Benzoxazol-2-yl)-*N*-ethylethanthioamid **31a**

In einem sekurierten 100 ml-Zweihalskolben mit Serumkappe und Abgang zur Stickstoff-Vakuum-Linie werden 1.33 g (10 mmol) 2-Methylbenzoxazol **30** in 20 ml abs. THF vorgelegt, auf -78 °C gekühlt und 6.6 ml (10.5 mmol) *n*-Butyllithium (1.6 mol/l in *n*-Hexan) zugegeben. Der Reaktionsansatz wird 1 h bei -78 °C gerührt. Anschließend werden 0.87 g (10 mmol) Ethylisothiocyanat **31a** zugegeben und der Ansatz über Nacht auf Raumtemperatur erwärmt. Die Reaktionsmischung wird mit 15 ml ges. Ammoniumchlorid-Lösung hydrolysiert, dreimal mit je 30 ml Diethylether extrahiert, die vereinten organischen Phasen über Natriumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Die passende Isolierungsmethode ist noch nicht gefunden worden.

GC/MS ($R_T = 9.54$ min): m/z (%): 220 (43) $[M]^+$, 187 (17), 159 (10), 133 (100), 101 (11), 60 (10).

4.7.2 2-(1,3-Benzoxazol-2-yl)-*N*-butylethanthioamid **32b**

In einem sekurierten 100 ml-Zweihalskolben mit Serumkappe und Abgang zur Stickstoff-Vakuum-Linie werden 1.33 g (10.0 mmol) 2-Methylbenzoxazol **30** in 20 ml abs. Diethylether vorgelegt und 7.5 ml (12.0 mmol) *n*-Butyllithium (1.6 mol/l in *n*-Hexan) zugegeben und der Reaktionsansatz 1 h bei Raumtemperatur gerührt. Anschließend werden 1.15 g (10.0 mmol) Butylisothiocyanat **31b** zugegeben und der Ansatz 24 h bei Raumtemperatur gerührt. Die Reaktionsmischung wird mit 15 ml Ammoniumchlorid-Lösung hydrolysiert, dreimal mit je 30 ml Diethylether extrahiert, die vereinten organischen Phasen über Natriumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Die anschließende säulenchromatographische

Reinigung mit Chloroform als Laufmittel liefert keine ausreichende Trennleistung, weshalb stets Mischfraktionen vorliegen.

Rohprodukt: 1.95 g

GC/MS ($R_T = 10.54$ min): m/z (%): 248 (16) $[M]^+$, 176 (17), 159 (18), 133 (100), 129 (69).

4.7.3 **N-Ethyl-1,2-benzoxazol-3-carbothioamid**

In einem sekurierten 100 ml-Zweihalskolben mit Serumkappe und Abgang zur Stickstoff-Vakuum-Linie werden 0.51 g (5.00 mmol) Diisopropylamin in 15 ml abs. THF gelöst, auf -78 °C gekühlt und langsam mit 3.2 ml (5.00 mmol) *n*-Butyllithium (1.6 mol/l in *n*-Hexan) versetzt. Anschließend wird die Lösung 30 min bei 0 °C gerührt und danach wieder auf -78 °C gekühlt. Zu dieser Lösung wird nun eine auf -78 °C gekühlte Lösung aus 0.50 g (4.20 mmol) 1,2-Benzisoxazol **33** in 15 ml abs. THF gegeben. Die Reaktionsmischung wird für 1 h ohne Kühlung gerührt, anschließend mit 0.37 g (4.20 mmol) Ethylisothiocyanat **31a** versetzt und über Nacht weiter gerührt. Man hydrolysiert den Reaktionsansatz mit 20 ml Wasser und 10 ml ges. Natriumchlorid-Lösung und extrahiert die wässrige Phase dreimal mit je 75 ml Chloroform. Die vereinigten organischen Phasen werden über Natriumsulfat getrocknet, filtriert und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Das gewünschte Produkt kann in der Analytik nicht nachgewiesen werden.

4.8 Versuche zur Synthese der Benzothiazol-basierten Amide und Thioamide

4.8.1 Synthese der substituierten Benzothiazole 38a-c, 40

4.8.1.1 2-Ethyl-1,3-benzothiazol 38a

In einem 100 ml-Einhalskolben werden 6.26 g (50.0 mmol, 5.4 ml) 2-Aminothiophenol **36** in 50 ml Toluol vorgelegt, 6.38 g (69.0 mmol, 6.0 ml) Propionsäurechlorid **37a** zugegeben und der Reaktionsansatz 30 min bei Raumtemperatur gerührt. Anschließend wird die Reaktionsmischung mit 15 ml Wasser hydrolysiert, mit Chloroform extrahiert, die vereinten organischen Phasen über Natriumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt.

Ausbeute: 7.64 g (46.8 mmol) 94 % d. Th. (Lit. 80 %)

GC/MS ($R_T = 6.15$ min): m/z (%): 163 (74), 162 (100) $[M]^+$, 148 (15), 135 (9), 109 (14), 69 (15).

4.8.1.2 2-Propyl-1,3-benzothiazol 38b

In einem 100 ml-Einhalskolben werden 6.26 g (50.0 mmol, 5.4 ml) 2-Aminothiophenol **36** in 50 ml Toluol vorgelegt, 7.69 g (60.0 mmol, 7.6 ml) Butansäurechlorid **37b** zugegeben und der Reaktionsansatz 30 min bei Raumtemperatur gerührt. Anschließend wird die Reaktionsmischung mit 15 ml Wasser hydrolysiert, mit Chloroform extrahiert, die vereinten organischen Phasen über Natriumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt.

Ausbeute: 8.69 g (49.0 mmol) 98 % d. Th.

GC/MS ($R_T = 6.15$ min): m/z (%): 177 (34) $[M]^+$, 162 (45), 149 (100), 108 (18), 104 (11), 69 (11).

4.8.1.3 2-Benzyl-1,3-benzothiazol 38c

In einem 100 ml-Einhalskolben werden 6.26 g (50.0 mmol, 5.4 ml) 2-Aminothiophenol **36** in 50 ml Toluol vorgelegt, 10.82 g (70.0 mmol, 9.2 ml) Phenylacetylchlorid **37c** zugegeben und der Reaktionsansatz 30 min bei Raumtemperatur gerührt. Anschließend wird die Reaktionsmischung mit 15 ml Wasser hydrolysiert, mit Chloroform extrahiert, die vereinten organischen Phasen über Natriumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt.

Ausbeute: 10.86 g (48.2 mmol) 96 % d. Th.

GC/MS ($R_T = 9.83$ min): m/z (%): 224 (100) $[M]^+$, 112 (10), 91 (32), 65 (16).

4.8.1.4 2-Methyl-5-(trifluormethyl)-1,3-benzothiazol 40

In einem 100 ml-Einhalskolben werden 2.90 g (15.0 mmol) 2-Amino-4-(trifluormethyl)thiophenol **39** in 30 ml Toluol vorgelegt, 1.57 g (20.0 mmol) Acetylchlorid **37d** zugegeben und der Reaktionsansatz 60 min bei Raumtemperatur gerührt. Anschließend wird die Reaktionsmischung mit 15 ml Wasser hydrolysiert, dreimal mit je 25 ml Diethylether extrahiert, die vereinten organischen Phasen über Natriumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Das gewünschte Produkt kann in der Analytik nur in Spuren nachgewiesen werden. Wird die Reaktion unter Rückfluss durchgeführt, entsteht das Dimer des Edukts.

GC/MS ($R_T = 5.59$ min): m/z (%): 217 (100) $[M]^+$, 198 (8), 176 (9), 157 (22), 148 (15), 132 (11), 69 (9).

4.8.2 Allgemeine Arbeitsvorschrift zur Synthese der Benzothiazol-2-carbothioamide

In einem 100 ml-Zweihalskolben mit Magnetrührstäbchen, Serumkappe und Abgang zur kombinierten Stickstoff-Vakuum-Linie werden 10.0 mmol des entsprechenden Benzothiazols **38x** sekuriert und anschließend in 20 ml abs. Diethylether gelöst. Danach wird die Lösung mittels eines Aceton-/Trockeneis-Bades auf -78 °C gekühlt und per Kanüle werden 5.8 ml (10.5 mmol) Phenyllithium (1.8 mol/l in Dibutylether) so zugegeben, dass die mit Hilfe eines Innenthermometers kontrollierte Temperatur nicht über -75 °C steigt. Diese Lösung wird anschließend für 1 h bei -78 °C gerührt und mit 10.0 mmol des entsprechenden Isothiocyanats **31x** versetzt. Der Reaktionsansatz wird über Nacht unter Rühren auf Raumtemperatur erwärmt, mit 20 ml dest. Wasser und 15 ml ges. Ammoniumchlorid-Lösung hydrolysiert und viermal mit je 75 ml Chloroform extrahiert. Die vereinigten organischen Extrakte werden über Natriumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Das Rohprodukt wird entweder säulenchromatographisch gereinigt oder umkristallisiert.

Ausgehend von dieser allgemeinen Arbeitsvorschrift wurden die folgenden Produkte erhalten und charakterisiert:

4.8.2.1 2-(1,3-Benzothiazol-2-yl)-N-(3-chlorpropyl)ethanthioamid **41a**

Abweichend von der allgemeinen Arbeitsvorschrift werden 1.49 g (10.0 mmol, 1.27 ml) 2-Methylbenzothiazol **38d** in 40 ml abs. Diethylether gelöst, mit 6.40 ml Phenyllithium (11.0 mmol, 1.8 mol/l in Dibutylether) lithiiert und mit 1.22 g (10.0 mmol, 0.96 ml) 2-Chlorethylisothiocyanat **31c** umgesetzt. Das gewünschte Produkt kann in der Analytik nur in Spuren nachgewiesen werden.

4.8.2.2 *N*-(2,6-Difluorphenyl)-1,3-benzothiazol-2-carbothioamid 41b

In einem sekurierten 100 ml-Zweihalskolben werden 0.87 g (5.84 mmol) 2-Methylbenzothiazol **38d** in 40 ml abs. Diethylether vorgelegt und auf $-78\text{ }^{\circ}\text{C}$ gekühlt. Anschließend werden 3.74 ml (6.42 mmol, 1.1 eq.) Phenyllithium (1.8 mol/l in Dibutylether) zugegeben und 2 h bei $-78\text{ }^{\circ}\text{C}$ gerührt. Es werden 1.00 g (5.84 mmol) 2,6-Difluorphenylisothiocyanat **31g** zugetropft und die Reaktionslösung über Nacht auf Raumtemperatur aufgetaut. Das Reaktionsgemisch wird mit 20 ml dest. Wasser und 20 ml gesättigter Ammoniumchlorid-Lösung hydrolysiert und mit 150 ml Diethylether extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen werden über Natriumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Das gewünschte Produkt kann in der Analytik nicht nachgewiesen werden.

4.8.2.3 2-(1,3-Benzothiazol-2-yl)-*N*-ethylpropanthioamid 41c

Gemäß der allgemeinen Arbeitsvorschrift werden 1.63 g (10.0 mmol) 2-Ethylbenzothiazol **38a** und 880 mg (10.0 mmol) Ethylisothiocyanat **31a** eingesetzt. Das Rohprodukt wird säulenchromatographisch mit einem 1:1-Gemisch aus *n*-Hexan und Ethylacetat als Laufmittel gereinigt ($R_f = 0.23$).

Ausbeute: 340 mg (1.36 mmol) 14 % d. Th.

Schmelzpunkt: $96.9\text{ }^{\circ}\text{C}$

$^1\text{H-NMR}$ (500 MHz, Chloroform- d): δ [ppm] = 1.27 (t, $J = 8.1\text{ Hz}$, 1H, $-\text{CH}_2-\text{CH}_3$), 1.86 (d, $J = 7.2\text{ Hz}$, 3H, $-\text{CH}-\text{CH}_3$), 3.61 - 3.76 (m, 2H, $-\text{CH}_2-\text{CH}_3$), 4.62 (q, $J = 7.2\text{ Hz}$, 1H, $-\text{CH}-\text{CH}_3$), 7.41 (ddd, $J = 7.8\text{ Hz}$, $J = 7.5\text{ Hz}$, $J = 1.1\text{ Hz}$, 1H, 6-H), 7.50 (ddd, $J = 8.3\text{ Hz}$, $J = 7.3\text{ Hz}$, $J = 1.2\text{ Hz}$, 1H, 5-H), 7.88 (d, $J = 7.8\text{ Hz}$, 1H, 7-H), 8.00 (d, $J = 8.1\text{ Hz}$, 1H, 4-H), 9.26 (s, 1H, -NH).

^{13}C -NMR (125 MHz, Chloroform-d): δ [ppm] = 12.9 (-CH₂-CH₃), 23.6 (-CHCH₃), 41.3 (-CH₂-CH₃), 53.5 (-CH) 121.8 (C-4), 122.7 (C-7), 125.4 (C-6), 126.3 (C-5), 134.4 (C-7'), 152.7 (C-3'), 171.7 (C-2), 201.1 (C=S).

GC/MS (R_T = 10.37 min): m/z (%): 250 (50) $[\text{M}]^+$, 217 (78), 205 (7), 162 (100), 136 (15), 109 (32).

Elementaranalyse: C₁₂H₁₄N₂S₂ (250.38 g/mol)

Berechnete Werte: %C 57.56, %H 5.64, %N 11.19

Experimentell bestimmte Werte: %C 57.76, %H 5.58, %N 11.14

4.8.2.4 2-(1,3-Benzothiazol-2-yl)-*N*-*tert*-butylpropanthioamid 41d

Abweichend von der allgemeinen Arbeitsvorschrift werden 0.67 g (4.1 mmol) 2-Ethylbenzothiazol **38a** und 520 mg (4.1 mmol) *tert*-Butylisothiocyanat **31d** eingesetzt. Das Rohprodukt wird säulenchromatographisch mit Ethylacetat als Laufmittel gereinigt (R_f = 0.64).

Ausbeute: 660 mg (2.37 mmol) 58 % d. Th.

Schmelzpunkt: 124.7 °C

^1H -NMR (500 MHz, Chloroform-d): δ [ppm] = 1.54 (s, 9H, -C(CH₃)₃), 1.82 (d, J = 7.2 Hz, 3H, -CH-CH₃), 4.49 (q, J = 7.2 Hz, 1H, -CH-CH₃), 7.41 (ddd, J = 8.1 Hz, J = 7.3 Hz, J = 1.1 Hz, 1H, 6-H), 7.50 (ddd, J = 8.3 Hz, J = 7.3 Hz, J = 1.2 Hz, 1H, 5-H), 7.87 - 7.90 (m, 1H, 7-H), 7.97 - 8.00 (m, 1H, 4-H), 9.21 (s, 1H, -NH).

^{13}C -NMR (125 MHz, Chloroform-d): δ [ppm] = 23.9 (-CH-CH₃), 27.3 (-C(CH₃)₃), 55.7 (-C(CH₃)₃), 56.0 (-CH-CH₃), 121.8 (C-4) 122.6 (C-7), 125.3 (C-6), 126.3 (C-5), 134.4 (C-7'), 152.7 (C-3'), 172.1 (C-2), 199.8 (C=S).

GC/MS (R_T = 10.47 min): m/z (%): 278 (22) $[\text{M}]^+$, 189 (13), 163 (100), 109 (15), 57 (20).

Elementaranalyse: C₁₄H₁₈N₂S₂ (278.44 g/mol)

Berechnete Werte: %C 60.39, %H 6.52, %N 10.06

Experimentell bestimmte Werte: %C 60.90, %H 6.36, %N 9.58

4.8.2.5 **N-(Adamantan-2-yl)-2-(1,3-benzothiazol-2-yl)propanthioamid 41e**

Gemäß der allgemeinen Arbeitsvorschrift werden 1.63 g (10.0 mmol) 2-Ethylbenzothiazol **38a** und 1.93 g (10.0 mmol) 1-Adamantylisothiocyanat **31e** eingesetzt und während der Aufarbeitung mit Diethylether extrahiert. Alternativ wird statt Phenyllithium (10.5 mmol, 1.8 mol/l in Dibutylether) *n*-Butyllithium (10.5 mmol, 1.6 mol/l in *n*-Hexan) eingesetzt. Das gewünschte Produkt kann in beiden Fällen in der Analytik nicht nachgewiesen werden.

4.8.2.6 **2-(1,3-Benzothiazol-2-yl)-N-phenylpropanthioamid 41f**

Gemäß der allgemeinen Arbeitsvorschrift werden 1.63 g (10.0 mmol) 2-Ethylbenzothiazol **38a** und 1.35 g (10.0 mmol, 1.2 ml) Phenylisothiocyanat **31f** eingesetzt. Das gewünschte Produkt kann in der Analytik nicht nachgewiesen werden.

4.8.2.7 **2-(1,3-Benzothiazol-2-yl)-N-ethylbutanthioamid 41g**

Gemäß der allgemeinen Arbeitsvorschrift werden 1.77 g (10.0 mmol) 2-Propylbenzothiazol **38b** und 880 mg (10.0 mmol) Ethylisothiocyanat **31a** eingesetzt. Das Rohprodukt wird säulenchromatographisch mit Chloroform als Laufmittel gereinigt ($R_f = 0.43$).

Ausbeute: 240 mg (0.96 mmol) 10 % d. Th.

Schmelzpunkt: 129.8 °C

$^1\text{H-NMR}$ (500 MHz, Chloroform-d): δ [ppm] = 0.97 (t, J = 7.4 Hz, 3H, -CH-CH₂-CH₃), 1.27 (t, J = 7.3 Hz, 3H, -NH-CH₂-CH₃), 2.20 - 2.39 (m, 2H, -CH-CH₂-CH₃), 3.61 - 3.76 (m, 2H, -NH-CH₂-CH₃), 4.46 (dd, J = 6.0 Hz, J = 8.3 Hz, 1H, -CH), 7.41 (t, J = 7.6 Hz, 1H, 6-H), 7.50 (t, J = 7.7 Hz, 1H, 5-H), 7.88 (d, J = 8.0 Hz, 1H, 7-H), 8.00 (d, J = 8.2 Hz, 1H, 4-H), 9.32 (s, 1H, -NH).

$^{13}\text{C-NMR}$ (125 MHz, Chloroform-d): δ [ppm] = 11.7 (-CH-CH₂-CH₃), 13.3 (-NH-CH₂-CH₃), 31.7 (-CH-CH₂-CH₃), 41.2 (-NH-CH₂-CH₃), 61.0 (-CH), 121.7 (C-4), 122.6 (C-7), 125.3 (C-6), 126.3 (C-5), 134.5 (C-7'), 152.7 (C-3'), 170.6 (C-2), 200.1 (C=S).

GC/MS (R_T = 10.75 min): m/z (%): 264 (45) $[\text{M}]^+$, 231 (19), 203 (14), 192 (18), 176 (100), 162 (91), 148 (12), 109 (17).

Elementaranalyse: C₁₃H₁₆N₂S₂ (264.41 g/mol)

Berechnete Werte: %C 59.05, %H 6.10, %N 10.59

Experimentell bestimmte Werte: %C 59.09, %H 6.12, %N 10.58

4.8.2.8 2-(1,3-Benzothiazol-2-yl)-*N-tert.*-butylbutanthioamid 41h

Gemäß der allgemeinen Arbeitsvorschrift werden 1.77 g (10.0 mmol) 2-Propylbenzothiazol **38b** und 1.15 g (10.0 mmol) *tert.*-Butylisothiocyanat **31d** eingesetzt. Das Rohprodukt wird säulenchromatographisch mit einem 2:1-Gemisch aus Chloroform und Diethylether als Laufmittel von Eduktrückständen befreit und mit Methanol zurückgewonnen.

Ausbeute: 260 mg (0.89 mmol) 9 % d. Th.

Schmelzpunkt: 141.6 °C

$^1\text{H-NMR}$ (500 MHz, Chloroform-d): δ [ppm] = 0.97 (t, J = 7.4 Hz, 3H, -CH-CH₂-CH₃), 1.54 (s, 9H, -C(CH₃)₃), 2.16 - 2.26 (m, 1H, -CH-CH₂-CH₃), 2.28 - 2.37 (m, 1H, -CH-CH₂-CH₃), 4.33 (dd, J = 8.4 Hz, J = 6.0 Hz, 1H, -CH-CH₂-CH₃), 7.41 (ddd, J = 8.2 Hz, J = 7.3 Hz, J = 1.1 Hz, 1H, 6-H), 7.50 (ddd, J = 8.3 Hz, J = 7.3 Hz, J = 1.2 Hz, 1H, 5-H), 7.87 - 7.90 (m, 1H, 7-H), 7.97 - 8.01 (m, 1H, 4-H), 9.29 (s, 1H, -NH).

^{13}C -NMR (125 MHz, Chloroform-d): δ [ppm] = 11.8 (-CH-CH₂-CH₃), 27.4 (-C(CH₃)₃), 32.0 (-CH-CH₂-CH₃), 55.8 (-C(CH₃)₃), 63.5 (-CH-CH₂-CH₃), 121.8 (C-4), 122.7 (C-7), 125.4 (C-6), 126.4 (C-5), 134.5 (C-7'), 152.7 (C-3'), 171.1 (C-2), 198.7 (C=S).

GC/MS (R_T = 10.45 min): m/z (%): 292 (24) [M]⁺, 235 (15), 203 (11), 176 (64), 162 (100), 109 (9).

Elementaranalyse: C₁₅H₂₀N₂S₂ (292.46 g/mol)

Berechnete Werte: %C 61.60, %H 6.89, %N 9.58

Experimentell bestimmte Werte: %C 59.88, %H 6.83, %N 9.36

Abweichend von der allgemeinen Arbeitsvorschrift werden 0.89 g (5.00 mmol) 2-Propylbenzothiazol **38b** mit 3.4 ml (5.50 mmol) *n*-Butyllithium (1.6 mol/l in *n*-Hexan) lithiiert und mit 0.58 g (5.00 mmol) *tert.*-Butylisothiocyanat **31d** umgesetzt. Das Rohprodukt wird säulenchromatographisch Chloroform als Laufmittel gereinigt (R_f = 0.24) und anschließend aus *n*-Hexan umkristallisiert.

Ausbeute: 165 mg (0.56 mmol) 11 % d. Th.

^1H -NMR (500 MHz, Chloroform-d): δ [ppm] = 0.97 (t, J = 7.4 Hz, 3H, -CH-CH₂-CH₃), 1.54 (s, 9H, -C(CH₃)₃), 2.17 - 2.25 (m, 1H, -CH-CH₂-CH₃), 2.29 - 2.36 (m, 1H, -CH-CH₂-CH₃), 4.35 (dd, J = 8.3 Hz, J = 6.1 Hz, 1H, -CH-CH₂-CH₃), 7.41 (ddd, J = 8.2 Hz, J = 7.3 Hz, J = 1.1 Hz, 1H, 6-H), 7.50 (ddd, J = 8.3 Hz, J = 7.2 Hz, J = 1.1 Hz, 1H, 5-H), 7.88 (d, J = 7.9 Hz, 1H, 7-H), 7.98 (d, J = 8.1 Hz, 1H, 4-H), 9.29 (s, 1H, -NH).

^{13}C -NMR (125 MHz, Chloroform-d): δ [ppm] = 11.7 (-CH-CH₂-CH₃), 27.4 (-C(CH₃)₃), 31.9 (-CH-CH₂-CH₃), 55.8 (-C(CH₃)₃), 63.3 (-CH-CH₂-CH₃), 121.8 (C-4), 122.5 (C-7), 125.3 (C-6), 126.3 (C-5), 134.4 (C-7'), 152.4 (C-3'), 171.2 (C-2), 198.6 (C=S).

GC/MS (R_T = 10.45 min): m/z (%): 292 (25) [M]⁺, 235 (12), 203 (11), 176 (62), 162 (100), 109 (7).

4.8.2.9 **N-Ethyl-2-(5-methoxy-1,3-benzothiazol-2-yl)ethanthioamid 43a**

Abweichend von der allgemeinen Arbeitsvorschrift werden 1.79 g (10.0 mmol) 5-Methoxy-2-methylbenzothiazol **42a**, 6.9 ml (11.0 mmol) *n*-Butyllithium (1.6 mol/l in *n*-Hexan), 40 ml abs. Diethylether und 880 mg (10.0 mmol) Ethylisothiocyanat **31a** eingesetzt. Das Rohprodukt wird säulenchromatographisch mit einem 1:1-Gemisch aus Ethylacetat und *n*-Hexan als Laufmittel gereinigt ($R_f = 0.38$) und anschließend aus Ethylacetat umkristallisiert.

Ausbeute: 190 mg (0.71 mmol) 7 % d. Th.

Schmelzpunkt: 114.6 °C

$^1\text{H-NMR}$ (500 MHz, Chloroform-*d*): δ [ppm] = 1.29 (t, $J = 7.3$ Hz, 3H, -NH-CH₂-CH₃), 3.71 (dq, $J = 7.3$ Hz, $J = 5.5$ Hz, 2H, -NH-CH₂-CH₃), 3.89 (s, 3H, -O-CH₃), 4.55 (s, 2H, -CH₂-CS-), 7.07 (dd, $J = 8.8$ Hz, $J = 2.4$ Hz, 1H, 6-H), 7.46 (d, $J = 2.5$ Hz, 1H, 4-H), 7.72 (d, $J = 8.8$ Hz, 1H, 7-H), 9.54 (s, 1H, -NH).

$^{13}\text{C-NMR}$ (125 MHz, Chloroform-*d*): δ [ppm] = 12.9 (-NH-CH₂-CH₃), 41.3 (-NH-CH₂-CH₃), 48.9 (-CH₂-CS-), 55.7 (-O-CH₃), 104.9 (C-4), 115.9 (C-6), 122.0 (C-7), 126.2 (C-7'), 153.3 (C-3'), 159.3 (C-5), 166.9 (C-2), 194.8 (C=S).

GC/MS ($R_T = 11.83$ min): m/z (%): 266 (34) [M]⁺, 233 (19), 179 (100), 164 (21), 136 (11).

Elementaranalyse: C₁₂H₁₄N₂OS₂ (266.38 g/mol)

Berechnete Werte: %C 54.11, %H 5.30, %N 10.52

Experimentell bestimmte Werte: %C 53.94, %H 5.45, %N 10.37

4.8.2.10 **N-Ethyl-2-(6-methoxy-1,3-benzothiazol-2-yl)ethanthioamid 43b**

Abweichend von der allgemeinen Arbeitsvorschrift werden 0.45 g (2.50 mmol) 6-Methoxy-2-methylbenzothiazol **42b**, 1.7 ml (2.75 mmol) *n*-Butyllithium (1.6 mol/l in

n-Hexan), 40 ml abs. Diethylether und 220 mg (2.50 mmol) Ethylisothiocyanat **31a** eingesetzt. Das Rohprodukt wird säulenchromatographisch mit einem 1:1-Gemisch aus Ethylacetat und *n*-Hexan als Laufmittel gereinigt ($R_f = 0.36$) und anschließend aus Ethylacetat umkristallisiert.

Ausbeute: 50 mg (0.19 mmol) 8 % d. Th.

Schmelzpunkt: 91.4 °C

$^1\text{H-NMR}$ (500 MHz, Chloroform-*d*): δ [ppm] = 1.29 (t, $J = 7.3$ Hz, 3H, -NH-CH₂-CH₃), 3.72 (dq, $J = 7.3$ Hz, $J = 5.5$ Hz, 2H, -NH-CH₂-CH₃), 3.88 (s, 3H, -O-CH₃), 4.51 (s, 2H, -CH₂-CS-), 7.10 (dd, $J = 9.0$ Hz, $J = 2.5$ Hz, 1H, 5-H), 7.32 (d, $J = 2.5$ Hz, 1H, 7-H), 7.87 (d, $J = 8.9$ Hz, 1H, 4-H), 9.48 (s, 1H, -NH).

GC/MS ($R_T = 11.79$ min): m/z (%): 266 (35) $[\text{M}]^+$, 233 (25), 179 (100), 164 (40).

Elementaranalyse: C₁₂H₁₄N₂OS₂ (266.38 g/mol)

Berechnete Werte: %C 54.11, %H 5.30, %N 10.52

Experimentell bestimmte Werte: %C 51.08, %H 5.83, %N 9.55

4.8.2.11 *N*-tert.-Butyl-2-(6-methoxy-1,3-benzothiazol-2-yl)ethanthioamid **43c**

Abweichend von der allgemeinen Arbeitsvorschrift werden 0.45 g (2.50 mmol) 6-Methoxy-2-methylbenzothiazol **42b**, 1.7 ml (2.75 mmol) *n*-Butyllithium (1.6 mol/l in *n*-Hexan), 40 ml abs. Diethylether und 290 mg (2.50 mmol) *tert.*-Butylisothiocyanat **31d** eingesetzt. Nach der säulenchromatographischen Aufarbeitung ist das Produkt in der Analytik nicht mehr nachweisbar.

GC/MS (Rohprodukt) ($R_T = 11.83$ min): m/z (%): 294 (13) $[\text{M}]^+$, 205 (10), 179 (100), 164 (28), 129 (11).

4.8.2.12 N-Ethyl-2-(5-fluor-1,3-benzothiazol-2-yl)ethanthioamid 43d

In einem 100 ml-Zweihalskolben mit Serumkappe und Abgang zur Stickstoff-Vakuüm-Linie werden 0.84 g (5.00 mmol) 5-Fluor-2-methylbenzothiazol **42c** vorgelegt, sekuriert und in 40 ml abs. Diethylether gelöst. Man kühlt die Lösung auf -78 °C ab, tropft 3.4 ml (5.50 mmol, 1.1 eq.) *n*-Butyllithium (1.6 mol/l in *n*-Hexan) zu und rührt den Ansatz für 1 h bei -78 °C. Danach gibt man 0.44 g (5.00 mmol) Ethylisothiocyanat **31a** zu, erwärmt die Reaktionsmischung über Nacht unter Rühren auf Raumtemperatur und hydrolysiert diese mit 15 ml Wasser und 10 ml ges. Ammoniumchlorid-Lösung. Die wässrige Phase wird dreimal mit je 30 ml Chloroform extrahiert. Die vereinten organischen Phasen werden über Natriumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Das gewünschte Produkt kann in der Analytik nicht nachgewiesen werden.

4.8.2.13 2-(5-Chlor-1,3-benzothiazol-2-yl)-N-ethylethanthioamid 43e

Abweichend von der allgemeinen Arbeitsvorschrift werden 1.84 g (10.0 mmol) 5-Chlor-2-methylbenzothiazol **42d**, 6.9 ml (11.0 mmol) *n*-Butyllithium (1.6 mol/l in *n*-Hexan), 40 ml abs. Diethylether und 870 mg (10.0 mmol) Ethylisothiocyanat **31a** eingesetzt. Das Rohprodukt (2.85 g) wird säulenchromatographisch mit Chloroform als Laufmittel gereinigt, ist aber im Anschluss daran in der Analytik nicht mehr nachweisbar.

GC/MS (Rohprodukt) ($R_T = 11.50$ min): m/z (%): 270 (26) $[M]^+$, 237 (21), 183 (100), 148 (14), 101 (20).

4.8.2.14 N-(2-Chlorethyl)-1,3-benzothiazol-2-carbothioamid 45a

In einem sekurierten 100 ml-Zweihalskolben mit Serumkappe und Abgang zur Stickstoff-Vakuum-Linie werden 1.23 g (9.10 mmol, 1.0 ml) Benzo[d]thiazol **44** in 15 ml abs. THF gelöst und mittels Flüssigstickstoff/*n*-Pentan-Bad auf -100 °C gekühlt. Bei dieser Temperatur werden langsam 5.7 ml (9.10 mmol) *n*-Butyllithium (1.6 mol/l in *n*-Hexan) zur obigen Lösung zugetropft, wobei die Innentemperatur -90 °C nicht übersteigen darf. Die Reaktionsmischung wird für 1 h bei -100 °C gerührt. Danach gibt man 1.11 g (9.10 mmol) 2-Chlorethylisothiocyanat **31c** zu und erwärmt den Ansatz unter Rühren über Nacht auf Raumtemperatur. Anschließend hydrolysiert man den Reaktionsansatz mit 20 ml Wasser und extrahiert dreimal mit je 75 ml Chloroform. Die vereinigten organischen Phasen werden über Natriumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Das Rohprodukt wird aus Ethanol umkristallisiert.

Ausbeute: 1.36 g (5.30 mmol) 58 % d. Th.

Schmelzpunkt: 136.8 °C

¹H-NMR (500 MHz, Chloroform-d): δ [ppm] = 3.51 (t, *J* = 8.6 Hz, 2H, -NH-CH₂-CH₂-Cl), 4.55 (t, *J* = 8.6 Hz, 2H, -NH-CH₂-CH₂-Cl), 7.47 (ddd, *J* = 8.2 Hz, *J* = 7.3 Hz, *J* = 1.1 Hz, 1H, 6-H), 7.53 (ddd, *J* = 8.3 Hz, *J* = 7.2 Hz, *J* = 1.2 Hz, 1H, 5-H), 7.92 (d, *J* = 7.8 Hz, 1H, 7-H), 8.15 (d, *J* = 8.2 Hz, 1H, 4-H).

¹³C-NMR (125 MHz, Chloroform-d): δ [ppm] = 33.5 (-NH-CH₂-CH₂-Cl), 65.2 (-NH-CH₂-CH₂-Cl), 121.9 (C-7), 124.5 (C-4), 126.6 (C-6), 126.8 (C-5), 135.7 (C-7'), 153.2 (C-3'), 161.3 (C-2), 164.5 (C=S).

GC/MS (R_T = 10.19 min): *m/z* (%): 220 (100), 174 (25), 160 (71), 108 (14), 60 (40).

4.8.2.15 N-(Bicyclo[2.2.1]heptan-2-yl)-1,3-benzothiazol-2-carbothioamid 45b

In einem sekurierten 100 ml-Zweihalskolben mit Serumkappe und Abgang zur Stickstoff-Vakuum-Linie werden 1.23 g (9.10 mmol, 1.0 ml) Benzo[*d*]thiazol **44** in 15 ml abs. THF gelöst und mittels Flüssigstickstoff/*n*-Pentan-Bad auf -100 °C gekühlt. Bei dieser Temperatur werden langsam 5.7 ml (9.10 mmol) *n*-Butyllithium (1.6 mol/l in *n*-Hexan) zur obigen Lösung zugetropft, wobei die Innentemperatur -90 °C nicht übersteigen darf. Die Reaktionsmischung wird für 1 h bei -100 °C gerührt. Danach gibt man 1.39 g (9.10 mmol) *exo*-Norborylisothiocyanat **31h** zu und erwärmt den Ansatz unter Rühren über Nacht auf Raumtemperatur. Anschließend hydrolysiert man den Reaktionsansatz mit 20 ml Wasser und extrahiert dreimal mit je 75 ml Chloroform. Die vereinigten organischen Phasen werden über Natriumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Das Rohprodukt wird säulenchromatographisch mit Chloroform als Laufmittel gereinigt ($R_f = 0.75$).

Ausbeute: 2.12 g (7.35 mmol) 81 % d. Th.

Schmelzpunkt: 105.7 °C

$^1\text{H-NMR}$ (500 MHz, Chloroform-*d*): δ [ppm] = 1.20 - 1.31 (m, 2H, CH₂-Gruppe des Norbornyl-Restes), 1.33 - 1.42 (m, 2H, CH₂-Gruppe des Norbornyl-Restes), 1.51 - 1.67 (m, 4H, CH₂-Gruppen des Norbornyl-Restes), 2.43 (s, 1H, -NH-CH-CH₂-CH-), 2.58 (d, $J = 4.1$ Hz, 1H, -NH-CH-CH-), 4.31 (dt, $J = 7.6$ Hz, $J = 3.1$ Hz, -NH-CH-), 7.44 (t, $J = 7.6$ Hz, 1H, 6-H), 7.51 (t, $J = 7.7$ Hz, 1H, 5-H), 7.90 (d, $J = 7.9$ Hz, 1H, 4-H), 8.02 (d, $J = 13.2$ Hz, 1H, 7-H), 9.13 (s, 1H, -NH).

$^{13}\text{C-NMR}$ (125 MHz, Chloroform-*d*): δ [ppm] = 26.4 (-NH-CH-CH-CH₂-), 28.1 (-NH-CH-CH₂-CH-CH₂), 35.9 (-NH-CH-CH₂-CH-), 36.3 (-NH-CH-CH₂-CH-), 39.8 (Norbornyl-CH₂-Brücke), 41.7 (-NH-CH-CH-), 59.0 (-NH-CH-), 121.9 (C-7), 124.5 (C-4), 126.4 (C-6), 126.8 (C-5), 139.0 (C-7'), 153.1 (C-3'), 168.9 (C-2), 183.0 (C=S).

GC/MS ($R_T = 14.05$ min): m/z (%): 266 (25) [M]⁺, 179 (18), 110 (100).

4.8.2.16 N-(Adamant-2-yl)-1,3-benzothiazol-2-carbothioamid 45c

In einem sekurierten 100 ml-Zweihalskolben mit Serumkappe und Abgang zur Stickstoff-Vakuum-Linie werden 1.23 g (9.10 mmol, 1.0 ml) Benzo[*d*]thiazol **44** in 15 ml abs. THF gelöst und mittels Flüssigstickstoff/*n*-Pentan-Bad auf -100 °C gekühlt. Bei dieser Temperatur werden langsam 5.7 ml (9.10 mmol) *n*-Butyllithium (1.6 mol/l in *n*-Hexan) zur obigen Lösung zugetropft, wobei die Innentemperatur -90 °C nicht übersteigen darf. Die Reaktionsmischung wird für 1 h bei -100 °C gerührt. Danach gibt man 1.20 g (6.21 mmol) Adamantylisothiocyanat **31e** zu und erwärmt den Ansatz unter Rühren über Nacht auf Raumtemperatur. Anschließend hydrolysiert man den Reaktionsansatz mit 20 ml Wasser und extrahiert dreimal mit je 75 ml Chloroform. Die vereinigten organischen Phasen werden über Natriumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Das gewünschte Produkt ist in der Analytik nur in Spuren nachweisbar.

GC/MS ($R_T = 21.98$ min): *m/z* (%): 328 (44) $[M]^+$, 269 (14), 178 (16), 167 (11), 161 (28), 150 (42), 135 (86), 107 (19), 102 (13), 91 (34), 79 (34).

4.8.2.17 N-(2,6-Difluorphenyl)-1,3-benzothiazol-2-carbothioamid 45d

In einem sekurierten 100 ml-Zweihalskolben mit Serumkappe und Abgang zur Stickstoff-Vakuum-Linie werden 1.23 g (9.10 mmol, 1.0 ml) Benzo[*d*]thiazol **44** in 15 ml abs. THF gelöst und mittels Flüssigstickstoff/*n*-Pentan-Bad auf -100 °C gekühlt. Bei dieser Temperatur werden langsam 5.7 ml (9.10 mmol) *n*-Butyllithium (1.6 M in *n*-Hexan) zur obigen Lösung zugetropft, wobei die Innentemperatur -90 °C nicht übersteigen darf. Die Reaktionsmischung wird für 1 h bei -100 °C gerührt. Danach gibt man 1.00 g (5.84 mmol) 2,6-Difluorphenylisothiocyanat **31g** zu und erwärmt den Ansatz unter Rühren über Nacht auf Raumtemperatur. Anschließend hydrolysiert man den Reaktionsansatz mit 20 ml Wasser und extrahiert dreimal mit je 75 ml Chloroform. Die vereinigten organischen Phasen werden über Natriumsulfat

getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Das gewünschte Produkt kann nicht rein erhalten werden.

GC/MS ($R_T = 12.36$ min): m/z (%): 306 (100) $[M]^+$, 287 (92), 273 (29), 178 (18), 167 (28), 161 (10), 134 (24), 108 (29), 102 (23).

4.8.2.18 ***N*-(2,3,5,6-Tetrafluorphenyl)-1,3-benzothiazol-2-carbothioamid 45e**

In einem sekurierten 100 ml-Zweihalskolben mit Serumkappe und Abgang zur Stickstoff-Vakuum-Linie werden 1.23 g (9.10 mmol, 1.0 ml) Benzo[*d*]thiazol **44** in 15 ml abs. THF gelöst und mittels Flüssigstickstoff/*n*-Pentan-Bad auf -100 °C gekühlt. Bei dieser Temperatur werden langsam 5.7 ml (9.10 mmol) *n*-Butyllithium (1.6 M in *n*-Hexan) zur obigen Lösung zugetropft, wobei die Innentemperatur -90 °C nicht übersteigen darf. Die Reaktionsmischung wird für 1 h bei -100 °C gerührt. Danach gibt man 1.10 g (5.31 mmol) 2,3,5,6-Tetrafluorphenylisothiocyanat **31i** zu und erwärmt den Ansatz unter Rühren über Nacht auf Raumtemperatur. Anschließend hydrolysiert man den Reaktionsansatz mit 20 ml Wasser und extrahiert dreimal mit je 75 ml Chloroform. Die vereinigten organischen Phasen werden über Natriumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Das gewünschte Produkt kann in der Analytik nicht nachgewiesen werden.

4.8.2.19 ***N*-(3-Nitrophenyl)-1,3-benzothiazol-2-carbothioamid 45f**

In einem sekurierten 100 ml-Zweihalskolben mit Serumkappe und Abgang zur Stickstoff-Vakuum-Linie werden 1.23 g (9.10 mmol, 1.0 ml) Benzo[*d*]thiazol **44** in 15 ml abs. THF gelöst und mittels Flüssigstickstoff/*n*-Pentan-Bad auf -100 °C gekühlt. Bei dieser Temperatur werden langsam 5.7 ml (9.10 mmol) *n*-Butyllithium (1.6 mol/l in *n*-Hexan) zur obigen Lösung zugetropft, wobei die Innentemperatur -90 °C nicht übersteigen darf. Die Reaktionsmischung wird für 1 h bei -100 °C gerührt. Danach gibt man 1.64 g (9.10 mmol) 3-Nitrophenylisothiocyanat

31j zu und erwärmt den Ansatz unter Rühren über Nacht auf Raumtemperatur. Anschließend hydrolysiert man den Reaktionsansatz mit 20 ml Wasser und extrahiert dreimal mit je 75 ml Chloroform. Die vereinigten organischen Phasen werden zunächst filtriert (orangefarbener Niederschlag; enthält Produkt), über Natriumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Das Rohprodukt aus den vereinigten Extrakten wird säulenchromatographisch mit Chloroform als Laufmittel gereinigt ($R_f = 0.70$).

Ausbeute (chromatographiert): 300 mg (0.95 mmol) 10 % d. Th.

Ausbeute (Niederschlag): 2.56 g (8.12 mmol) 89 % d. Th.

Schmelzpunkt: 205.5 °C

$^1\text{H-NMR}$ (500 MHz, Chloroform-d): δ [ppm] = 7.52 (ddd, $J = 8.1$ Hz, $J = 7.3$ Hz, $J = 1.1$ Hz, 1H, 6-H), 7.58 (ddd, $J = 8.3$ Hz, $J = 7.2$ Hz, $J = 1.2$ Hz, 1H, 5-H), 7.65 (t, $J = 8.2$ Hz, 1H, Phenyl 5-H), 7.96 (d, $J = 8.1$ Hz, 1H, 7-H), 8.11 (d, $J = 8.1$ Hz, 1H, 4-H), 8.17 (ddd, $J = 8.3$ Hz, $J = 2.2$ Hz, $J = 0.8$ Hz, 1H, Phenyl 6-H), 8.45 (dd, $J = 8.0$ Hz, $J = 1.6$ Hz, 1H, Phenyl 4-H), 9.02 (t, $J = 2.2$ Hz, 1H, Phenyl 2-H), 11.16 (s, 1H, -NH).

$^{13}\text{C-NMR}$ (125 MHz, Chloroform-d): δ [ppm] = 117.1 (Phenyl C-2), 121.3 (Phenyl C-6), 122.1 (Phenyl C-4), 124.9 (C-7), 127.0 (C-4), 127.3 (C-6), 127.7 (C-5), 130.0 (Phenyl C-5), 139.1 (C-7'), 139.7 (C-9), 148.5 (Phenyl C-3), 152.7 (C-3'), 169.2 (C-8), 182.7 (C-2).

MS (EI, 70 eV): m/z (%): 315 (84) $[\text{M}]^+$, 314 (100), 298 (19), 282 (39), 268 (27), 236 (26), 178 (18), 167 (42), 161 (12), 135 (33), 108 (17), 102 (16), 76 (14).

MS (HR-ESI): $\text{C}_{14}\text{H}_9\text{N}_3\text{O}_2\text{S}_2$ (315.37 g/mol):

Berechnete Werte ($[\text{M}+\text{H}]^+$): 316.02089

Experimentell bestimmte ($[\text{M}+\text{H}]^+$): 316.02019

4.8.2.20 1-(1,3-Benzothiazol-2-yloxy)-N-ethylmethanthioamid 47

In einem sekurierten 50 ml-Zweihalskolben mit Abgang zur Stickstoff-Vakuum-Linie werden 0.76 g (5.00 mmol) 2-Hydroxybenzothiazol **46** in 15 ml abs. THF gelöst und mit 0.22 g (5.50 mmol) Natriumhydrid versetzt. Man lässt 1 h bei Raumtemperatur rühren und gibt 0.44 g (5.00 mmol) Ethylisothiocyanat **31a** hinzu und rührt noch weiter über Nacht. Danach hydrolysiert man die Reaktionsmischung mit 10 ml Wasser und 5 ml ges. Natriumchlorid-Lösung, extrahiert viermal mit je 75 ml Chloroform, trocknet die vereinigten organischen Phasen über Natriumsulfat und entfernt das Lösemittel am Rotationsverdampfer. Das gewünschte Produkt konnte in der Analytik nicht nachgewiesen werden.

4.8.2.21 N-Ethyl[2-(1,3-benzothiazol-2-ylsulfanyl)ethoxy]carbothioamid 49

In einem 100 ml-Zweihalskolben mit Abgang zur Stickstoff-Vakuum-Linie werden 0.21 g (5.20 mmol) Natriumhydrid (60 %ige Suspension in Mineralöl) vorgelegt, sekuriert, in 15 ml abs. THF suspendiert und auf 0 °C gekühlt. Es werden 1.00 g (4.73 mmol) 2-(1,3-Benzothiazol-2-ylsulfanyl)ethan-1-ol **48** im Stickstoffgegenstrom zugegeben und 1 h bei derselben Temperatur gerührt. Anschließend werden 0.41 g (4.73 mmol) Ethylisothiocyanat **31a** zugetropft und der Ansatz über Nacht auf Raumtemperatur erwärmt. Die Reaktionsmischung wird mit 5 ml ges. Natriumhydrogencarbonat-Lösung hydrolysiert, dreimal mit je 50 ml Ethylacetat extrahiert und die vereinten organischen Phasen über Natriumsulfat getrocknet. Diese werden am Rotationsverdampfer vom Lösemittel befreit. Das gewünschte Produkt ist in der Analytik nicht nachweisbar. Stattdessen wird 1,3-Benzothiazol-2-ol **46** gebildet.

In einem sekurierten 100 ml-Zweihalskolben mit Serumkappe und Abgang zur Stickstoff-Vakuum-Linie werden 1.06 g (5.0 mmol) 2-(1,3-Benzothiazol-2-

ylsulfanyl)ethan-1-ol **48** in 15 ml abs. THF gelöst und vorsichtig im Stickstoff-Gegenstrom mit 0.20 g (5.50 mmol) Natriumhydrid (60%ige Suspension in Mineralöl) versetzt. Die Reaktionsmischung wird für 2 h bei Raumtemperatur gerührt. Danach werden 0.44 g (5.00 mmol) Ethylisothiocyanat **31a** zugetropft und der Ansatz einen weiteren Tag bei Raumtemperatur gerührt. Anschließend gibt man 15 ml Wasser und 10 ml ges. Natriumchlorid-Lösung hinzu, extrahiert die wässrige Phase dreimal mit je 50 ml Chloroform und einmal mit 50 ml Diethylether. Die vereinigten organischen Phasen werden über Natriumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Das gewünschte Produkt ist in der Analytik nicht nachweisbar. Stattdessen wird 1,3-Benzothiazol-2-ol **46** gebildet.

4.8.3 Synthese der Amide mit Benzothiazol-Struktur

4.8.3.1 2-(1,3-Benzothiazol-2-yl)-*N*-tert.-butylacetamid **51**

In einem sekurierten 100 ml-Zweihalskolben mit Serumkappe und Abgang zur Stickstoff-Vakuum-Linie werden 1.49 g (10.0 mmol) 2-Methylbenzothiazol **38d** vorgelegt und in 40 ml abs. Diethylether gelöst. Man kühlt die Lösung auf $-78\text{ }^{\circ}\text{C}$ ab, tropft 6.6 ml (10.5 mmol, 1.05 eq.) *n*-Butyllithium (1.6 mol/l in *n*-Hexan) zu und rührt den Ansatz für 1 h bei $-78\text{ }^{\circ}\text{C}$. Danach gibt man 0.99 g (10.0 mmol) *tert.*-Butylisocyanat **50** zu, erwärmt die Reaktionsmischung über Nacht unter Rühren auf Raumtemperatur und hydrolysiert diese mit 15 ml Wasser und 10 ml ges. Ammoniumchlorid-Lösung. Die wässrige Phase wird dreimal mit je 50 ml Chloroform extrahiert. Die vereinten organischen Phasen werden über Natriumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Das Rohprodukt wird säulenchromatographisch mit Chloroform als Laufmittel aufgearbeitet ($R_f = 0.04$).

Ausbeute: 890 mg (3.58 mmol) 36 % d. Th.

Schmelzpunkt: $155.2\text{ }^{\circ}\text{C}$

$^1\text{H-NMR}$ (500 MHz, Chloroform- d): δ [ppm] = 1.36 (s, 9H, $-\text{C}(\text{CH}_3)_3$), 3.99 (s, 2H, $-\text{CH}_2-$), 6.92 (s, 1H, $-\text{NH}$), 7.40 (ddd, $J = 8.2$ Hz, $J = 7.3$ Hz, $J = 1.1$ Hz, 1H, 6-H), 7.49 (ddd, $J = 8.3$ Hz, $J = 7.4$ Hz, $J = 1.2$ Hz, 1H, 5-H), 7.86 - 7.89 (m, 1H, 4-H), 7.99 (d, $J = 8.2$ Hz, 1H, 7-H).

$^{13}\text{C-NMR}$ (125 MHz, Chloroform- d): δ [ppm] = 28.6 ($-\text{C}(\text{CH}_3)_3$), 42.1 ($-\text{CH}_2-$), 51.6 ($-\text{C}(\text{CH}_3)_3$), 121.6 (C-7), 122.5 (C-4), 125.3 (C-6), 126.3 (C-5), 135.1 (C-7'), 152.5 (C-3'), 165.5 (C-2), 165.6 (C=O).

GC/MS ($R_T = 9.49$ min): m/z (%): 248 (5) $[\text{M}]^+$, 233 (1), 176 (2), 149 (100), 108 (5), 57 (16).

Elementaranalyse: $\text{C}_{13}\text{H}_{16}\text{N}_2\text{OS}$ (248.34 g/mol)

Berechnete Werte: %C 62.87, %H 6.49, %N 11.28

Experimentell bestimmte Werte: %C 62.72, %H 6.74, %N 11.08

4.8.3.2 2-(1,3-Benzothiazol-2-yl)-*N*-tert.-butylpropanamid 52

In einem sekurierten 100 ml-Zweihalskolben mit Serumkappe und Abgang zur Stickstoff-Vakuum-Linie werden 1.63 g (10.0 mmol) 2-Ethylbenzothiazol **38a** vorgelegt und in 25 ml abs. Diethylether gelöst. Man kühlt die Lösung auf -78 °C ab, tropft 6.8 ml (10.0 mmol) *tert.*-Butyllithium (15 %ig in *n*-Pentan) zu und rührt den Ansatz für 1 h bei -78 °C. Danach gibt man 0.99 g (10.0 mmol, 1.2 ml) *tert.*-Butylisocyanat **50** zu, erwärmt die Reaktionsmischung über Nacht unter Rühren auf Raumtemperatur und hydrolysiert diese mit 15 ml Wasser und 10 ml ges. Ammoniumchlorid-Lösung. Die wässrige Phase wird dreimal mit je 50 ml Chloroform extrahiert. Die vereinten organischen Phasen werden über Natriumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Das gewünschte Produkt liegt als Nebenprodukt vor und wird nicht weiter aufgearbeitet (Hauptprodukt: 2-(1,3-benzothiazol-2-yl)propan-1-imin).

In einem sekurierten 25 ml-Einhalbskolben werden 0.28 g (1.0 mmol) 2-(1,3-Benzothiazol-2-yl)-*N*-tert.-butylpropanthioamid **41d** in 10 ml Dichlormethan

gelöst, 0.11 g (0.5 mmol) Natriummetaperiodat zugegeben und 1 h bei Raumtemperatur gerührt. Danach wird die Lösung zweimal mit je 10 ml wässriger Natriumthiosulfat-Lösung (10 %) und zweimal mit je 10 ml Wasser gewaschen. Die org. Phase wird über Natriumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Im Rohprodukt liegt einzig das Edukt vor.

In einem sekurierten 100 ml-Zweihalskolben mit Serumkappe und Abgang zur Stickstoff-Vakuum-Linie werden 1.63 g (10.0 mmol) 2-Ethylbenzothiazol **38a** vorgelegt und in 25 ml abs. Diethylether gelöst. Man kühlt die Lösung auf $-78\text{ }^{\circ}\text{C}$ ab, tropft 6.3 ml (10.0 mmol) *n*-Butyllithium (1.6 mol/l in *n*-Hexan) zu und rührt den Ansatz für 1 h bei $-78\text{ }^{\circ}\text{C}$. Danach gibt man 0.99 g (10.0 mmol) *tert.*-Butylisocyanat **50** zu, erwärmt die Reaktionsmischung über Nacht unter Rühren auf Raumtemperatur und hydrolysiert diese mit 15 ml Wasser und 10 ml ges. Ammoniumchlorid-Lösung. Die wässrige Phase wird dreimal mit je 50 ml Chloroform extrahiert. Die vereinten organischen Phasen werden über Natriumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Das Rohprodukt wird aus Ethylacetat umkristallisiert. (Iminbildung wie oben beschrieben in der MS)

Ausbeute: 270 mg (1.03 mmol) 10 % d. Th.

Schmelzpunkt: $137.3\text{ }^{\circ}\text{C}$

$^1\text{H-NMR}$ (500 MHz, Chloroform-*d*): δ [ppm] = 1.32 (s, 9H, $-\text{C}(\text{CH}_3)_3$), 1.70 (d, $J = 7.2\text{ Hz}$, 3H, $-\text{CH}_3$), 4.00 (q, $J = 7.2\text{ Hz}$, 1H, $-\text{CH}-$), 6.57 (s, 1H, $-\text{NH}$), 7.39 (t, $J = 7.2\text{ Hz}$, 1H, 6-H), 7.48 (t, $J = 7.2\text{ Hz}$, 1H, 5-H), 7.88 (d, $J = 8.0\text{ Hz}$, 1H, 4-H), 7.98 (d, $J = 8.1\text{ Hz}$, 1H, 7-H).

$^{13}\text{C-NMR}$ (125 MHz, Chloroform-*d*): δ [ppm] = 18.7 ($-\text{CH}_3$), 28.5 ($-\text{C}(\text{CH}_3)_3$), 46.9 ($-\text{CH}-$), 51.4 ($-\text{C}(\text{CH}_3)_3$), 121.7 (C-7), 122.6 (C-4), 125.1 (C-6), 126.1 (C-5), 134.9 (C-7'), 152.7 (C-3'), 169.4 (C-2), 172.1 (C=O).

GC/MS: m/z (%): 190 (2), 163 (100), 135 (2), 109 (12), 57 (16).

Elementaranalyse: $\text{C}_{14}\text{H}_{18}\text{N}_2\text{OS}$ (262.37 g/mol)

Berechnete Werte: %C 64.09, %H 6.91, %N 10.68

Experimentell bestimmte Werte: %C 63.91, %H 6.87, %N 10.73

4.9 Versuche zur Synthese der Benzofuran-basierten Amide und Thioamide

4.9.1 Ethyl-2-(1-benzofuran-3-yl)acetat **72**

In einem 100 ml-Einhalskolben mit Rückflusskühler werden 1.34 g (10.0 mmol) 3-Coumaranon **65** vorgelegt und in 75 ml Toluol gelöst. Danach werden 3.48 g (10.0 mmol) Ethyl(triphenylphosphoranyliden)acetat **71** zugegeben. Der Ansatz wird 6 h bei 110 °C gerührt. Das Reaktionsgemisch wird mit 50 ml Wasser hydrolysiert, dreimal mit je 100 ml *n*-Pentan extrahiert, über Natriumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Das Rohprodukt wird säulenchromatographisch mit Chloroform als Laufmittel gereinigt ($R_f = 0.57$).

Ausbeute: 0.46 g (2.25 mmol) 23 % d. Th.

$^1\text{H-NMR}$ (500 MHz, Chloroform-*d*): δ [ppm] = 1.33 (t, $J = 7.1$ Hz, 3H, -O-CH₂-CH₃), 4.23 (q, $J = 7.1$ Hz, 2H, -O-CH₂-CH₃), 5.52 (d, $J = 3.1$ Hz, 2H, C-3-CH₂-CO₂Et), 6.18 (t, $J = 3.1$ Hz, 1H, 2-H), 6.95 - 7.00 (m, 2H, 5-H, 6-H), 7.37 (dt, $J = 7.7$ Hz, $J = 1.1$ Hz, 1H, 7-H), 7.52 (dd, $J = 8.0$ Hz, $J = 0.9$ Hz, 1H, 4-H).

GC/MS ($R_T = 7.98$ min): m/z (%): 204 (75) [M]⁺, 175 (29), 159 (22), 147 (23), 131 (100), 103 (26), 91 (12), 77 (20).

4.9.2 2-Allyl-1-benzofuran **55**

In einem sekurierten 100 ml-Zweihalskolben mit Serumkappe und Abgang zur Stickstoff-Vakuum-Linie werden 1.18 g (10.0 mmol) Benzofuran **53** vorgelegt und in 10 ml abs. THF gelöst. Man kühlt die Lösung auf -78 °C ab, tropft 6.3 ml (10.0 mmol) *n*-Butyllithium (1.6 mol/l in *n*-Hexan) zu und rührt den Ansatz für 1 h bei -78 °C. Danach gibt man 1.68 g (10.0 mmol) Allyliodid **54** zu, erwärmt die Reaktionsmischung über Nacht unter Rühren auf Raumtemperatur und hydrolysiert

diese mit 10 ml Wasser und 5 ml ges. Ammoniumchlorid-Lösung. Die wässrige Phase wird dreimal mit je 30 ml Chloroform extrahiert. Die vereinten organischen Phasen werden über Natriumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt.

Ausbeute: 1.29 g (8.15 mmol) 82 % d. Th.

$^1\text{H-NMR}$ (500 MHz, Chloroform-d): δ [ppm] = 3.56 (dd, $J = 6.6$ Hz, $J = 1.0$ Hz, 2H, $-\text{CH}_2\text{-CH=CH}_2$), 5.23 (ddd, $J = 13.6$ Hz, $J = 11.4$ Hz, $J = 1.4$ Hz, 2H, $-\text{CH}_2\text{-CH=CH}_2$), 6.03 (ddt, $J = 16.8$ Hz, $J = 10.1$ Hz, $J = 6.6$ Hz, 1H, $-\text{CH}_2\text{-CH=CH}_2$), 6.44 (d, $J = 0.7$ Hz, 1H, 3-H), 7.17 - 7.23 (m, 2H, 5-H, 6-H), 7.44 (d, $J = 8.0$ Hz, 1H, 7-H), 7.49 - 7.52 (m, 1H, 4-H).

GC/MS ($R_T = 5.43$ min): m/z (%): 158 (100) $[\text{M}]^+$, 131 (92), 128 (29), 115 (14), 77 (18), 63 (10), 51 (10).

4.9.3 2-(1-Benzofuran-2-yl)acetaldehyd **56**

In einem Ozonolyserohr werden 1.29 g (8.15 mmol) 2-Allylbenzofuran **55** vorgelegt und in 40 ml abs. Dichlormethan gelöst. Man durchspült die Lösung mit Stickstoff, kühlt diese auf -78 °C ab, leitet zunächst Sauerstoff und danach Ozon durch den Ansatz bis dieser sich blau färbt. Anschließend lässt man weiterhin Sauerstoff durch die Lösung strömen bis diese sich wieder entfärbt hat. Danach wird wieder Stickstoff durch die Lösung geleitet. Nun werden 0.85 g (13.7 mmol) Dimethylsulfid zum Reaktionsansatz gegeben und dieser über Nacht bei Raumtemperatur gerührt. Anschließend wird sämtliches Lösemittel sowie überschüssiges Dimethylsulfid am Rotationsverdampfer entfernt. Zur Aufarbeitung wird der Rückstand in Chloroform gelöst, feste Bestandteile abfiltriert und die Lösung mit wässriger Natriumhydroxid-Lösung (2 mol/l) extrahiert. Das Extrakt wird anschließend mit Salzsäure (6 mol/l) neutralisiert und filtriert. In sämtlichen Extrakten und in den Niederschlägen ist das gewünschte Produkt in der Analytik nicht nachweisbar.

4.9.4 2-(1-Benzofuran-2-yl)essigsäure 57

In einem 25 ml-Einhalskolben werden 0.32 g (2.00 mmol) 2-Allylbenzofuran **55** in 4.5 ml Essigsäure, 9 ml Aceton und 3.5 ml Wasser gelöst und in einem Eisbad auf 0 °C gekühlt. Anschließend gibt man innerhalb von 6 h bei derselben Temperatur portionsweise 1.58 g (10.0 mmol) Kaliumpermanganat zu. Danach wird die Reaktionsmischung 1 h bei Raumtemperatur gerührt und in Wasser gegossen. Die wässrige Lösung wird mittels Wasserstoffperoxid-Lösung (30 %ig) entfärbt, dreimal mit je 25 ml Dichlormethan extrahiert, über Natriumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Das gewünschte Produkt ist in der Analytik selbst bei Verkürzung der Reaktionszeit auf insgesamt 30 min nicht nachweisbar.

In einem 100 ml-Einhalskolben werden 1.44 g (9.09 mmol) Kaliumpermanganat in 20 ml Wasser gelöst und bei 0 °C gerührt. Es werden 0.48 g (3.03 mmol) 2-Allylbenzofuran **55**, 61 mg (0.15 mmol) Benzyldimethyltetradecylammoniumchlorid-Dihydrat (Phasentransfer-Katalysator), 4 ml Aceton, 20 ml Benzol und 4 ml Essigsäure zugegeben und bei 0 °C für 2 h gerührt. Danach wird die Reaktionsmischung 5 d ohne weitere Kühlung gerührt. Man gibt etwa 3 g Natriumhydrogensulfit zu der gekühlten Mischung und gibt vorsichtig 5 ml wässrige Schwefelsäure (2.5 g konz. Schwefelsäure in 10 ml Wasser) hinzu. Die entstehenden klaren Phasen werden getrennt, die organische Phase wird einmal mit 20 ml Wasser gewaschen, über Natriumsulfat getrocknet, filtriert und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Das gewünschte Produkt ist in der Analytik nicht nachweisbar.

In einem 50 ml-Zweihalskolben werden 0.20 g (5.00 mmol) Natriumhydrid (60 %ige Suspension in Mineralöl) in 20 ml abs. THF aufgenommen und unter Rühren bei Raumtemperatur 1.66 g (5.00 mmol) Tetraethyl(dimethylamino)methylendiphosphonat zugetropft. Nach 1 h werden 0.74 g

(5.00 mmol) Benzofuran-2-carboxaldehyd **58** in 10 ml abs. THF zugegeben. Die Reaktionsmischung wird 1 h bei 50 °C gerührt und danach konzentriert. Der Rückstand wird in Diethylether und Wasser aufgenommen. Die wässrige Phase wird dreimal mit je 30 ml Diethylether extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen werden über Natriumsulfat getrocknet, filtriert und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Anschließend wird der Rückstand 30 min in konz. Salzsäure zum Rückfluss erhitzt. Das gewünschte Produkt kann nicht ausreichend rein erhalten werden.

GC/MS ($R_T = 7.45$ min): m/z (%): 176 (42) $[M]^+$, 131 (100), 103 (6), 77 (11).

4.9.5 2-[2,2-Bis(methylsulfanyl)ethenyl]-1-benzofuran **60**

In einem sekurierten 100 ml-Zweihalskolben mit Abgang zur Stickstoff-Vakuum-Linie werden 1.00 g (5.54 mmol) (Bis(methylthio)methyl)trimethylsilan **59** in 15 ml abs. THF gelöst und auf -70 °C gekühlt. Es werden 3.5 ml (5.60 mmol) *n*-Butyllithium (1.6 mol/l in *n*-Hexan) zugegeben und innerhalb von 5 h auf 0 °C erwärmt. Danach wird die Reaktionsmischung weitere 10 min ohne Kühlung gerührt. Der Reaktionsansatz wird wieder auf -78 °C gekühlt und 0.81 g (5.54 mmol) Benzofuran-2-carboxaldehyd **58** zugetropft. Man erwärmt die Lösung über Nacht auf 0 °C, rührt 6 h bei Raumtemperatur und gießt diese in 30 ml Wasser. Nach Phasentrennung und dreimaliger Extraktion mit je 40 ml Chloroform werden die organischen Phasen fünfmal mit Wasser gewaschen und über Natriumsulfat getrocknet. Das Lösemittel wird am Rotationsverdampfer entfernt. Eine weitere Aufarbeitung ist aufgrund der hohen Reinheit nicht nötig.

Ausbeute: 1.30 g (5.50 mmol) 99 % d. Th. (Lit. 90 %)

GC/MS ($R_T = 10.23$ min): m/z (%): 236 (81) $[M]^+$, 221 (18), 189 (11), 174 (100), 145 (18), 131 (11), 118 (9), 102 (18).

4.9.6 2-(1-Benzofuran-2-yl)-1-(methylsulfanyl)ethan-1-on **61**

In einem 50 ml-Einhalskolben werden 1.32 g (5.58 mmol) 2-[2,2-Bis(methylsulfanyl)ethenyl]-1-benzofuran **60** tropfenweise mit 3.99 g (35.0 mmol) Trifluoressigsäure versetzt. Nach 20 min werden 0.7 ml Wasser zugegeben und das Reaktionsgemisch 24 h bei Raumtemperatur gerührt. Man gießt die Reaktionsmischung in 70 ml Wasser und extrahiert viermal mit je 30 ml Chloroform. Die org. Phasen werden mit ges. Natriumcarbonat-Lösung gewaschen, über Natriumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Das Rohprodukt wird säulenchromatographisch mit einem 1:1-Gemisch aus Chloroform und *n*-Hexan als Laufmittel gereinigt ($R_f = 0.30$).

Ausbeute: 200 mg (0.97 mmol) 17 % d. Th.

GC/MS ($R_T = 8.16$ min): m/z (%): 206 (24) $[M]^+$, 131 (100), 103 (5), 77 (11).

4.9.7 2-(1-Benzofuran-2-yl)-*N*-*tert.*-butylacetamid **63**

In einem 100 ml-Einhalskolben mit Abgang zur Stickstoff-Vakuum-Linie werden 0.20 g (0.97 mmol) 2-(1-Benzofuran-2-yl)-1-(methylsulfanyl)ethan-1-on **61** und 0.28 g (3.83 mmol) *tert.*-Butylamin **62** in 15 ml trockenem Acetonitril gelöst und mit 1.34 g (5.22 mmol) Silbertriflat versetzt. Die Reaktionsmischung wird 4 d bei 40 °C unter Stickstoffatmosphäre gerührt. Das Lösemittel wird am Rotationsverdampfer entfernt. Das Rohprodukt wird säulenchromatographisch mit einem 1:1-Gemisch aus Ethylacetat und *n*-Hexan als Laufmittel gereinigt ($R_f = 0.65$).

Ausbeute: 150 mg (0.65 mmol) 67 % d. Th.

Schmelzpunkt: 144.4 °C

GC/MS ($R_T = 8.52$ min): m/z (%): 231 (6) $[M]^+$, 132 (100), 77 (12), 57 (87).

4.9.8 2-(1-Benzofuran-2-yl)-*N*-tert.-butylethanthioamid 64

In einem 10 ml-Einhalskolben mit Rückflusskühler werden 50 mg (0.22 mmol) 2-(Benzofuran-2-yl)-*N*-tert.-butylacetamid **63** in 1.5 ml Toluol gelöst und 54 mg (0.13 mmol) Lawessons Reagenz zugegeben. Der Reaktionsansatz wird 5 h unter Rühren auf 105 °C erhitzt. Das Lösemittel wird am Rotationsverdampfer entfernt. Das Rohprodukt wird säulenchromatographisch mit Chloroform als Laufmittel gereinigt ($R_f = 0.79$).

Ausbeute: 52 mg (0.21 mmol) 96 % d. Th.

Schmelzpunkt: 141.3 °C

$^1\text{H-NMR}$ (500 MHz, Chloroform-*d*): δ [ppm] = 1.51 (s, 9H, -C(CH₃)₃), 4.19 (s, 2H, -CH₂-), 6.65 (s, 1H, 3-H), 7.24 (dt, $J = 7.5$ Hz, $J = 0.8$ Hz, 1H, 5-H), 7.29 (dt, $J = 7.5$ Hz, $J = 1.2$ Hz, 1H, 6-H), 7.32 - 7.40 (m, 1H, -NH), 7.46 (d, $J = 8.2$ Hz, 1H, 7-H), 7.53 - 7.57 (m, 1H, 4-H).

$^{13}\text{C-NMR}$ (125 MHz, Chloroform-*d*): δ [ppm] = 27.5 (-C(CH₃)₃), 48.8 (-CH₂-), 56.0 (-C(CH₃)₃), 105.7 (C-3), 111.0 (C-7), 121.1 (C-4), 123.1 (C-5), 124.4 (C-6), 128.2 (C-3'), 152.1 (C-2), 155.1 (C-7'), 196.4 (C=S).

GC/MS ($R_T = 9.49$ min): m/z (%): 247 (39) [M]⁺, 174 (9), 132 (100), 77 (10), 57 (78).

Elementaranalyse: C₁₄H₁₇NOS (247.36 g/mol)

Berechnete Werte: %C 67.98, %H 6.93, %N 5.66

Experimentell bestimmte Werte: %C 67.79, %H 6.92, %N 5.58

4.10 Versuche zur Synthese der Coumaranon-basierten Amide und Thioamide

4.10.1 2,2-Diallyl-3-coumaranon 67

In einem 100 ml-Zweihalskolben mit Serumkappe und Abgang zur Stickstoff-Vakuum-Linie werden 1.34 g (10.0 mmol) 3-Coumaranon **65**, 104 mg (0.10 mmol) Tris(dibenzylidenaceton)dipalladium (Chloroform-Addukt; entspricht 2 mol% Pd) und 249 mg *rac*-BINAP vorgelegt und sekuriert. Die Feststoffe werden anschließend per Spritze in 50 ml abs. Tetrahydrofuran gelöst und 2.88 ml (25.0 mmol) Allylmethylcarbonat **66** zugetropft. Unter Stickstoffatmosphäre wird der Reaktionsansatz 3 d bei Raumtemperatur gerührt, über Celite filtriert und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. In der Analytik lässt sich nur das Edukt wiederfinden.

In einem 100 ml-Zweihalskolben mit Serumkappe und Abgang zur Stickstoff-Vakuum-Linie werden 1.34 g (10.0 mmol) 3-Coumaranon **65** und 1.156 g (1.00 mmol) Tetrakis(triphenylphosphin)palladium(0) vorgelegt und sekuriert. Die Feststoffe werden anschließend per Spritze in 50 ml abs. Diethylether gelöst und 2.88 ml (25 mmol) Allylmethylcarbonat **66** zugetropft. Unter Stickstoffatmosphäre wird der Reaktionsansatz 8 d bei Raumtemperatur gerührt, über Celite filtriert und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Das Rohprodukt (3.57 g) wird säulenchromatographisch mit Chloroform als Laufmittel gereinigt ($R_f = 0.50$).

Ausbeute: 0.90 g (4.20 mmol) 42 % d. Th.

$^1\text{H-NMR}$ (500 MHz, Chloroform- d): δ [ppm] = 2.58 (ddt, $J = 21.5$ Hz, $J = 14.2$ Hz, $J = 7.2$ Hz, 4H, $-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}_2$), 5.02 (d, $J = 10.2$ Hz, 2H, $-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}_2$), 5.12 (dd, $J = 17.1$ Hz, $J = 1.4$ Hz, 2H, $-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}_2$), 5.63 (ddt, $J = 17.3$ Hz, $J = 10.1$ Hz, $J = 7.2$ Hz, 2H, $-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}_2$), 7.04 (t, $J = 7.4$ Hz, 1H, 5-H), 7.09 (d, $J = 8.4$ Hz, 1H, 7-H), 7.57 - 7.63 (m, 2H, 4-H, 6-H).

^{13}C -NMR (125 MHz, Chloroform-d): δ [ppm] = 39.9 (- $\text{CH}_2\text{-CH=CH}_2$), 91.2 (C-2), 113.2 (C-7), 119.8 (- $\text{CH}_2\text{-CH=CH}_2$), 121.3 (C-3'), 121.6 (C-5), 124.2 (C-4), 130.5 (- $\text{CH}_2\text{-CH=CH}_2$), 138.1 (C-6), 171.7 (C-7'), 203.2 (C-3).

GC/MS (R_T = 6.91 min): m/z (%): 214 (24) $[\text{M}]^+$, 172 (100), 145 (45), 131 (18), 128 (75), 121 (45), 117 (38), 115 (37), 91 (35), 77 (29), 65 (41), 55 (43).

4.10.2 2,2-Diallyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-3-ol 68

In einem 100 ml-Einhalskolben werden 0.90 g (4.2 mmol) 2,2-Diallyl-3-coumaranon **67** in 25 ml abs. Ethanol gelöst und innerhalb 1 h bei 0 °C 1.91 g (50.4 mmol) Natriumborhydrid zugegeben. Die Reaktionsmischung wird mit 20 ml dest. Wasser hydrolysiert, dreimal mit je 25 ml Diethylether extrahiert, über Natriumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt.

Ausbeute: 0.81 g (3.75 mmol) 89 % d. Th.

^1H -NMR (500 MHz, Chloroform-d): δ [ppm] = 2.40 (dd, J = 14.0 Hz, J = 7.6 Hz, 1H, - $\text{CH}_2\text{-CH=CH}_2$), 2.44 (dd, J = 14.1 Hz, J = 6.9 Hz, 1H, - $\text{CH}_2\text{-CH=CH}_2$), 2.61 (dd, J = 14.4 Hz, J = 6.9 Hz, 1H, - $\text{CH}_2\text{-CH=CH}_2$), 2.68 (dd, J = 14.4 Hz, J = 7.3 Hz, 1H, - $\text{CH}_2\text{-CH=CH}_2$), 4.96 - 5.20 (m, 4H, - $\text{CH}_2\text{-CH=CH}_2$), 5.23 (d, J = 17.3 Hz, 1H, -OH), 5.72 - 5.82 (m, 1H, - $\text{CH}_2\text{-CH=CH}_2$), 5.94 - 6.04 (m, 1H, - $\text{CH}_2\text{-CH=CH}_2$), 6.82 (dd, J = 8.0 Hz, J = 3.2 Hz, 1H, 7-H), 6.89 - 6.94 (m, 1H, 5-H), 7.22 - 7.27 (m, 1H, 6-H), 7.37 (d, J = 7.4 Hz, 1H, 4-H).

GC/MS (R_T = 7.46 min): m/z (%): 216 (47) $[\text{M}]^+$, 175 (95), 157 (28), 147 (69), 133 (100), 129 (36), 121 (42), 115 (14), 105 (33), 91 (67), 77 (48), 65 (20), 51 (16).

4.10.3 **3*H*-Spiro[1-benzofuran-2,1'-cyclopentan]-3'-en-3-ol 69**

In einem 250 ml-Zweihalskolben mit Abgang zur Stickstoff-Vakuum-Linie werden 82 mg (0.10 mmol) Benzyliden-bis-(tricyclohexylphosphino)-dichlorruthenium (Grubbs I Katalysator) vorgelegt und sekuriert. Es werden 100 ml abs. Dichlormethan zugegeben. Dann werden 4.33 g (20.0 mmol) 2,2-Diallyl-2,3-dihydrobenzofuran-3-ol **68** in 25 ml abs. Dichlormethan zugetropft und der Ansatz 20 h bei Raumtemperatur gerührt. Das Lösemittel wird am Rotationsverdampfer entfernt. Das gewünschte Produkt kann in der Analytik nicht nachgewiesen werden.

Wird die Menge an Katalysator auf 1 mol% verdoppelt, so lässt sich das Produkt in der GC/MS nachweisen.

GC/MS ($R_T = 7.17$ min): m/z (%): 188 (59) $[M]^+$, 169 (100), 141 (24), 134 (26), 121 (95), 115 (13), 105 (21), 77 (18), 66 (41).

4.10.4 **1-([2,2-Bisprop-2-en-1-yl]-2,3-dihydro-1-benzofuran-3-yl]oxy)-*N*-ethylmethanthioamid 70**

In einem sekurierten 100 ml-Zweihalskolben werden 0.40 g (1.85 mmol) 2,2-Diallyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-3-ol **68** in 25 ml abs. Diethylether gelöst und 0.20 g (2.78 mmol) Natriumhydrid (60 %ige Suspension in Öl) zugegeben und 30 min gerührt. Dann werden 0.17 ml (1.85 mmol) Ethylisothiocyanat **31a** zugetropft. Die Reaktionsmischung wird mit 20 ml dest. Wasser hydrolysiert, dreimal mit je 25 ml Diethylether extrahiert, über Natriumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Das gewünschte Produkt kann in der Analytik nicht nachgewiesen werden, da keinerlei Umsatz stattfindet.

In einem sekurierten 100 ml-Zweihalskolben mit Serumkappe und Abgang zur Stickstoff-Vakuum-Linie werden 0.40 g (1.85 mmol) 2,2-Diallyl-2,3-dihydro-1-

benzofuran-3-ol **68** in 25 ml abs. Diethylether gelöst, auf -78 °C gekühlt, 1.4 ml (2.22 mmol) *n*-Butyllithium (1.6 mol/l in *n*-Hexan) zugegeben und 1 h gerührt. Dann werden 0.17 ml (1.85 mmol) Ethylisothiocyanat **31a** zugetropft und über Nacht auf Raumtemperatur erwärmt. Die Reaktionsmischung wird mit 20 ml dest. Wasser hydrolysiert, dreimal mit je 25 ml Diethylether extrahiert, über Natriumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Das Rohprodukt wird säulenchromatographisch mit Chloroform als Laufmittel gereinigt ($R_f = 0.56$).

Ausbeute: 0.16 g (0.53 mmol) 29 % d. Th.

$^1\text{H-NMR}$ (500 MHz, Chloroform-*d*): δ [ppm] = 1.31 (t, $J = 7.3$ Hz, 3H, -NH-CH₂-CH₃), 3.76 (dq, $J = 7.1$ Hz, $J = 6.1$ Hz, 2H, -NH-CH₂-CH₃), 7.21 (t, $J = 7.7$ Hz, 1H, 5-H), 7.28 (d, $J = 8.2$ Hz, 1H, 6-H), 7.41 (t, $J = 8.0$ Hz, 1H, 4-H), 7.49 (br s, 1H, -NH).

$^{13}\text{C-NMR}$ (125 MHz, Chloroform-*d*): δ [ppm] = 14.2 (-NH-CH₂-CH₃), 38.8 (-NH-CH₂-CH₃), 112.2 (C-7), 121.4 (C-4), 122.1 (C-5), 123.6 (C-6), 130.0 (C-3'), 130.9 (C-2), 151.0 (C-3), 151.4 (C-7'), 180.8 (C=S).

GC/MS ($R_T = 10.58$ min): m/z (%): 303 (4) [M]⁺, 262 (12), 199 (32), 191 (52), 163 (11), 158 (100), 129 (45).

Elementaranalyse: C₁₄H₁₈N₂S₂ (278.44 g/mol)

Berechnete Werte: %C 67.29, %H 6.98, %N 4.62

Experimentell bestimmte Werte: %C 67.28, %H 7.22, %N 4.69

4.11 Versuche zur Synthese der Benzothiophen-basierten Amide und Thioamide

4.11.1 2-[2,2-Bis(methylsulfanyl)ethenyl]-1-benzothiophen **74**

In einem sekurierten 100 ml-Einhalskolben mit Abgang zur Stickstoff-Vakuum-Linie werden 1.35 g (7.50 mmol) (Bis(methylthio)methyl)trimethylsilan **59** in 15 ml abs. THF gelöst und auf 70 °C gekühlt. Es werden 4.7 ml (7.50 mmol) *n*-Butyllithium (1.6 mol/l in *n*-Hexan) zugegeben und innerhalb von 5 h auf 0 °C erwärmt. Danach wird die Reaktionsmischung weitere 10 min ohne Kühlung gerührt. Der Reaktionsansatz wird wieder auf -78 °C gekühlt und 1.22 g (7.50 mmol) Benzothiophen-2-carboxaldehyd **73** zugetropft. Man erwärmt die Lösung über Nacht auf 0 °C, rührt 6 h bei Raumtemperatur und gießt diese in 30 ml Wasser. Nach Phasentrennung und dreimaliger Extraktion mit je 40 ml Chloroform werden die vereinten organischen Phasen fünfmal mit Wasser gewaschen und über Natriumsulfat getrocknet. Das Lösemittel wird am Rotationsverdampfer entfernt.

Ausbeute: 1.87 g (7.43 mmol) 99 % d. Th.

GC/MS ($R_T = 11.23$ min): m/z (%): 252 (62) $[M]^+$, 237 (23), 190 (100), 146 (14), 95 (9).

4.11.2 2-(1-Benzothiophen-2-yl)-1-(methylsulfanyl)ethan-1-on **75**

In einem 50 ml-Einhalskolben werden 1.87 g (7.40 mmol) 2-[2,2-Bis(methylsulfanyl)ethenyl]-1-benzothiophen **74** tropfenweise mit 5.36 g (47.0 mmol) Trifluoressigsäure versetzt. Nach 20 min werden 1 ml Wasser zugegeben und der Reaktionsansatz 24 h bei Raumtemperatur gerührt. Man gießt die Reaktionsmischung in 100 ml Wasser und extrahiert viermal mit je 50 ml Chloroform. Die vereinten organischen Phasen werden mit ges. Natriumcarbonat-

Lösung gewaschen, über Natriumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt.

Ausbeute: 1.49 g (6.70 mmol) 91 % d. Th.

GC/MS ($R_T = 9.32$ min): m/z (%): 222 (30) $[M]^+$, 194 (3), 147 (100), 115 (4), 103 (6).

4.11.3 2-(1-Benzothiophen-2-yl)-*N*-*tert*-butylacetamid 76

In einem 100 ml-Einhalskolben mit Abgang zur Stickstoff-Vakuum-Linie werden 1.00 g (4.5 mmol) 2-(1-Benzothiophen-2-yl)-1-(methylsulfanyl)ethan-1-on **75** und 1.30 g (17.7 mmol) *tert*-Butylamin **62** in 50 ml trockenem Acetonitril gelöst und mit 6.22 g (23.4 mmol) Silbertriflat versetzt. Die Reaktionsmischung wird 4 d bei 40 °C unter Stickstoffatmosphäre gerührt. Das Lösemittel wird am Rotationsverdampfer entfernt. Der Rückstand wird zunächst mit *n*-Hexan und danach mit Acetonitril extrahiert und erneut am Rotationsverdampfer vom Lösemittel befreit. Das Rohprodukt wird säulenchromatographisch mit einem 2:1-Gemisch aus Ethylacetat und *n*-Hexan gereinigt ($R_f = 0.75$).

Ausbeute: 0.51 g (2.06 mmol) 46 % d. Th.

GC/MS ($R_T = 9.60$ min): m/z (%): 247 (13) $[M]^+$, 148 (100), 57 (63).

4.11.4 2-(1-Benzothiophen-2-yl)-*N*-*tert*-butylethanthioamid 77

In einem 10 ml-Einhalskolben werden 100 mg (0.40 mmol) 2-(Benzothiophen-2-yl)-*N*-*tert*-butylacetamid **76** in 3 ml Toluol gelöst und 98 mg (0.24 mmol) Lawessons Reagenz zugegeben. Der Reaktionsansatz wird 5 h unter Rühren zum Rückfluss erhitzt. Das Lösemittel wird am Rotationsverdampfer entfernt.

Ausbeute: 96 mg (0.36 mmol) 91 % d. Th.

Schmelzpunkt: 141.4 °C

GC/MS ($R_T = 10.55$ min): m/z (%): 263 (54) $[M]^+$, 190 (10), 148 (100), 57 (93).

$^1\text{H-NMR}$ (500 MHz, Chloroform- d): δ [ppm] = 1.49 (s, 9H, $-\text{C}(\text{CH}_3)_3$), 4.31 (s, 2H, $-\text{CH}_2-$), 7.18 (s, 1H, 3-H), 7.31 - 7.39 (m, 2H, 5-H, 6-H), 7.75 (d, $J = 7.4$ Hz, 1H, 4-H), 7.81 (d, $J = 7.6$ Hz, 1H, 7-H).

4.11.5 2-(1-Benzothiophen-2-yl)-*N-tert.*-butylbutanamid 79

In einem sekurierten 50 ml-Zweihalskolben mit Serumkappe und Abgang zur Stickstoff-Vakuum-Linie werden 100 mg (0.40 mmol) 2-(Benzothiophen-2-yl)-*N-tert.*-butylacetamid **76** in 10 ml abs. THF gelöst und mittels Flüssigstickstoff/Aceton-Bad auf -80 °C gekühlt. Bei dieser Temperatur werden langsam 0.50 ml (0.80 mmol) *n*-Butyllithium (1.6 M in *n*-Hexan) zur obigen Lösung zugetropft, wobei die Innentemperatur -75 °C nicht übersteigen darf. Die Reaktionsmischung wird für 1 h bei -78 °C gerührt. Danach gibt man 44 mg (0.40 mmol) Ethylbromid **78** zu und erwärmt den Ansatz unter Rühren über Nacht auf Raumtemperatur. Anschließend hydrolysiert man den Reaktionsansatz mit 20 ml Wasser und extrahiert dreimal mit je 75 ml Chloroform. Die vereinigten organischen Phasen werden über Natriumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Das gewünschte Produkt kann säulenchromatographisch mit Chloroform als Laufmittel nicht isoliert werden, da sich das Produktgemisch auch in allen Fraktionen nahezu unverändert wiederfindet ($R_f = 0.85$).

Rohprodukt: 120 mg

GC/MS ($R_T = 11.95$ min): m/z (%): 272 (100) $[M]^+$, 243 (78), 227 (30), 197 (10).

4.12 Versuche zur Synthese der Benzoxepin-Derivate

4.12.1 1-Phenyl-2-(2-allylphenoxy)ethan-1-on **83**

In einem sekurierten 500 ml-Zweihalskolben mit Serumkappe und Abgang zur Stickstoff-Vakuum-Linie werden 6.71 g (50.0 mmol) 2-Allylphenol **81** in 300 ml über Molekularsieb 3 Å getrocknetem Aceton gelöst und 9.67 g (70.0 mmol) Kaliumcarbonat und 9.95 g (50.0 mmol) 2-Bromacetophenon **82** zugegeben. Die Reaktionsmischung wird für 4 h unter Rühren zum Rückfluss erhitzt. Anschließend lässt man den Reaktionsansatz auf Raumtemperatur abkühlen und filtriert vom Feststoff ab. Das Filtrat wird am Rotationsverdampfer vom Lösemittel befreit. Das gewünschte Produkt findet sich nur in Spuren im Rohprodukt.

In einem sekurierten 500 ml-Zweihalskolben mit Serumkappe und Abgang zur Stickstoff-Vakuum-Linie werden 6.71 g (50.0 mmol) 2-Allylphenol **81** in 200 ml abs. THF gelöst, 2.20 g (55.0 mmol) Natriumhydrid (60 % in Mineralöl) zugegeben und 1 h bei Raumtemperatur gerührt. Danach werden 9.95 g (50.0 mmol) 2-Bromacetophenon **82** zugegeben und die Reaktionsmischung für 4 h unter Rühren zum Rückfluss erhitzt. Anschließend lässt man den Reaktionsansatz auf Raumtemperatur abkühlen, hydrolysiert mit 20 ml Wasser und 10 ml ges. Natriumchlorid-Lösung und extrahiert die wässrige Phase dreimal mit je 150 ml Diethylether. Die organische Phase wird über Natriumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt.

Rohprodukt: 13.2 g (43 %ig lt. GC/MS) ($\approx$ 22.2 mmol) 44 % d. Th.

GC/MS ($R_T = 9.76$ min): m/z (%): 252 (12) $[M]^+$, 133 (98), 115 (9), 105 (100), 91 (17), 77 (37).

4.12.2 1-Allyl-2-(2-bromallyloxy)benzol 85

In einem 250 ml-Zweihalskolben mit Abgang zur Stickstoff-Vakuum-Linie werden 1.30 g (34 mmol) Natriumhydrid (60 %ige Suspension in Mineralöl) vorgelegt, sekuriert und in 100 ml abs. THF gelöst. Anschließend tropft man langsam eine Lösung aus 1.44 g (10.7 mmol) 2-Allylphenol **81** in 6 ml abs. THF zu und lässt 5 min rühren. Danach gibt man eine Spatelspitze Natriumiodid hinzu, löst 2.97 g (14.8 mmol) 2,3-Dibrompropen **84** in 6 ml abs. THF und tropft diese zur Reaktionsmischung. Der Reaktionsansatz wird 24 h bei Raumtemperatur gerührt und mit 25 ml Wasser hydrolysiert. Die wässrige Phase wird dreimal mit je 100 ml Diethylether extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen werden über Natriumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Das Rohprodukt wird säulenchromatographisch (kurze Säule) mit *n*-Hexan als Laufmittel isoliert ($R_f = 0.29$).

Ausbeute: 2.44 g (9.64 mmol) 90 % d. Th.

$^1\text{H-NMR}$ (300 MHz, Chloroform-*d*): δ [ppm] = 3.45 (d, $J = 6.6$ Hz, 2H, $-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}_2$), 4.65 (t, $J = 1.5$ Hz, Ph-O- $\text{CH}_2-\text{CBr}=\text{CH}_2$), 5.02 - 5.06 (m, 1H, $-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}_2$), 5.09 (dq, $J = 10.1$ Hz, $J = 1.6$ Hz, 1H, $-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}_2$), 5.68 (dt, $J = 2.0$ Hz, $J = 1.3$ Hz, 1H, Ph-O- $\text{CH}_2-\text{CBr}=\text{CH}_2$), 5.95 - 6.10 (m, 2H, Ph-O- $\text{CH}_2-\text{CBr}=\text{CH}_2$, $-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}_2$), 6.79 - 6.84 (m, 1H, 6-H), 6.95 (dt, $J = 7.6$ Hz, $J = 1.0$ Hz, 1H, 4-H), 7.15 - 7.22 (m, 2H, 3-H, 5-H).

$^{13}\text{C-NMR}$ (75 MHz, Chloroform-*d*): δ [ppm] = 34.4 ($-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}_2$), 71.6 (Ph-O- $\text{CH}_2-\text{CBr}=\text{CH}_2$), 111.8 (C-1), 115.5 ($-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}_2$), 117.5 (Ph-O- $\text{CH}_2-\text{CBr}=\text{CH}_2$), 121.4 (C-4), 127.2 (Ph-O- $\text{CH}_2-\text{CBr}=\text{CH}_2$), 127.3 (C-5), 129.0 (C-2), 130.1 (C-3), 136.8 ($-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}_2$), 155.3 (C-1).

GC/MS ($R_T = 7.05$ min): m/z (%): 254 (10) $[\text{M}]^+$, 252 (11) $[\text{M}]^+$, 173 (49), 145 (12), 133 (39), 131 (100), 119 (11), 115 (16), 105 (53), 91 (13), 79 (23), 77 (26).

4.12.3 1-(2-Phenylallyloxy)-2-allylbenzol **87**

In einem sekurierten 250 ml-Zweihalskolben mit Serumkappe, Rückflusskühler und Abgang zur Stickstoff-Vakuum-Linie werden 2.40 g (9.48 mmol) 1-Allyl-2-(2-bromallyloxy)benzol **85** in 150 ml abs. Ethanol gelöst. Danach werden 1.68 g (14.2 mmol) Phenylboronsäure **86**, 4.63 g (14.2 mmol) Cäsiumcarbonat, 70 mg (0.312 mmol) Palladium(II)acetat und 100 mg (0.329 mmol) Tri-*o*-tolylphosphin zugegeben. Der Reaktionsansatz wird für 2 d bei 75 °C gerührt. Anschließend wird das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt, der Rückstand mit einem 1:1-Gemisch aus Diethylether und Wasser aufgenommen und dreimal mit je 100 ml Diethylether extrahiert. Die vereinten organischen Phasen werden über Natriumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Das Rohprodukt wird säulenchromatographisch mit Chloroform als Laufmittel gereinigt ($R_f = 0.83$), es entstehen allerdings nur Mischfraktionen.

Ausbeute: 1.82 g (37 %ig lt. GC/MS) (≈ 2.69 mmol) 28 % d. Th.

GC/MS ($R_T = 10.86$ min): m/z (%): 304 (53) $[M]^+$, 289 (100), 197 (15), 179 (10), 165 (18).

4.13 Versuche zur Synthese der Benzothiazepin-Derivate

4.13.1 2,3,4,5-Tetrahydro-1,5-benzothiazepin-4-on **89**

In einem Einhalskolben werden 5.82 g (46.5 mmol) 2-Aminothiophenol **36** und 3.35 g (46.5 mmol) Acrylsäure **88** vorgelegt, in 20 ml Toluol gelöst und 2 h zum Rückfluss erhitzt. Das Reaktionsgemisch wird auf Raumtemperatur abgekühlt, der entstehende Niederschlag abfiltriert und mit 50 ml Diethylether gewaschen. Bei Bedarf kann das Rohprodukt aus Ethylacetat umkristallisiert oder säulenchromatographisch gereinigt werden, wenn Chloroform als Laufmittel verwendet und das Produkt mit Methanol zurückgewonnen wird.

Ausbeute: 2.08 g (11.6 mmol) 25 % d. Th.

(Lit. 40 %)

$^1\text{H-NMR}$ (300 MHz, Chloroform- d): δ [ppm] = 2.64 (t, J = 6.9 Hz, 2H, 3-H), 3.45 (t, J = 7.0 Hz, 2H, 2-H), 7.08 (dd, J = 7.9 Hz, J = 1.2 Hz, 1H, 6-H), 7.18 (dt, J = 7.6 Hz, J = 1.3 Hz, 1H, 7-H), 7.36 (dt, J = 7.7 Hz, J = 1.5 Hz, 1H, 8-H), 7.55 (br s, 1H, -NH), 7.61 (dd, J = 7.7 Hz, J = 1.4 Hz, 1H, 9-H).

$^{13}\text{C-NMR}$ (75 MHz, Chloroform- d): δ [ppm] = 33.4 (C-2), 34.1 (C-3), 123.2 (C-6), 126.6 (C-8), 127.1 (C-9'), 129.8 (C-7), 135.6 (C-9), 141.3 (C-5'), 173.1 (C=O).

GC/MS (R_T = 8.83 min): m/z (%): 179 (72) $[\text{M}]^+$, 151 (12), 146 (23), 136 (24), 125 (25), 96 (20), 80 (12), 69 (10), 55 (100).

Elementaranalyse: $\text{C}_9\text{H}_9\text{NOS}$ (179.24 g/mol)

Berechnete Werte: %C 60.31, %H 5.06, %N 7.81

Experimentell bestimmte Werte: %C 59.16, %H 5.04, %N 7.27

4.13.2 Versuch der Methylierung des Benzothiazepins **89**

In einem sekurierten 100 ml-Zweihalskolben mit Abgang zur Stickstoff-Vakuum-Linie werden 0.27 g (1.50 mmol) 2,3,4,5-Tetrahydro-1,5-benzothiazepin-4-on **89** in 20 ml abs. Diethylether gelöst und auf $-78\text{ }^\circ\text{C}$ gekühlt. Anschließend gibt man 1.9 ml (3.00 mmol) *n*-Butyllithium (1.6 mol/l in *n*-Hexan) zu und lässt 1 h bei $0\text{ }^\circ\text{C}$ rühren. Danach tropft man 0.21 g (1.50 mmol) Methyljodid **90** zu. Die Reaktionsmischung wird über Nacht unter Rühren auf Raumtemperatur erwärmt. Man hydrolysiert diese mit 20 ml Wasser und extrahiert die wässrige Phase dreimal mit je 50 ml Chloroform. Die vereinten organischen Phasen werden über Natriumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Der Analytik ist zu entnehmen, dass kein Umsatz stattfindet.

4.13.3 Versuch der Thioamidierung des Benzothiazepins

In einem 100 ml-Zweihalskolben mit Abgang zur Stickstoff-Vakuum-Linie werden 0.52 g (2.90 mmol) 2,3,4,5-Tetrahydro-1,5-benzothiazepin-4-on **89** vorgelegt und sekuriert. Es werden 50 ml abs. Diethylether zugegeben und die erhaltene Lösung auf -78 °C gekühlt. Anschließend werden 3.63 ml (5.80 mmol) *n*-Butyllithium (1.6 mol/l in *n*-Hexan) zugetropft, 1 h bei -78 °C gerührt, 0.25 g (2.90 mmol) Ethylisothiocyanat **31a** zugegeben und über Nacht auf Raumtemperatur erwärmt. Das Reaktionsgemisch wird mit 15 ml dest. Wasser und 10 ml ges. Ammoniumchlorid-Lösung hydrolysiert und mit 150 ml Diethylether extrahiert. Das gewünschte Produkt kann in der Analytik nicht nachgewiesen werden. Eine geringere Menge an *n*-Butyllithium (1.1 Äquivalente) oder der Austausch des Lithierungsmittels durch LDA (2.0 Äquivalente) führen ebenfalls nicht zum Produkt.

4.14 Versuche zur Synthese der Benzodithiepin-basierten Thioamide

4.14.1 Synthese der Benzodithiepine

4.14.1.1 1,2-Bis(hydroxymethyl)-4,5-dichlorbenzol **100**

In einem 250 ml-Zweihalskolben mit Rückflusskühler, Trockenrohr (Calciumchlorid) und Tropftrichter werden 1.75 g (46.0 mmol) Lithiumaluminiumhydrid in 15 ml abs. THF aufgenommen und unter Rühren bei ständigem Rückfluss eine Lösung aus 5.00 g (23.0 mmol) 4,5-Dichlorphthalsäureanhydrid **99** in 50 ml abs. THF zugetropft. Nach vollständiger Zugabe wird die Reaktionslösung 3 h zum Rückfluss erhitzt. Nach dem Abkühlen wird vorsichtig tropfenweise eine gesättigte wässrige Natriumsulfat-Lösung zugegeben. Die so erhaltene Mischung wird filtriert, abgesaugt und der

Filterkuchen mit heißem THF gewaschen. Anschließend wird das Filtrat am Rotationsverdampfer vom Lösemittel befreit.

Ausbeute: 4.51 g (56 %ig lt. GC/MS) ($\equiv$ 7.59 mmol) 33 % d. Th. (Lit. 89 %)

GC/MS ($R_T = 8.84$ min): m/z (%): 206 (4) $[M]^+$, 187 (100), 161 (24), 159 (35), 125 (41), 123 (22), 111 (20), 89 (16), 77 (10).

4.14.1.2 1,2-Bis(brommethyl)benzol 98a

In einem 1 l-Einhalskolben mit Rückflusskühler werden 31.9 g (300 mmol) *ortho*-Xylol **96a** in 400 ml Tetrachlormethan gelöst und mit 107 g (600 mmol) *N*-Bromsuccinimid **97** sowie 6.00 g (36.5 mmol) AIBN versetzt. Die Reaktionsmischung wird vorsichtig unter Rückfluss erwärmt, bis die Reaktion startet. Sobald sich das *N*-Bromsuccinimid **97** vollständig gelöst hat und das freigewordene Succinimid an der Oberfläche der Lösung schwimmt, erhitzt man nochmals für 10 min zum Sieden. Nach dem Abkühlen wird der Feststoff abgesaugt, das Succinimid mit etwas Tetrachlormethan gewaschen und aus den vereinigten Filtraten das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Das Rohprodukt wird aus Ethanol umkristallisiert.

Ausbeute: 47.95 g (182 mmol) 61 % d. Th.

GC/MS ($R_T = 6.77$ min): m/z (%): 266 (8) $[M]^+$, 264 (15) $[M]^+$, 262 (8) $[M]^+$, 185 (96), 183 (100), 104 (76), 78 (14).

4.14.1.3 1,2-Bis(brommethyl)-3-methoxybenzol 98b

In einem 250 ml-Einhalskolben mit Rückflusskühler werden 10.2 g (74.9 mmol) 2,3-Dimethylanisol **96b** in 100 ml Tetrachlormethan gelöst und mit 26.7 g (150 mmol) *N*-Bromsuccinimid **97** sowie 1.50 g (9.13 mmol) AIBN versetzt. Die Reaktionsmischung wird vorsichtig unter Rückfluss erwärmt, bis die Reaktion startet.

Sobald sich das *N*-Bromsuccinimid **97** vollständig gelöst hat und das freigewordene Succinimid an der Oberfläche der Lösung schwimmt, erhitzt man nochmals für 10 min zum Sieden. Nach dem Abkühlen wird der Feststoff abgesaugt, das Succinimid mit etwas Tetrachlormethan gewaschen und aus den vereinigten Filtraten das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Das Rohprodukt wird aus einem 1:1-Gemisch aus Diethylether und *n*-Hexan umkristallisiert.

Ausbeute: 16.46 g (56.0 mmol) 75 % d. Th.

GC/MS ($R_T = 8.08$ min): *m/z* (%): 296 (5) $[M]^+$, 294 (9) $[M]^+$, 292 (5) $[M]^+$, 215 (98), 213 (100), 187 (13), 185 (12), 134 (53), 104 (36), 91 (19), 78 (11), 65 (13).

4.14.1.4 1,2-Bis(brommethyl)-4-chlorbenzol **98c**

In einem 250 ml-Einhalskolben mit Rückflusskühler werden 7.03 g (50.0 mmol) 4-Chlor-*ortho*-xylol **96c** in 70 ml Tetrachlormethan gelöst und mit 17.8 g (100 mmol) *N*-Bromsuccinimid **97** sowie 1.00 g (6.08 mmol) AIBN versetzt. Die Reaktionsmischung wird vorsichtig unter Rückfluss erwärmt, bis die Reaktion startet. Sobald sich das *N*-Bromsuccinimid **97** vollständig gelöst hat und das freigewordene Succinimid an der Oberfläche der Lösung schwimmt, erhitzt man nochmals für 10 min zum Sieden. Nach dem Abkühlen wird der Feststoff abgesaugt, das Succinimid mit etwas Tetrachlormethan gewaschen und aus den vereinigten Filtraten das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Das Rohprodukt wird säulenchromatographisch mit Chloroform als Laufmittel gereinigt ($R_f = 0.82$). Man erhält ein Gemisch aus Mono-, Di-, und Tribromid.

Ausbeute: 3.05 g (50 %ig lt. GC/MS)

GC/MS ($R_T = 7.92$ min): *m/z* (%): 300 (7) $[M]^+$, 298 (10) $[M]^+$, 296 (5) $[M]^+$, 221 (26), 219 (100), 217 (88), 140 (21), 138 (66), 103 (23), 77 (19), 51 (17).

4.14.1.5 1,2-Bis(brommethyl)-4,5-dichlorbenzol 98e

In einem 50 ml-Einhalskolben mit Rückflusskühler werden 4.51 g (7.59 mmol) (4,5-Dichlor-1,2-phenylen)dimethanol **100** zusammen mit 30 ml Bromwasserstoffsäure (48%ig) unter Rühren für 4 h zum Rückfluss erhitzt. Nach dem Abkühlen, wobei sich die untere organische Phase verfestigt, wird die überstehende wässrige Phase abdekantiert und der organische Rückstand in Benzol gelöst. Die so erhaltene Lösung wird über eine mit Kieselgel zur Hälfte gefüllten großen Glasfritte filtriert und mit Benzol eventuell vorhandene Produktrückstände aus der Glasfritte gewaschen. Anschließend wird das Filtrat über Magnesiumsulfat getrocknet und am Rotationsverdampfer vom Lösemittel befreit. Das gewünschte Produkt kann nicht isoliert werden.

GC/MS ($R_T = 8.97$ min): m/z (%): 336 (4) $[M]^+$, 334 (10) $[M]^+$, 332 (9) $[M]^+$, 330 (6) $[M]^+$, 255 (46), 253 (100), 251 (72), 174 (52), 172 (72), 137 (16), 102 (20), 86 (10), 75 (14), 68 (18).

4.14.1.6 5,6-Bis(brommethyl)benzo-1,3-dioxol 98f

In einem 50 ml-Einhalskolben mit Rückflusskühler werden 2.83 g (23.2 mmol) 1,3-Benzodioxol **101** vorgelegt und bei 0 °C mit 2.83 g (≈ 94 mmol) Paraformaldehyd in 27 ml Bromwasserstoffsäure (33 % in Essigsäure) vermischt. Die Reaktionsmischung wird über Nacht unter Rühren auf Raumtemperatur erwärmt. Anschließend wird das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt.

Ausbeute: 7.10 g (23.1 mmol) 99 % d. Th. (Lit. 63 %)

$^1\text{H-NMR}$ (600 MHz, Chloroform-d): δ [ppm] = 4.59 (s, 4H, -Ph-CH₂-Br), 5.97 (s, 2H, -O-CH₂-O-), 6.82 (s, 2H, 4-H, 7-H).

$^{13}\text{C-NMR}$ (150 MHz, Chloroform-d): δ [ppm] = 30.4 (Ph-CH₂-Br), 101.8 (-O-CH₂-O-), 110.8 (C-4, C-7), 130.5 (C-5, C-6), 148.3 (C-3', C-7').

GC/MS ($R_T = 9.00$ min): m/z (%): 310 (3) $[M]^+$, 308 (6) $[M]^+$, 306 (3) $[M]^+$, 229 (55), 227 (59), 148 (100), 89 (27).

4.14.1.7 2,3-Bis(brommethyl)pyridin **98d**

In einem 500 ml-Einhalskolben mit Rückflusskühler werden 10.7 g (100 mmol) 2,3-Lutidin **96d** in 150 ml Tetrachlormethan gelöst und mit 35.6 g (200 mmol) *N*-Bromsuccinimid **97** sowie 0.20 g (1.22 mmol) AIBN versetzt. Die Reaktionsmischung wird vorsichtig unter Rückfluss erwärmt, bis die Reaktion startet. Sobald sich das *N*-Bromsuccinimid **97** vollständig gelöst hat und das freigewordene Succinimid an der Oberfläche der Lösung schwimmt, erhitzt man nochmals für 10 min zum Sieden. Nach dem Abkühlen wird der Feststoff abgesaugt, das Succinimid mit etwas Tetrachlormethan gewaschen und aus den vereinigten Filtraten das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Es entsteht ein Produktgemisch aus Mono-, Di- und Tribromid und deren Isomeren.

Ausbeute: 1.55 g

GC/MS ($R_T = 6.90$ min): m/z (%): 267 (4) $[M]^+$, 265 (8) $[M]^+$, 263 (4) $[M]^+$, 186 (94), 184 (100), 105 (63), 78 (12).

4.14.1.8 1,2-Phenylendimethanthiol **102a**

In einem 1 l-Einhalskolben werden 26.4 g (100 mmol) 1,2-Bis(brommethyl)benzol **98a** und 19.0 g (250 mmol) Thioharnstoff in 240 ml Ethanol gelöst und 6 h zum Rückfluss erhitzt. Anschließend wird das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt und der feste Rückstand in 500 ml Wasser gelöst. Danach gibt man eine Lösung aus 16 g (400 mmol) Natriumhydroxid und 160 ml Wasser hinzu und erhitzt das Gemisch für weitere 6 h zum Rückfluss. Man lässt die Mischung erkalten, neutralisiert mit 200 ml verdünnter Schwefelsäure (2 mol/l) und extrahiert die wässrige Phase viermal

mit je 250 ml Dichlormethan. Die vereinten organischen Phasen werden über Natriumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt.

Ausbeute: 15.98 g (93.8 mmol) 94 % d. Th. (Lit. 100 %)

$^1\text{H-NMR}$ (500 MHz, Chloroform-d): δ [ppm] = 1.87 (t, $J = 7.1$ Hz, 2H, Ph-CH₂-SH), 3.87 (d, $J = 7.1$ Hz, 4H, Ph-CH₂-SH), 7.21 - 7.25 (m, 2H, Phenyl 3-H, Phenyl 6-H), 7.26 - 7.31 (m, 2H, Phenyl 4-H, Phenyl 5-H).

GC/MS ($R_T = 8.86$ min): m/z (%): 170 (2) $[\text{M}]^+$, 135 (100), 104 (24), 91 (90), 77 (17), 67 (11).

4.14.1.9 (3-Methoxy-1,2-phenylen)dimethanthiol 102b

In 250 ml-Einhalskolben werden 4.41 g (15.0 mmol) 1,2-Bis(brommethyl)-3-methoxybenzol **98b** und 2.85 g (37.5 mmol) Thioharnstoff in 40 ml Ethanol gelöst und 6 h zum Rückfluss erhitzt. Anschließend wird das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt und der feste Rückstand in 75 ml Wasser gelöst. Danach gibt man eine Lösung aus 2.40 g (100 mmol) Natriumhydroxid und 24 ml Wasser hinzu und erhitzt das Gemisch für weitere 6 h zum Rückfluss. Man lässt die Mischung erkalten, neutralisiert mit 30 ml verdünnter Schwefelsäure (2 mol/l) und extrahiert die wässrige Phase viermal mit je 50 ml Dichlormethan. Die vereinten organischen Phasen werden über Natriumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Das Rohprodukt wird säulenchromatographisch mit Chloroform als Laufmittel gereinigt ($R_f = 0.74$).

Ausbeute: 2.81 g (14.0 mmol) 94 % d. Th.

$^1\text{H-NMR}$ (500 MHz, Chloroform-d): δ [ppm] = 1.88 (t, $J = 7.1$ Hz, 1H, C-2-CH₂-SH), 2.06 (t, $J = 7.6$ Hz, 1H, C-1-CH₂-SH), 3.81 (d, $J = 7.1$ Hz, 2H, C-1-CH₂-SH), 3.87 (d, $J = 7.7$ Hz, 2H, C-2-CH₂-SH), 3.87 (s, 3H, -O-CH₃), 6.80 (d, $J = 8.2$ Hz, Phenyl 4-H), 6.89 (d, $J = 7.7$ Hz, 1H, Phenyl 6-H), 7.19 (t, $J = 8.0$ Hz, 1H, Phenyl 5-H).

^{13}C -NMR (125 MHz, Chloroform- d): δ [ppm] = 19.1 (C-2- $\text{CH}_2\text{-SH}$), 26.2 (C-1- $\text{CH}_2\text{-SH}$), 55.6 ($-\text{O-CH}_3$), 109.7 (Phenyl C-4), 121.6 (Phenyl C-6), 127.6 (Phenyl C-5), 139.7 (Phenyl C-2), 157.2 (Phenyl C-1), 174.9 (Phenyl C-3).

GC/MS (R_T = 8.58 min): m/z (%): 200 (8) $[\text{M}]^+$, 166 (83), 135 (23), 121 (100), 104 (12), 91 (15).

4.14.1.10 (4-Chlor-1,2-phenylen)dimethanthiol 102c

In 100 ml-Einhalskolben werden 3.05 g (5.11 mmol) 1,2-Bis(brommethyl)-4-chlorbenzol **98c** (50 %ig) und 1.90 g (25.0 mmol) Thioharnstoff in 25 ml Ethanol gelöst und 6 h zum Rückfluss erhitzt. Anschließend wird das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt und der feste Rückstand in 50 ml Wasser gelöst. Danach gibt man eine Lösung aus 1.60 g Natriumhydroxid und 16 ml Wasser hinzu und erhitzt das Gemisch für weitere 6 h zum Rückfluss. Man lässt die Mischung erkalten, neutralisiert mit 20 ml verdünnter Schwefelsäure (2 mol/l) und extrahiert die wässrige Phase viermal mit je 25 ml Dichlormethan. Die vereinten organischen Phasen werden über Natriumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Das gewünschte Produkt kann mit klassischen Methoden nicht isoliert werden.

Ausbeute: 1.20 g (30 %ig lt. GC/MS)

GC/MS (R_T = 5.93 min): m/z (%): 171 (31), 169 (100), 153 (11), 125 (8), 105 (5), 89 (6).

4.14.1.11 [6-(Sulfanylmethyl)-2H-1,3-benzodioxol-5-yl]methanthiol 102e

In einem 250 ml-Einhalskolben werden 4.62 g (15.0 mmol) 5,6-Bis(brommethyl)benzo-1,3-dioxol **98f** und 2.85 g (37.5 mmol) Thioharnstoff in 75 ml Ethanol gelöst und 6 h zum Rückfluss erhitzt. Anschließend wird das

Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt und der feste Rückstand in 50 ml Wasser gelöst. Danach gibt man eine Lösung aus 1.60 g Natriumhydroxid und 16 ml Wasser hinzu und erhitzt das Gemisch für weitere 6 h zum Rückfluss. Man lässt die Mischung erkalten, neutralisiert mit 20 ml verdünnter Schwefelsäure (2 mol/l) und extrahiert die wässrige Phase viermal mit je 75 ml Dichlormethan. Die vereinten organischen Phasen werden über Natriumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt.

Ausbeute: 3.11 g ($\approx$ 53 %ig) ($\equiv$ 7.74 mmol) 52 % d. Th.

GC/MS ($R_T = 9.43$ min): m/z (%): 214 (4) $[M]^+$, 212 (46), 179 (9), 148 (100), 89 (17).

4.14.1.12 [3-(Sulfanylmethyl)pyridin-2-yl]methanthiol 102d

In 250 ml-Einhalskolben werden 1.55 g (5.11 mmol) 2,3-Bis(brommethyl)pyridin (Gemisch aus Mono-, Di- und Tribromid) **98d** und 1.52 g (20.0 mmol) Thioharnstoff in 75 ml Ethanol gelöst und 6 h zum Rückfluss erhitzt. Anschließend wird das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt und der feste Rückstand in 50 ml Wasser gelöst. Danach gibt man eine Lösung aus 1.60 g Natriumhydroxid und 16 ml Wasser hinzu und erhitzt das Gemisch für weitere 6 h zum Rückfluss. Man lässt die Mischung erkalten, neutralisiert mit 20 ml verdünnter Schwefelsäure (2 mol/l), wobei viel schwarzer Feststoff ausfällt, der abfiltriert wird, und extrahiert die wässrige Phase viermal mit je 25 ml Dichlormethan. Die vereinten organischen Phasen werden über Natriumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Das gewünschte Produkt kann weder in den Extrakten noch im Niederschlag analytisch nachgewiesen werden.

4.14.1.13 3,5-Dihydro-1*H*-2,4-benzodithiepin 103

In einem 250 ml-Zweihalskolben mit Rückflusskühler, Tropftrichter und Abgang zur Stickstoff-Vakuum-Linie werden 4.54 g (120.0 mmol) Natriumborhydrid vorgelegt, sekuriert und in 75 ml abs. THF aufgeschlämmt. Danach werden aus dem Tropftrichter 9.13 g (120.0 mmol) Dischwefelkohlenstoff und 10.56 g (40.0 mmol) 1,2-Bis(brommethyl)benzol **98a** gelöst in 40 ml abs. THF bei Raumtemperatur zugetropft. Die erhaltene Lösung wird unter Stickstoffatmosphäre für 16 h unter starkem Rühren zum Rückfluss erhitzt. Anschließend wird das Reaktionsgemisch mit 150 ml ges. Ammoniumchlorid-Lösung hydrolysiert, mit 1000 ml Diethylether extrahiert, über Natriumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Das Rohprodukt wird aus Methanol umkristallisiert.

Ausbeute: 3.01 g (16.5 mmol) 41 % d. Th.

(Lit. 79 %)

¹H-NMR (500 MHz, d₆-Dimethylsulfoxid): δ [ppm] = 4.09 (s, 4H, Ph-CH₂-S-), 4.24 (s, 2H, -S-CH₂-S-), 7.13 - 7.18 (m, 2H, Phenyl 3-H, Phenyl 6-H), 7.20 - 7.25 (m, 2H, Phenyl 4-H, Phenyl 5-H).

¹³C-NMR (125 MHz, d₆-Dimethylsulfoxid): δ [ppm] = 35.7 (-CH₂-), 127.1 (Phenyl C-4, Phenyl C-5), 128.9 (Phenyl C-3, Phenyl C-6), 140.6 (Phenyl C-1, Phenyl C-2).

GC/MS (R_T = 8.08 min): m/z (%): 182 (53) [M]⁺, 135 (100), 104 (19), 91 (12).

4.14.1.14 3,3-Dimethyl-3,5-dihydro-1*H*-2,4-benzodithiepin 105a

In einem 100 ml-Zweihalskolben mit Abgang zur Stickstoff-Vakuum-Linie werden 0.40 g (2.20 mmol) 3,5-Dihydro-1*H*-2,4-benzodithiepin **103** eingewogen, sekuriert und in 25 ml abs. THF gelöst. Bei -78 °C werden 1.5 ml (2.40 mmol) *n*-Butyllithium (1.6 mol/l in *n*-Hexan) zugegeben und 1 h bei derselben Temperatur gerührt. Anschließend werden 0.31 g (2.20 mmol) Methyljodid zugetropft und der Reaktionsansatz 1 h bei Raumtemperatur gerührt. Daraufhin werden abermals

bei -78 °C 1.5 ml (2.40 mmol) *n*-Butyllithium (1.6 mol/l in *n*-Hexan) zugegeben, 1 h bei derselben Temperatur gerührt, 0.31 g (2.20 mmol) Methyljodid zugetropft und der Reaktionsansatz über Nacht auf Raumtemperatur erwärmt. Das Reaktionsgemisch wird mit 10 ml dest. Wasser und 20 ml ges. Ammoniumchlorid-Lösung hydrolysiert, mit 150 ml Chloroform extrahiert, die vereinigten organischen Phasen über Natriumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Bei dem entstandenen Produkt handelt es sich hauptsächlich um das einfach methylierte Benzodithiepin **104**. Eine erneute Lithiierung und anschließende Umsetzung mit Methyljodid führt zu einer Anreicherung des zweifach methylierten Produkts. Eine Isolierung gelingt mit diesem Gemisch nicht.

GC/MS ($R_T = 8.15$ min): m/z (%): 196 (24) $[M]^+$, 135 (100), 131 (24), 104 (23), 91 (16).

GC/MS ($R_T = 8.31$ min): m/z (%): 210 (13) $[M]^+$, 177 (18), 135 (100), 118 (14), 104 (10), 91 (13).

In einem 100 ml-Zweihalskolben mit Wasserabscheider und Tropftrichter werden 1.70 g (10.0 mmol) 1,2-Phenylendimethanthiol **102a** und 100 mg (0.58 mmol) *p*-Toluolsulfonsäure in 50 ml Toluol gelöst und innerhalb von 30 Minuten 0.58 g (10.0 mmol) Aceton **106a** in 20 ml Toluol zugetropft. Danach wird der Reaktionsansatz 10 h zum Rückfluss erhitzt. Nach dem Abkühlen wird die Mischung in einen Scheidetrichter überführt, mit 20 ml ges. Natriumchlorid-Lösung gewaschen und die Phasen getrennt. Die organische Phase wird über Natriumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt.

Ausbeute: 2.08 g (9.89 mmol) 99 % d. Th.

GC/MS ($R_T = 8.25$ min): m/z (%): 210 (14) $[M]^+$, 177 (16), 145 (9), 135 (100), 104 (9), 91 (10).

4.14.1.15 3-Methyl-3-propyl-3,5-dihydro-1H-2,4-benzodithiepin über mineralische Katalyse 105b

In einem 100 ml-Einhalskolben mit Wasserabscheider und Rückflusskühler werden 1.70 g (10.0 mmol) 1,2-Phenylendimethanthiol **102a** und 1.29 g (15.0 mmol) 2-Pentanon **106b** in 50 ml Benzol gelöst und 0.50 g Montmorillonit KSF (1 h bei 110 °C getrocknet) zugegeben. Der Reaktionsansatz wird 8 h zum Rückfluss erhitzt. Nach dem Abkühlen wird der Feststoff abfiltriert und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Das gewünschte Produkt kann in der Analytik nicht nachgewiesen werden.

4.14.1.16 3-Methyl-3-propyl-3,5-dihydro-1H-2,4-benzodithiepin über Säurekatalyse 105b

In einem 100 ml-Zweihalskolben mit Sokslet-Extraktor (30 ml, Molekularsieb 4 Å), Rückflusskühler und Tropftrichter werden 1.70 g (10.0 mmol) 1,2-Phenylendimethanthiol **102a** und 100 mg (0.58 mmol) *p*-Toluolsulfonsäure in 50 ml Toluol gelöst und innerhalb von 30 Minuten 0.86 g (10.0 mmol) 2-Pentanon **106b** in 30 ml Toluol zugetropft. Danach wird der Reaktionsansatz 10 h zum Rückfluss erhitzt. Nach dem Abkühlen wird die Mischung in einen Scheidetrichter überführt, mit 20 ml ges. Natriumchlorid-Lösung gewaschen und die Phasen getrennt. Die organische Phase wird über Natriumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Das Rohprodukt wird in Diethylether gelöst und dreimal mit demselben Volumen wässriger Kaliumhydroxid-Lösung (7 %ig) gewaschen. Nach der Phasentrennung wird die organische Phase am Rotationsverdampfer vom Lösemittel befreit.

Ausbeute: 1.22 g (5.12 mmol) 51 % d. Th.

GC/MS ($R_T = 9.34$ min): *m/z* (%): 238 (7) $[M]^+$, 205 (13), 135 (100), 104 (13), 91 (15), 69 (9).

$^1\text{H-NMR}$ (500 MHz, Chloroform- d): δ [ppm] = 0.98 (t, J = 7.3 Hz, 3H, $-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$), 1.53 - 1.60 (m, 2H, $-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$), 1.70 (br s, 3H, $-\text{CH}_3$), 1.95 - 2.00 (m, 2H, $-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$), 3.90 - 4.00 (m, 4H, Ph- $\text{CH}_2-\text{S}-$), 7.12 - 7.19 (m, 4H, Phenyl).

$^{13}\text{C-NMR}$ (125 MHz, Chloroform- d): δ [ppm] = 14.3 ($-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$), 17.9 ($-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$), 27.9 ($-\text{CH}_3$), 32.7 (Ph- $\text{CH}_2-\text{S}-$), 44.2 ($-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$), 57.0 ($-\text{S}-\text{C}-\text{S}-$), 127.4 (Phenyl C-4, Phenyl C-5), 128.9 (Phenyl C-3, Phenyl C-6), 139.4 (Phenyl C-1, Phenyl C-2).

4.14.1.17 3-3-Bis(trifluormethyl)-3,5-dihydro-1*H*-2,4-benzodithiepin 105c

In einem 100 ml-Zweihalskolben mit Sokslet-Extraktor (30 ml, Molekularsieb 4 Å) und Tropftrichter werden 1.70 g (10.0 mmol) 1,2-Phenylendimethanthiol **102a** und 100 mg (0.58 mmol) *p*-Toluolsulfonsäure vorgelegt und sekuriert. Die Edukte werden in 50 ml Toluol gelöst und innerhalb von 30 min 2.20 g (10.0 mmol) Hexafluoraceton-Trihydrat **106c** in 20 ml Toluol zugetropft. Danach wird der Reaktionsansatz 10 h zum Rückfluss erhitzt. Nach dem Abkühlen wird die Mischung in einen Scheidetrichter überführt, mit 20 ml ges. Natriumchlorid-Lösung gewaschen und die Phasen getrennt. Die organische Phase wird über Natriumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Das gewünschte Produkt kann in der Analytik nicht nachgewiesen werden.

4.14.1.18 1,5-Dihydrospiro[2,4-benzodithiepin-3,1'-cyclooctan] 105d

In einem 100 ml-Zweihalskolben mit Sokslet-Extraktor (30 ml, Molekularsieb 4 Å), Rückflusskühler und Tropftrichter werden 0.85 g (5.00 mmol) 1,2-Phenylendimethanthiol **102a** und 50 mg (0.29 mmol) *p*-Toluolsulfonsäure in 50 ml Toluol gelöst und innerhalb von 30 min 0.63 g (5.00 mmol) Cyclooctanon **106d** in 30 ml Toluol zugetropft. Danach wird der Reaktionsansatz 10 h zum Rückfluss erhitzt. Nach dem Abkühlen wird die Mischung in einen Scheidetrichter überführt, mit

20 ml ges. Natriumchlorid-Lösung gewaschen und die Phasen getrennt. Die organische Phase wird über Natriumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt.

Ausbeute: 1.36 g (4.88 mmol) 98 % d. Th.

GC/MS ($R_T = 11.30$ min): m/z (%): 278 (16) $[M]^+$, 245 (16), 143 (22), 135 (100), 109 (25), 105 (16), 91 (20), 67 (14).

$^1\text{H-NMR}$ (600 MHz, Chloroform- d): δ [ppm] = 1.53 - 1.62 (m, 6H, Cyclooctyl), 1.70 - 1.75 (m, 4H, Cyclooctyl), 2.16 (br s, 4H, $-\text{CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2-$), 3.91 (br s, 4H, Ph- $\text{CH}_2\text{-S-}$), 7.11 - 7.14 (m, 2H, Phenyl 4-H, Phenyl 5-H), 7.14 - 7.17 (m, 2H, Phenyl 2-H, Phenyl 3-H).

$^{13}\text{C-NMR}$ (150 MHz, Chloroform- d): δ [ppm] = 23.5 ($-\text{CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2-$), 25.3 ($-\text{CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2-$), 28.1 ($-\text{CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2-$), 32.4 (Ph- $\text{CH}_2\text{-S-}$), 41.9 ($-\text{CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2-$), 62.1 ($-\text{S-C-S-}$), 127.3 (Phenyl C-4, Phenyl C-5), 129.0 (Phenyl C-3, Phenyl C-6), 139.3 (Phenyl C-1, Phenyl C-2).

4.14.1.19 1,5-Dihydrospiro[2,4-benzodithiepin-3,1'-cycloheptan] 105e

In einem 100 ml-Zweihalskolben mit Sokslet-Extraktor (30 ml, Molekularsieb 4 Å), Rückflusskühler und Tropftrichter werden 0.85 g (5.00 mmol) 1,2-Phenylendimethanthiol **102a** und 50 mg (0.29 mmol) *p*-Toluolsulfonsäure in 50 ml Toluol gelöst und innerhalb von 30 min 0.56 g (5.00 mmol) Cycloheptanon **106e** in 30 ml Toluol zugetropft. Danach wird der Reaktionsansatz 10 h zum Rückfluss erhitzt. Nach dem Abkühlen wird die Mischung in einen Scheidetrichter überführt, mit 20 ml ges. Natriumchlorid-Lösung gewaschen und die Phasen getrennt. Die organische Phase wird über Natriumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt.

Ausbeute: 1.29 g (4.89 mmol) 98 % d. Th.

GC/MS ($R_T = 11.30$ min): m/z (%): 264 (7) $[M]^+$, 231 (17), 135 (100), 129 (22), 105 (15), 95 (31), 91 (22).

$^1\text{H-NMR}$ (600 MHz, Chloroform- d): δ [ppm] = 2.13 (br s, 4H, $-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-$), 1.59 - 1.70 (m, 8H, $-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-$), 3.93 (br s, 4H, Ph- $\text{CH}_2-\text{S}-$), 7.10 - 7.14 (m, 2H, Phenyl 4-H, Phenyl 5-H), 7.14 - 7.17 (m, 2H, Phenyl 3-H, Phenyl 6-H).

$^{13}\text{C-NMR}$ (150 MHz, Chloroform- d): δ [ppm] = 23.3 ($-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-$), 30.1 ($-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-$), 33.0 (Ph- $\text{CH}_2-\text{S}-$), 40.6 ($-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-$), 62.0 ($-\text{S}-\text{C}-\text{S}-$), 127.2 (Phenyl C-4, Phenyl C-5), 129.1 (Phenyl C-3, Phenyl C-6), 139.0 (Phenyl C-1, Phenyl C-2).

4.14.1.20 **1,5-Dihydrospiro[2,4-benzodithiepin-3,1'-cyclohexan]** über Eisenkatalyse **105f**

In einem 25 ml-Einhalskolben werden 1.68 g Kieselgel (säulenchromatographische Reinheit) zusammen mit 0.32 g (2.0 mmol) Eisen(III)chlorid für 24 h ohne Lösemittel bei Raumtemperatur gerührt.

In einem 50 ml-Einhalskolben werden 1.70 g (10.0 mmol) 1,2-Phenylendimethanthiol **102a** und 1.18 g (12.0 mmol) Cyclohexanon **106f** in 20 ml Dichlormethan gelöst und der Katalysator in einer Portion zugegeben. Diese Mischung wird fünf Minuten bei Raumtemperatur gerührt (orange-rote Färbung der Lösung) und danach mit 5 ml Natronlauge (1 M) deaktiviert. Das entstandene Produkt wird über Celite filtriert und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Das Rohprodukt wird säulenchromatographisch mit einem 2:1-Gemisch aus Ethylacetat und *n*-Hexan als Laufmittel gereinigt ($R_f = 0.84$).

Ausbeute: 1.01 g (4.03 mmol) 40 % d. Th.

GC/MS ($R_T = 10.57$ min): m/z (%): 250 (11) $[M]^+$, 217 (24), 135 (100), 115 (15), 105 (14), 91 (16), 81 (26).

$^1\text{H-NMR}$ (500 MHz, Chloroform- d): δ [ppm] = 1.47 - 1.53 (m, 2H, Cyclohexyl 4-H), 1.66 - 1.72 (m, 4H, Cyclohexyl 2-H, Cyclohexyl 6-H), 2.06 (s, 4H, Cyclohexyl 3-H, Cyclohexyl 5-H), 3.94 (s, 4H, Ph-CH₂-S-), 7.13 - 7.19 (m, 4H, Phenyl).

$^{13}\text{C-NMR}$ (125 MHz, Chloroform- d): δ [ppm] = 22.1 (Cyclohexyl C-4), 25.7 (Cyclohexyl C-3, Cyclohexyl C-5), 31.9 (Cyclohexyl C-2, Cyclohexyl C-6), 34.5 (Ph-CH₂-S-), 58.1 (-S-C-S-), 127.3 (Phenyl C-4, Phenyl C-5), 128.9 (Phenyl C-3, Phenyl C-6), 139.5 (Phenyl C-1, Phenyl C-2).

4.14.1.21 1,5-Dihydrospiro[2,4-benzodithiepin-3,1'-cyclohexan] über mineralische Katalyse 105f

In einem 100 ml-Einhalskolben mit Wasserabscheider und Rückflusskühler werden 1.70 g (10.0 mmol) 1,2-Phenylmethanthiol **102a** und 1.47 g (15.0 mmol) Cyclohexanon **106f** in 50 ml Benzol gelöst und 1.00 g Montmorillonit KSF (1 h bei 110 °C getrocknet) zugegeben. Der Reaktionsansatz wird 8 h zum Rückfluss erhitzt. Nach dem Abkühlen wird der Feststoff abfiltriert und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. In der Analytik ist das Produkt nur in Spuren nachweisbar.

4.14.1.22 1,5-Dihydrospiro[2,4-benzodithiepin-3,1'-cyclohexan] über Säurekatalyse 105f

In 100 ml-Zweihalskolben mit Wasserabscheider und Tropftrichter werden 3.47 g (20.4 mmol) 1,2-Phenylendimethanthiol **102a** und 200 mg (1.16 mmol) *p*-Toluolsulfonsäure in 50 ml Toluol gelöst und innerhalb von 30 Minuten 2.00 g (20.4 mmol) Cyclohexanon **106f** in 20 ml Toluol zugetropft. Danach wird der Reaktionsansatz 10 h zum Rückfluss erhitzt. Nach dem Abkühlen wird die Mischung in einen Scheidetrichter überführt, mit 20 ml ges. Natriumchlorid-Lösung gewaschen

und die Phasen getrennt. Die organische Phase wird über Natriumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt.

Ausbeute: 4.99 g (19.9 mmol) 98 % d. Th. (Lit. 100 %)

GC/MS ($R_T = 10.56$ min): m/z (%): 250 (26) $[M]^+$, 217 (35), 135 (100), 115 (16), 105 (14), 91 (13), 81 (27).

4.14.1.23 4'-*tert.*-Butyl-1,5-dihydrospiro[2,4-benzodithiepin-3,1'-cyclohexan] 105g

In einem 100 ml-Zweihalskolben mit Sokslet-Extraktor (30 ml, Molekularsieb 4 Å), Rückflusskühler und Tropftrichter werden 0.85 g (5.00 mmol) 1,2-Phenylendimethanthiol **102a** und 50 mg (0.29 mmol) *p*-Toluolsulfonsäure in 50 ml Toluol gelöst und innerhalb von 30 min 0.77 g (5.00 mmol) 4-*tert.*-Butylcyclohexanon **106g** in 30 ml Toluol zugetropft. Danach wird der Reaktionsansatz 10 h zum Rückfluss erhitzt. Nach dem Abkühlen wird die Mischung in einen Scheidetrichter überführt, mit 20 ml ges. Natriumchlorid-Lösung gewaschen und die Phasen getrennt. Die organische Phase wird über Natriumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt.

Ausbeute: 1.41 g (4.60 mmol) 92 % d. Th.

GC/MS ($R_T = 12.33$ min): m/z (%): 306 (11) $[M]^+$, 273 (25), 171 (24), 135 (100), 105 (28), 91 (24), 81 (14), 57 (21).

$^1\text{H-NMR}$ (600 MHz, Chloroform-*d*): δ [ppm] = 0.89 (s, 9H, $-\text{C}(\text{CH}_3)_3$), 1.09 (tt, $J = 12.0$ Hz, $J = 3.6$ Hz, 1H, $-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}-\text{C}(\text{CH}_3)_3$), 1.56 (ddd, $J = 26.0$ Hz, $J = 13.1$ Hz, $J = 3.3$ Hz, 2H, $-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}-\text{C}(\text{CH}_3)_3$), 1.61 - 1.66 (m, 2H, $-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}-\text{C}(\text{CH}_3)_3$), 1.76 (dt, $J = 13.5$ Hz, $J = 3.8$ Hz, 2H, $-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}-\text{C}(\text{CH}_3)_3$), 2.38 - 2.55 (m, 2H, $-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}-\text{C}(\text{CH}_3)_3$), 3.82 - 4.06 (2x br s, 4H, $-\text{CH}_2-\text{S}-$), 7.12 - 7.18 (m, 4H, Phenyl).

^{13}C -NMR (150 MHz, Chloroform- d): δ [ppm] = 23.1 (-CH₂-CH₂-CH-C(CH₃)₃), 27.5 (-CH₂-CH₂-CH-C(CH₃)₃), 32.1 (Ph-CH₂-S-), 32.4 (-CH₂-CH₂-CH-C(CH₃)₃), 38.5 (-CH₂-CH₂-CH-C(CH₃)₃), 47.8 (-CH₂-CH₂-CH-C(CH₃)₃), 57.9 (-S-C-S-), 127.3 (d, J = 5.7 Hz, Phenyl C-3, Phenyl C-6), 128.9 (d, J = 7.7 Hz, Phenyl C-4, Phenyl C-5), 139.5 (d, J = 8.8 Hz, Phenyl C-1, Phenyl C-2).

4.14.1.24 1'-Methyl-1,5-dihydrospiro[2,4-benzodithiepin-3,4'-piperidin] über Eisenkatalyse 105h

In einem 25 ml-Einhalskolben werden 1.68 g Kieselgel (säulenchromatographische Reinheit) zusammen mit 0.32 g (2.0 mmol) Eisen(III)chlorid für 24 h ohne Lösemittel bei Raumtemperatur gerührt.

In einem 50 ml-Einhalskolben werden 1.70 g (10.0 mmol) 1,2-Phenylendimethanthiol **102a** und 1.36 g (12.0 mmol) *N*-Methylpiperidin-4-on **106h** in 20 ml Dichlormethan gelöst und der Katalysator in einer Portion zugegeben. Diese Mischung wird 5 min bei Raumtemperatur gerührt (schwarz-grüne Färbung der Lösung) und danach mit 5 ml Natronlauge (1 mol/l) desaktiviert. Das entstandene Produkt wird über Celite filtriert und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Die Analytik zeigt, dass keinerlei Umsatz der Edukte stattfindet.

4.14.1.25 1'-Methyl-1,5-dihydrospiro[2,4-benzodithiepin-3,4'-piperidin] über Säurekatalyse 105h

In einem 100 ml-Zweihalskolben mit Wasserabscheider und Tropftrichter werden 1.70 g (10.0 mmol) 1,2-Phenylendimethanthiol **102a** und 0.10 g (0.58 mmol) *p*-Toluolsulfonsäure in 50 ml Toluol gelöst und innerhalb von 30 Minuten 1.54 g (10.0 mmol) 1-Methylpiperidin-4-on **106h** (HCl-Addukt/Monohydrat) in 20 ml Toluol zugetropft. Danach wird der Reaktionsansatz 10 h zum Rückfluss erhitzt. Nach dem Abkühlen wird die Mischung in einen Scheidetrichter überführt, mit 20 ml ges.

Natriumchlorid-Lösung sowie ges. Natriumhydrogencarbonat-Lösung gewaschen (bis pH 12) und die Phasen getrennt. Die wässrige Phase wird dreimal mit je 30 ml Toluol, Ethylacetat und Diethylether extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen werden über Natriumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Das gewünschte Produkt lässt sich in der Analytik nicht nachweisen.

4.14.1.26 1,5-Dihydrospiro[2,4-benzodithiepin-3,4'-oxan] 105i

In einem 100 ml-Zweihalskolben mit Wasserabscheider und Tropftrichter werden 1.70 g (10.0 mmol) 1,2-Phenylendimethanthiol **102a** und 100 mg (0.58 mmol) *p*-Toluolsulfonsäure in 50 ml Toluol gelöst und innerhalb von 30 Minuten 1.00 g (10.0 mmol) Tetrahydro-4*H*-pyran-4-on **106i** in 20 ml Toluol zugetropft. Danach wird der Reaktionsansatz 10 h zum Rückfluss erhitzt. Nach dem Abkühlen wird die Mischung in einen Scheidetrichter überführt, mit 20 ml ges. Natriumchlorid-Lösung gewaschen und die Phasen getrennt. Die organische Phase wird über Natriumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt.

Ausbeute: 2.50 g (9.90 mmol) 99 % d. Th.

¹H-NMR (500 MHz, Chloroform-*d*): δ [ppm] = 2.42 - 2.98 (m, 4H, -CH₂-CH₂-O-), 3.83 - 3.87 (m, 4H, -CH₂-CH₂-O-), 3.92 - 4.00 (m, Ph-CH₂-S-), 7.14 - 7.20 (m, 4H, Phenyl).

¹³C-NMR (125 MHz, Chloroform-*d*): δ [ppm] = 31.7 (Ph-CH₂-S-), 38.3 (-CH₂-CH₂-O-), 55.0 (-S-C-S-), 63.6 (-CH₂-CH₂-O-), 127.5 (Phenyl C-4, Phenyl C-5), 129.0 (Phenyl C-3, Phenyl C-6), 139.0 (Phenyl C-1, Phenyl C-2).

GC/MS (R_T = 10.70 min): m/z (%): 252 (14) [M]⁺, 219 (11), 187 (14), 135 (100), 104 (13), 91 (11).

4.14.1.27 1,5-Dihydrospiro[2,4-benzodithiepin-3,1'-cyclobutan] 105j

In einem 100 ml-Zweihalskolben mit Wasserabscheider und Tropftrichter werden 2.44 g (14.3 mmol) 1,2-Phenylendimethanthiol **102a** und 140 mg (0.83 mmol) *p*-Toluolsulfonsäure in 50 ml Toluol gelöst und innerhalb von 30 min 1.00 g (14.3 mmol) Cyclobutanon **106j** in 20 ml Toluol zugetropft. Danach wird der Reaktionsansatz 10 h zum Rückfluss erhitzt. Nach dem Abkühlen wird die Mischung in einen Scheidetrichter überführt, mit 20 ml ges. Natriumchlorid-Lösung gewaschen und die Phasen getrennt. Die organische Phase wird über Natriumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Das Rohprodukt wird säulenchromatographisch mit Chloroform als Laufmittel gereinigt ($R_f = 0.70$).

Ausbeute: 2.78 g (12.5 mmol) 87 % d. Th.

$^1\text{H-NMR}$ (300 MHz, Chloroform-*d*): δ [ppm] = 2.24 - 2.34 (m, 2H, Cyclobutyl 3-H), 2.51 (br s, 4H, Cyclobutyl 2-H, Cyclobutyl 4-H), 3.90 (br s, 4H, Ph-CH₂-S-), 7.19 (s, 4H, Phenyl).

$^{13}\text{C-NMR}$ (75 MHz, Chloroform-*d*): δ [ppm] = 16.3 (Cyclobutyl), 33.9 (Ph-CH₂-S-), 57.0 (-S-C-S-), 127.6 (Phenyl C-4, Phenyl C-5), 129.0 (Phenyl C-3, Phenyl C-6), 139.6 (Phenyl C-1, Phenyl C-2).

GC/MS ($R_T = 9.26$ min): m/z (%): 222 (21) $[\text{M}]^+$, 189 (44), 161 (20), 135 (80), 104 (100), 91 (15), 78 (11).

4.14.1.28 6-Methoxy-1,5-dihydrospiro[2,4-benzodithiepin-3,1'-cyclohexan] 105k

In einem 100 ml-Zweihalskolben mit Sokslet-Extraktor (30 ml, Molekularsieb 4 Å) und Tropftrichter werden 1.00 g (5.00 mmol) (3-Methoxy-2-(sulfanylmethyl)phenyl)methanthiol **102b** und 50 mg (0.29 mmol) *p*-Toluolsulfonsäure in 50 ml Toluol gelöst und innerhalb von 30 min 0.49 g (5.00 mmol) Cyclohexanon

106f in 30 ml Toluol zugetropft. Danach wird der Reaktionsansatz 10 h zum Rückfluss erhitzt. Nach dem Abkühlen wird die Mischung in einen Scheidetrichter überführt, mit 20 ml ges. Natriumchlorid-Lösung gewaschen und die Phasen getrennt. Die organische Phase wird über Natriumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Das gewünschte Produkt kann nach Umkristallisation aus Ethanol, Säulenchromatographie (Ethylacetat / *n*-Hexan (1:1)) und nach Ausschütteln mit ges. Natriumhydrogencarbonat-Lösung nicht rein erhalten werden.

Ausbeute: 1.12 g (ca. 70 %ig lt. GC/MS)

GC/MS ($R_T = 11.64$ min): m/z (%): 280 (11) $[M]^+$, 247 (22), 165 (100), 150 (9), 135 (38), 121 (14), 104 (13), 91 (11), 81 (9).

4.14.1.29 8-Chlor-1,5-dihydrospiro[2,4-benzodithiepin-3,1'-cyclohexan] 105I

In einem 100 ml-Zweihalskolben mit Sokslet-Extraktor (30 ml, Molekularsieb 4 Å) und Tropftrichter werden 1.20 g (1.77 mmol) (4-Chlor-1,2-phenylen)dimethanthiol (30 %ig) **102c** und 50 mg (0.29 mmol) *p*-Toluolsulfonsäure in 50 ml Toluol gelöst und innerhalb von 30 min 0.49 g (5.00 mmol) Cyclohexanon **106f** in 30 ml Toluol zugetropft. Danach wird der Reaktionsansatz 10 h zum Rückfluss erhitzt. Nach dem Abkühlen wird die Mischung in einen Scheidetrichter überführt, mit 20 ml ges. Natriumchlorid-Lösung gewaschen und die Phasen getrennt. Die organische Phase wird über Natriumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Das gewünschte Produkt kann in der Analytik nicht nachgewiesen werden.

4.14.1.30 4',6'-Dioxa-11',13'-dithiaspiro(cyclohexan-1,12'-tricyclo[7.5.0.0^{3,7}]tetradecan)-1'(9'),2',7'-trien 105m

In einem 100 ml-Zweihalskolben mit Sokslet-Extraktor (30 ml, Molekularsieb 4 Å) und Tropftrichter werden 3.11 g (53 %ig, entspr. 7.74 mmol) [6-(Sulfanylmethyl)benzo-1,3-dioxol-5-yl]methanthiol **102e** und 77 mg (0.45 mmol) *p*-Toluolsulfonsäure in 50 ml Toluol gelöst und innerhalb von 30 min 0.76 g (7.74 mmol) Cyclohexanon **106f** in 30 ml Toluol zugetropft. Danach wird der Reaktionsansatz 10 h zum Rückfluss erhitzt. Nach dem Abkühlen wird die Mischung in einen Scheidetrichter überführt, mit 20 ml ges. Natriumchlorid-Lösung gewaschen und die Phasen getrennt. Die organische Phase wird über Natriumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Das gewünschte Produkt lässt sich per Säulenchromatographie mit Ethylacetat als Laufmittel, Extraktion des Thiols mit ges. Natriumhydrogencarbonat-Lösung und Umkristallisation aus Ethanol nicht isolieren.

Ausbeute: 2.98 g (ca. 75 %ig lt. GC/MS)

GC/MS ($R_T = 13.07$ min): *m/z* (%): 294 (18) $[M]^+$, 229 (42), 179 (100), 148 (48), 135 (12), 121 (14).

4.14.2 Oxidationsversuche an Benzodithiepin-Derivaten

4.14.2.1 3,5-Dihydro-1*H*-2λ⁴,4-benzodithiepin-2-on 107

In einem sekurierten 100 ml-Zweihalskolben mit Tropftrichter und Abgang zur Stickstoff-Vakuum-Linie werden 0.50 g (2.75 mmol) 1,5-Dihydrobenzodithiepin **103** in 25 ml abs. Dichlormethan gelöst, auf 0 °C gekühlt und 0.47 g (2.75 mmol) *m*-Chlorperbenzoesäure (in 25 ml abs. Dichlormethan) zugetropft. Man rührt 1 h bei 0 °C, wäscht die Reaktionsmischung mit ges. Natriumhydrogencarbonat-Lösung, trocknet die organische Phase über Natriumsulfat und entfernt das Lösemittel am Rotationsverdampfer.

Ausbeute: 110 mg (0.55 mmol) 20 % d. Th.

$^1\text{H-NMR}$ (500 MHz, Chloroform- d): δ [ppm] = 3.73 (s, 2H, Ph-CH₂-S-), 4.19 (d, J = 14.2 Hz, 2H, -S-CH₂-S-), 4.66 (d, J = 14.1 Hz, 2H, Ph-CH₂-S=O), 7.33 - 7.38 (m, 2H, Phenyl), 7.42 - 7.45 (m, 2H, Phenyl).

GC/MS (R_T = 10.95 min): m/z (%): 198 (<1) $[\text{M}]^+$, 152 (51), 135 (10), 104 (100), 78 (16).

4.14.2.2 3,3-Dimethyl-3,5-dihydro-1*H*-2 λ^4 ,4-benzodithiepin-2-on 108a

In einem 50 ml-Zweihalskolben mit Rückflusskühler und Tropftrichter werden 0.70 g (3.33 mmol) 3,3-Dimethyl-3,5-dihydro-1*H*-2,4-benzodithiepin **105a** in 25 ml Dichlormethan gelöst und auf 0 °C gekühlt. Anschließend werden über den Tropftrichter 0.63 g (3.66 mmol) *m*-Chlorperbenzoesäure, welche in 20 ml Dichlormethan gelöst wurde, zugegeben. Der Reaktionsansatz wird über Nacht bei Raumtemperatur gerührt, dreimal mit je 50 ml 10%iger Natriumhydroxid-Lösung und Wasser gewaschen, danach über Natriumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Wird die Stoffmenge der *m*-Chlorperbenzoesäure verdoppelt, bildet sich dennoch kein Sulfon, sondern das Sulfoxid. Auch mit Kaliumpermanganat bildet sich das Sulfoxid bzw. es findet kein Umsatz statt.

Ausbeute: 0.66 g (2.72 mmol) 82 % d. Th.

MS (EI, 70 eV): m/z (%): 226 (11) $[\text{M}]^+$, 152 (39), 135 (28), 104 (100), 78 (13).

4.14.2.3 1,5-Dihydrospiro[2 λ^4 ,4-benzodithiepin-3,1'-cyclohexan]-2-on 108b

In einem 50 ml-Zweihalskolben mit Rückflusskühler und Tropftrichter werden 2.50 g (10.0 mmol) 1,5-Dihydrospiro(2,4-benzodithiepin-3,1'-cyclohexan) **105f** in 50 ml Dichlormethan gelöst und auf 0 °C gekühlt. Anschließend werden über den

Tropftrichter 1.90 g (11.0 mmol) *m*-Chlorperbenzoesäure, welche in 35 ml Dichlormethan gelöst wurde, zugegeben. Der Reaktionsansatz wird über Nacht bei Raumtemperatur gerührt, dreimal mit je 100 ml Natriumhydroxid-Lösung (10 %ig) und Wasser gewaschen, danach über Natriumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Das Rohprodukt wird säulenchromatographisch mit Chloroform als Laufmittel gereinigt ($R_f = 0.15$).

Ausbeute: 1.79 g (6.72 mmol) 67 % d. Th. (Lit. 100 %)

$^1\text{H-NMR}$ (300 MHz, Chloroform-*d*): δ [ppm] = 1.22 - 2.46 (m, 10H, Cyclohexyl), 3.40 (d, $J = 15.6$ Hz, 1H, Ph-CH₂-S-), 3.65 (d, $J = 13.1$ Hz, 1H, Ph-CH₂-S-), 3.94 (d, $J = 15.6$ Hz, 1H, Ph-CH₂-S-), 4.82 (d, $J = 13.2$ Hz, 1H, Ph-CH₂-S-), 7.10 (dd, $J = 7.0$ Hz, $J = 1.8$ Hz, 1H, Phenyl 3-H), 7.16 - 7.25 (m, 2H, Phenyl 4-H, Phenyl 5-H), 7.37 (dd, $J = 6.8$ Hz, $J = 1.9$ Hz, 1H, Phenyl 6-H).

$^{13}\text{C-NMR}$ (75 MHz, Chloroform-*d*): δ [ppm] = 20.2 (Cyclohexyl C-3, Cyclohexyl C-5), 20.5 (Cyclohexyl C-4), 25.2 (Cyclohexyl C-2, Cyclohexyl C-6), 30.5 (Ph-CH₂-S-), 53.5 (Ph-CH₂-S=O), 68.3 (-S-C-S-), 128.0 (Phenyl), 128.5 (Phenyl), 128.5 (Phenyl), 132.4 (Phenyl C-1), 143.0 (Phenyl C-2).

GC/MS ($R_T = 10.63$ min): m/z (%): 248 (16), 214 (40), 181 (18), 166 (8), 135 (100), 113 (10), 91 (13).

4.14.2.4 4'-*tert.*-Butyl-1,5-Dihydrospiro[2 λ^4 ,4-benzodithiepin-3,1'-cyclohexan]-2-on 108c

In einem 50 ml-Zweihalskolben mit Rückflusskühler und Tropftrichter werden 0.25 g (0.82 mmol) 4'-*tert.*-Butyl-1,5-dihydrospiro(2,4-benzodithiepin-3,1'-cyclohexan) **105g** in 15 ml Dichlormethan gelöst und auf 0 °C gekühlt. Anschließend werden über den Tropftrichter 0.16 g (0.90 mmol) *m*-Chlorperbenzoesäure, welche in 10 ml Dichlormethan gelöst wurde, zugegeben. Der Reaktionsansatz wird über Nacht bei Raumtemperatur gerührt, dreimal mit je 25 ml 10%iger Natriumhydroxid-Lösung und

Wasser gewaschen, danach über Natriumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Das gewünschte Produkt kann nicht isoliert werden.

Ausbeute: 0.16 g

MS (EI, 70 eV): m/z (%): 322 (25) $[M]^+$, 170 (13), 152 (73), 135 (88), 104 (100), 91 (13), 78 (11), 57 (20), 41 (10).

4.14.2.5 1,5-Dihydrospiro[2 λ^4 ,4-benzodithiepin-3,1'-cyclobutan]-2-on **108d**

In einem 100 ml-Zweihalskolben mit Rückflusskühler und Tropftrichter werden 0.48 g (2.16 mmol) 1,5-Dihydrospiro(2,4-benzodithiepin-3,1'-cyclobutan) **105j** in 25 ml Dichlormethan gelöst und auf 0 °C gekühlt. Anschließend werden über den Tropftrichter 0.41 g (2.38 mmol) *m*-Chlorperbenzoesäure, welche in 20 ml Dichlormethan gelöst wurde, zugegeben. Der Reaktionsansatz wird über Nacht bei Raumtemperatur gerührt, dreimal mit je 50 ml 10%iger Natriumhydroxid-Lösung und Wasser gewaschen, danach über Natriumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Das Produkt ist verunreinigt und kann durch klassische Methoden nicht isoliert werden.

Ausbeute: 0.48 g

$^1\text{H-NMR}$ (600 MHz, Chloroform- d): δ [ppm] = 1.63 - 1.83 (m, 2H, Cyclobutyl), 1.98 - 2.11 (m, 1H, Cyclobutyl), 2.32 - 2.48 (m, 2H, Cyclobutyl), 2.85 - 2.97 (m, 1H, Cyclobutyl), 3.17 - 3.29 (m, 1H, Ph-CH₂-S-), 3.44 (d, J = 11.7 Hz, Ph-CH₂-S-), 3.61 - 3.75 (m, 1H, Ph-CH₂-S-), 4.28 - 4.40 (m, 1H, Ph-CH₂-S-), 7.09 - 7.16 (m, 1H, Phenyl 3-H), 7.18 - 7.26 (m, 2H, Phenyl 5-H, Phenyl 6-H), 7.33 - 7.39 (m, 1H, Phenyl 4-H).

$^{13}\text{C-NMR}$ (150 MHz, Chloroform- d): δ [ppm] = 15.1 (Cyclobutyl C-3), 32.7 (Cyclobutyl), 33.9 (Cyclobutyl), 55.6 (Ph-CH₂-S=O), 66.8 (-S-C-S-), 127.6 (Phenyl), 128.1 (Phenyl), 128.6 (Phenyl), 129.0 (Phenyl), 131.8 (Phenyl C-1), 132.2 (Phenyl C-2).

MS (EI, 70 eV): m/z (%): 238 (12) [M]⁺, 189 (13), 168 (10), 152 (35), 135 (47), 104 (100), 91 (9), 78 (13).

4.14.2.6 1,5-Dihydrospiro[2λ⁶,4-benzodithiepin-3,1'-cyclohexan]-2,2-dion 109

In einem 250 ml-Zweihalskolben mit Rückflusskühler und Tropftrichter werden 0.68 g (2.72 mmol) 1,5-Dihydrospiro(2,4-benzodithiepin-3,1'-cyclohexan) **105f** in 70 ml Wasser aufgeschlämmt und mit einigen Tropfen konz. Schwefelsäure versetzt. Mittels eines Tropftrichters wird eine Lösung aus 0.57 g (3.62 mmol) Kaliumpermanganat in 30 ml Wasser innerhalb von 2 h zugegeben (jeder Tropfen sollte entfärbt werden). Anschließend wird das ausfallende Mangandioxid abfiltriert und mit Chloroform gewaschen. Das Filtrat wird viermal mit je 50 ml Chloroform extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen werden über Natriumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Das gewünschte Produkt kann in der Analytik nicht nachgewiesen werden, sondern nur das Edukt.

In einem 50 ml-Einhalskolben mit Rückflusskühler werden 0.24 g (0.96 mmol) 1,5-Dihydrospiro(2,4-benzodithiepin-3,1'-cyclohexan) **105f** in 20 ml *n*-Hexan gelöst. Danach werden 0.38 g (2.43 mmol) Kaliumpermanganat sowie 0.19 g (0.77 mmol) Kupfer(II)sulfat-Pentahydrat zugegeben. Die Reaktionsmischung wird für 25 h zum Rückfluss erhitzt, nach dem Abkühlen mit 20 ml Diethylether versetzt und weitere 10 min bei Raumtemperatur gerührt. Die Lösung wird anschließend mittels einer Glasfritte (gefüllt mit Celite) filtriert. Das Filtrat wird über Natriumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Das gewünschte Produkt kann in der Analytik nicht nachgewiesen werden, sondern nur das Edukt.

In einem 50 ml-Einhalskolben mit Rückflusskühler werden 0.50 g (2.00 mmol) 1,5-Dihydrospiro(2,4-benzodithiepin-3,1'-cyclohexan) **105f** in 10 ml Eisessig gelöst,

mit 0.80 g (7.00 mmol) Wasserstoffperoxid-Lösung (30 %ig) versetzt und 1 h bei 90 °C gerührt. Nach dem Abkühlen wird die Lösung auf 75 ml einer Eis-Wasser-Mischung gegeben. Der entstehende Niederschlag wird abfiltriert. Das gewünschte Produkt kann in der Analytik nicht nachgewiesen werden.

In einem 50 ml-Einhalskolben mit Rückflusskühler werden 0.50 g (2.00 mmol) 1,5-Dihydrospiro(2,4-benzodithiepin-3,1'-cyclohexan) **105f** in 10 ml Eisessig gelöst, mit 1.08 g (7.00 mmol) Natriumperborat versetzt und 1 h bei 55 °C gerührt. Nach dem Abkühlen wird die Lösung auf 75 ml einer Eis-Wasser-Mischung gegeben. Der ausfallende Niederschlag wird abfiltriert und enthält neben dem Edukt auch das Sulfoxid und das Sulfon. Eine säulenchromatographische Reinigung gelingt nicht.

Ausbeute: 0.28 g

MS (EI, 70 eV): m/z (%): 306 (6) [M]⁺, 267 (3), 250 (4), 224 (19), 169 (29), 135 (15), 104 (100), 81 (10), 78 (11).

4.14.3 Synthese der Thioamide mit Benzodithiepin-Struktur

4.14.3.1 *N*-Ethyl-3,5-dihydro-1*H*-2,4-benzodithiepin-3-carbothioamid **110a**

In einem 50 ml-Zweihalskolben mit Abgang zur Stickstoff-Vakuum-Linie werden 0.27 g (1.48 mmol) 3,5-Dihydro-1*H*-2,4-benzodithiepin **103** eingewogen, sekuriert und in 10 ml abs. THF gelöst. Bei -78 °C werden 1.03 ml (1.65 mmol) *n*-Butyllithium (1.6 mol/l in *n*-Hexan) zugegeben und 1 h bei derselben Temperatur gerührt. Anschließend werden 0.13 g (1.49 mmol) Ethylisothiocyanat **31a** zugetropft und der Reaktionsansatz über Nacht auf Raumtemperatur erwärmt. Das Reaktionsgemisch wird mit 5 ml dest. Wasser und 10 ml ges. Ammoniumchlorid-Lösung hydrolysiert, mit 100 ml Chloroform extrahiert, die vereinigten organischen Phasen über Natriumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Das Rohprodukt wird per präparativer Dünnschicht-Chromatographie gereinigt.

Ausbeute: 259 mg (0.96 mmol) 65 % d. Th.

Schmelzpunkt: 163.6 °C

¹H-NMR (500 MHz, Chloroform-d): δ [ppm] = 1.22 (t, *J* = 7.3 Hz, 3H, -NH-CH₂-CH₃), 3.62 (dq, *J* = 7.3 Hz, *J* = 5.4 Hz, 2H, -NH-CH₂-CH₃), 4.04 (d, *J* = 14.8 Hz, 2H, Ph-CH₂-S-), 4.14 (d, *J* = 14.8 Hz, 2H, Ph-CH₂-S-), 5.29 (d, *J* = 6.4 Hz, 1H, -S-CH-S-), 7.19 - 7.25 (m, 4H, arom. H), 7.65 (s, 1H, -NH-).

GC/MS (*R*_T = 12.66 min): *m/z* (%): 269 (29) [M]⁺, 236 (32), 181 (18), 147 (11), 135 (100), 118 (14), 104 (32), 91 (21), 78 (14).

4.14.3.2 ***N*-Butyl-3,5-dihydro-1*H*-2,4-benzodithiepin-3-carbothioamid 110b**

In einem 100 ml-Einhalskolben mit Abgang zur Stickstoff-Vakuum-Linie werden 0.50 g (2.75 mmol) 1,5-Dihydrobenzodithiepin **103** in 10 ml abs. THF gelöst, auf -60 °C gekühlt und 2.1 ml (3.30 mmol) *n*-Butyllithium (1.6 mol/l in *n*-Hexan) zugegeben. Man rührt 2 h bei -40 °C (Lösung wird rot) und kühlt anschließend auf -60 °C. Danach gibt man 0.32 g (2.75 mmol) *n*-Butylisothiocyanat **31b** zu, rührt weitere 3 h bei -60 °C und erwärmt über Nacht auf Raumtemperatur. Die Reaktionsmischung wird mit 10 ml dest. Wasser hydrolysiert, dreimal mit je 30 ml Chloroform extrahiert, die organischen Phasen über Natriumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Das gewünschte Produkt kann in der Analytik nicht nachgewiesen werden.

4.14.3.3 ***N*-tert.-Butyl-3,5-dihydro-1*H*-2,4-benzodithiepin-3-carbothioamid 110c**

In einem 100 ml-Einhalskolben mit Abgang zur Stickstoff-Vakuum-Linie werden 0.50 g (2.75 mmol) 1,5-Dihydrobenzodithiepin **103** in 10 ml abs. THF gelöst, auf -60 °C gekühlt und 2.1 ml (3.30 mmol) *n*-Butyllithium (1.6 mol/l in *n*-Hexan) zugegeben. Man rührt 2 h bei -40 °C (Lösung wird rot) und kühlt anschließend

auf -60 °C. Danach gibt man 0.32 g (2.75 mmol) *tert.*-Butylisothiocyanat **31d** zu, rührt weitere 3 h bei -60 °C und erwärmt über Nacht auf Raumtemperatur. Die Reaktionsmischung wird mit 10 ml dest. Wasser hydrolysiert, dreimal mit je 30 ml Chloroform extrahiert, die organischen Phasen über Natriumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Das gewünschte Produkt kann in der Analytik nicht nachgewiesen werden.

4.14.3.4 ***N*-Ethyl-3,3-dimethyl-3,5-dihydro-1*H*-2,4-benzodithiepin-1-carbothioamid 111a**

In einem sekurierten 50 ml-Zweihalskolben mit Serumkappe und Abgang zur Stickstoff-Vakuum-Linie werden 0.53 g (2.25 mmol) 3,3-Dimethyl-1,5-dihydrobenzodithiepin **105a** in 15 ml abs. THF gelöst und mittels Trockeneis/Aceton-Bad auf -40 °C gekühlt. Bei dieser Temperatur werden langsam 1.6 ml (2.5 mmol) *n*-Butyllithium (1.6 mol/l in *n*-Hexan) zur obigen Lösung zugetropft, wobei die Innentemperatur -30 °C nicht übersteigen darf. Die Reaktionsmischung wird für 1 h bei -40 °C gerührt. Danach gibt man 0.22 g (2.5 mmol) Ethylisothiocyanat **31a** zu, erwärmt den Ansatz unter Rühren über Nacht auf Raumtemperatur und rührt weitere 2 d. Anschließend hydrolysiert man den Reaktionsansatz mit 20 ml Wasser und extrahiert dreimal mit je 75 ml Chloroform. Die vereinigten organischen Phasen werden über Natriumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Das Rohprodukt wird säulenchromatographisch mit Chloroform als Laufmittel gereinigt ($R_f = 0.44$).

Ausbeute: 0.18 g (0.61 mmol) 24 % d. Th.

Schmelzpunkt: 158.2 °C

$^1\text{H-NMR}$ (500 MHz, d_6 -Dimethylsulfoxid): δ [ppm] = 1.15 (t, $J = 7.3$ Hz, 3H, -NH-CH₂-CH₃), 1.46 (s, 3H, -CH₃), 1.90 (s, 3H, -CH₃), 3.47 - 3.57 (m, 2H, -NH-CH₂-CH₃), 3.57 - 3.74 (m, 2H, Ph-CH₂-S-), 5.53 (s, 1H, Ph-CH-S-), 7.17 - 7.29 (m, 4H, Phenyl), 7.60 - 7.66 (m, 1H, -NH).

^{13}C -NMR (125 MHz, d_6 -Dimethylsulfoxid): δ [ppm] = 12.4 (-NH-CH₂-CH₃), 30.5 (-CH₃), 31.6 (-CH₃), 32.3 (-NH-CH₂-CH₃), 52.6 (Ph-CH-S-), 53.0 (-S-C-S-), 125.0 (Phenyl), 126.9 (Phenyl), 127.2 (Phenyl), 129.1 (Phenyl), 138.5 (Phenyl C-1), 199.1 (C=S).

GC/MS (R_T = 11.70 min): m/z (%): 297 (8) $[\text{M}]^+$, 264 (44), 223 (9), 190 (19), 135 (100), 91 (9).

Elementaranalyse: C₁₅H₁₉NS₃ (297.50 g/mol)

Berechnete Werte: %C 56.52, %H 6.44, %N 4.71

Experimentell bestimmte Werte: %C 55.24, %H 6.53, %N 5.34

4.14.3.5 ***N*-Ethyl-3-methyl-3-propyl-3,5-dihydro-1*H*-2,4-benzodithiepin-1-carbothioamid 111b**

In einem sekurierten 50 ml-Zweihalskolben mit Serumkappe und Abgang zur Stickstoff-Vakuum-Linie werden 0.48 g (2.00 mmol) 3-Methyl-3-propyl-3,5-dihydro-1*H*-2,4-benzodithiepin **105b** in 15 ml abs. THF gelöst und mittels Trockeneis/Aceton-Bad auf -40 °C gekühlt. Bei dieser Temperatur werden langsam 1.5 ml (2.25 mmol) *n*-Butyllithium (1.6 mol/l in *n*-Hexan) zur obigen Lösung zugetropft, wobei die Innentemperatur -30 °C nicht übersteigen darf. Die Reaktionsmischung wird für 1 h bei -40 °C gerührt. Danach gibt man 0.17 ml (2.00 mmol) Ethylisothiocyanat **31a** zu und erwärmt den Ansatz unter Rühren über Nacht auf Raumtemperatur. Anschließend hydrolysiert man den Reaktionsansatz mit 20 ml Wasser, 20 ml ges. Ammoniumchlorid-Lösung und 20 ml ges. Natriumchlorid-Lösung und extrahiert dreimal mit je 75 ml Chloroform. Die vereinigten organischen Phasen werden über Natriumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Das Rohprodukt wird säulenchromatographisch mit Chloroform als Laufmittel gereinigt (R_f = 0.44). Bei dem Reinprodukt handelt es sich um ein Diastereomerengemisch.

Ausbeute: 0.40 g (1.23 mmol) 62 % d. Th.

Schmelzpunkt: 168.2 °C

$^1\text{H-NMR}$ (600 MHz, Chloroform- d): δ [ppm] = 0.95 (t, J = 7.4 Hz, 3H, $-\text{CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_3$), 1.33 (t, J = 7.3 Hz, 3H, $-\text{NH-CH}_2\text{-CH}_3$), 1.45 - 1.52 (m, 2H, $-\text{CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_3$), 1.54 (s, 3H, $-\text{CH}_3$), 1.88 - 2.01 (m, 2H, $-\text{CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_3$), 3.75 - 3.85 (m, 2H, $-\text{NH-CH}_2\text{-CH}_3$), 3.94 (d, J = 15.6 Hz, 1H, Ph- $\text{CH}_2\text{-S-}$), 4.13 (d, J = 15.6 Hz, 1H, Ph- $\text{CH}_2\text{-S-}$), 5.41 (s, 1H, Ph-CH-S-), 7.16 - 7.20 (m, 2H, Phenyl 4-H, Phenyl 6-H), 7.20 - 7.23 (m, 2H, Phenyl 3-H, Phenyl 5-H), 7.98 (br s, 1H, -NH).

$^{13}\text{C-NMR}$ (150 MHz, Chloroform- d): δ [ppm] = 12.9 ($-\text{NH-CH}_2\text{-CH}_3$), 14.1 ($-\text{CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_3$), 18.5 ($-\text{CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_3$), 28.0 ($-\text{CH}_3$), 33.5 (Ph- $\text{CH}_2\text{-S-}$), 41.5 ($-\text{NH-CH}_2\text{-CH}_3$), 44.2 ($-\text{CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_3$), 57.1 ($-\text{S-C-S-}$), 58.6 (Ph-CH-S-), 127.4 (Phenyl), 127.9 (Phenyl), 128.1 (Phenyl), 129.7 (Phenyl C-2), 137.7 (Phenyl C-1), 199.5 (C=S).

GC/MS (R_T = 12.95 min): m/z (%): 325 (5) $[\text{M}]^+$, 292 (17), 223 (11), 190 (20), 135 (100), 91 (11).

MS (HR-ESI): $\text{C}_{16}\text{H}_{23}\text{NS}_3$ (325.56 g/mol):

Berechnete Werte ($[\text{M}+\text{H}]^+$): 326.1065

Experimentell bestimmte ($[\text{M}+\text{H}]^+$): 326.1063

4.14.3.6 ***N*-Ethyl-1,5-dihydrospiro[2,4-benzodithiepin-3,1'-cyclooctan]-1-carbothioamid 111c**

In einem sekurierten 50 ml-Zweihalskolben mit Serumkappe und Abgang zur Stickstoff-Vakuum-Linie werden 0.56 g (2.00 mmol) 1,5-Dihydrospiro(2,4-benzodithiepin-3,1'-cyclooctan) **105d** in 15 ml abs. THF gelöst und mittels Trockeneis/Aceton-Bad auf -40 °C gekühlt. Bei dieser Temperatur werden langsam 1.5 ml (2.25 mmol) *n*-Butyllithium (1.6 mol/l in *n*-Hexan) zur obigen Lösung zugetropft, wobei die Innentemperatur -30 °C nicht übersteigen darf. Die Reaktionsmischung wird für 1 h bei -40 °C gerührt. Danach gibt man 0.17 ml (2.00 mmol) Ethylisothiocyanat **31a** zu und erwärmt den Ansatz unter Rühren über Nacht auf Raumtemperatur. Anschließend hydrolysiert man den Reaktionsansatz mit 20 ml Wasser und extrahiert dreimal mit je 75 ml Chloroform. Die vereinigten

organischen Phasen werden über Natriumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Das gewünschte Produkt kann in der Analytik nicht nachgewiesen werden.

4.14.3.7 **N-Ethyl-1,5-dihydrospiro[2,4-benzodithiepin-3,1'-cycloheptan]-1-carbothioamid 111d**

In einem sekurierten 50 ml-Zweihalskolben mit Serumkappe und Abgang zur Stickstoff-Vakuum-Linie werden 0.53 g (2.00 mmol) 1,5-Dihydrospiro(2,4-benzodithiepin-3,1'-cycloheptan) **105e** in 15 ml abs. THF gelöst und mittels Trockeneis/Aceton-Bad auf -40 °C gekühlt. Bei dieser Temperatur werden langsam 1.5 ml (2.25 mmol) *n*-Butyllithium (1.6 mol/l in *n*-Hexan) zur obigen Lösung zugetropft, wobei die Innentemperatur -30 °C nicht übersteigen darf. Die Reaktionsmischung wird für 1 h bei -40 °C gerührt. Danach gibt man 0.17 ml (2.00 mmol) Ethylisothiocyanat **31a** zu und erwärmt den Ansatz unter Rühren über Nacht auf Raumtemperatur. Anschließend hydrolysiert man den Reaktionsansatz mit 20 ml Wasser und extrahiert dreimal mit je 75 ml Chloroform. Die vereinigten organischen Phasen werden über Natriumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Das Rohprodukt wird zunächst aus *n*-Hexan umkristallisiert und anschließend säulenchromatographisch mit Chloroform als Laufmittel gereinigt ($R_f = 0.55$). Man erhält ein braunes Wachs.

Ausbeute: 50 mg (0.14 mmol) 7 % d. Th.

$^1\text{H-NMR}$ (600 MHz, d_6 -Dimethylsulfoxid): δ [ppm] = 0.81 - 0.91 (m, 1H, Cycloheptyl), 1.23 - 1.27 (s, 2H, Cycloheptyl), 1.32 (t, $J = 7.3$ Hz, 3H, -NH-CH₂-CH₃), 1.60 - 1.69 (m, 5H, Cycloheptyl), 1.92 - 2.02 (m, 2H, Cycloheptyl), 2.12 - 2.22 (m, 2H, Cycloheptyl), 2.24 - 2.30 (m, 1H, Cycloheptyl), 3.74 - 3.84 (m, 2H, -NH-CH₂-CH₃), 4.04 (br s, 2H, Ph-CH₂-S-), 5.44 (s, 1H, Ph-CH-S-), 7.14 - 7.21 (m, 4H, Phenyl), 7.76 (br s, 1H, -NH).

^{13}C -NMR (150 MHz, d_6 -Dimethylsulfoxid): δ [ppm] = 12.9 (-NH-CH₂-CH₃), 23.4 (Cycloheptyl), 29.7 (Cycloheptyl), 29.8 (Cycloheptyl), 29.9 (Cycloheptyl), 34.0 (Cycloheptyl), 40.6 (Cycloheptyl), 41.5 (Cycloheptyl), 127.7 (Phenyl), 127.9 (Phenyl), 130.0 (Phenyl C-2), 138.3 (Phenyl C-1), 199.5 (C=S).

MS (EI, 70 eV): m/z (%): 351 (9) [M]⁺, 318 (22), 223 (23), 190 (26), 178 (9), 135 (100).

MS (HR-ESI): C₁₈H₂₅NS₃ (351.59 g/mol):

Berechnete Werte ([M-H]⁺): 350.1065

Experimentell bestimmte ([M-H]⁺): 350.1068

4.14.3.8 **N-Methyl-1,5-dihydrospiro[2,4-benzodithiepin-3,1'-cyclohexan]-5-carbothioamid 111e**

In einem sekurierten 50 ml-Zweihalskolben mit Serumkappe und Abgang zur Stickstoff-/Vakuuminlinie werden 0.50 g (2.0 mmol) 1,5-Dihydrospiro(2,4-benzodithiepin-3,1'-cyclohexan) **105f** in 15 ml abs. THF gelöst und mittels Trockeneis/Aceton-Bad auf -40 °C gekühlt. Bei dieser Temperatur werden langsam 1.3 ml (2.0 mmol) n-Butyllithium (1.6 mol/l in n-Hexan) zur obigen Lösung zugetropft, wobei die Innentemperatur -30 °C nicht übersteigen darf. Die Reaktionsmischung wird für eine Stunde bei -40 °C gerührt. Danach gibt man 0.15 g (2.0 mmol) Methylisothiocyanat **31k** zu, erwärmt den Ansatz unter Rühren über Nacht auf Raumtemperatur und rührt weitere drei Tage. Anschließend hydrolysiert man den Reaktionsansatz mit 20 ml Wasser und extrahiert dreimal mit je 75 ml Chloroform. Die vereinigten organischen Phasen werden über Natriumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Das gewünschte Produkt kann in der Analytik nicht nachgewiesen werden.

4.14.3.9 **N-Ethyl-1,5-dihydrospiro[2,4-benzodithiepin-3,1'-cyclohexan]-5-carbothioamid 111f**

In einem sekurierten 50 ml-Zweihalskolben mit Serumkappe und Abgang zur Stickstoff-Vakuum-Linie werden 0.50 g (2.00 mmol) 1,5-Dihydrospiro(2,4-benzodithiepin-3,1'-cyclohexan) **105f** in 15 ml abs. THF gelöst und mittels Flüssigstickstoff/*n*-Pentan-Bad auf -100 °C gekühlt. Bei dieser Temperatur werden langsam 1.3 ml (2.00 mmol) *n*-Butyllithium (1.6 mol/l in *n*-Hexan) zur obigen Lösung zugetropft, wobei die Innentemperatur -90 °C nicht übersteigen darf. Die Reaktionsmischung wird für 1 h bei -100 °C gerührt. Danach gibt man 0.17 g (2.00 mmol) Ethylisothiocyanat **31a** zu und erwärmt den Ansatz unter Rühren über Nacht auf Raumtemperatur. Anschließend hydrolysiert man den Reaktionsansatz mit 20 ml Wasser und extrahiert dreimal mit je 75 ml Chloroform. Die vereinigten organischen Phasen werden über Natriumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Das gewünschte Produkt kann in der Analytik nicht nachgewiesen werden.

In einem sekurierten 50 ml-Zweihalskolben mit Serumkappe und Abgang zur Stickstoff-Vakuum-Linie werden 0.50 g (2.00 mmol) 1,5-Dihydrospiro(2,4-benzodithiepin-3,1'-cyclohexan) **105f** in 15 ml abs. THF gelöst und mittels Trockeneis/Aceton-Bad auf -40 °C gekühlt. Bei dieser Temperatur werden langsam 1.3 ml (2.00 mmol) *n*-Butyllithium (1.6 mol/l in *n*-Hexan) zur obigen Lösung zugetropft, wobei die Innentemperatur -30 °C nicht übersteigen darf. Die Reaktionsmischung wird für 1 h bei -40 °C gerührt. Danach gibt man 0.18 ml (2.00 mmol) Ethylisothiocyanat **31a** zu, erwärmt den Ansatz unter Rühren über Nacht auf Raumtemperatur und rührt weitere drei Tage. Anschließend hydrolysiert man den Reaktionsansatz mit 20 ml Wasser und extrahiert dreimal mit je 75 ml Chloroform. Die vereinigten organischen Phasen werden über Natriumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Das Rohprodukt wird säulenchromatographisch mit Chloroform als Laufmittel gereinigt ($R_f = 0.63$).

Ausbeute: 0.17 g (0.50 mmol) 46 % d. Th.

Schmelzpunkt: 167.2 °C

¹H-NMR (300 MHz, Chloroform-d): δ [ppm] = 1.33 (t, *J* = 7.3 Hz, 3H, -NH-CH₂-CH₃), 1.47 (dd, *J* = 11.5 Hz, *J* = 5.7 Hz, 2H, Cyclohexyl), 1.66 (dt, *J* = 11.4 Hz, *J* = 5.8 Hz, 4H, Cyclohexyl), 1.87 - 1.93 (m, 2H, Cyclohexyl), 2.04 - 2.11 (m, 2H, Cyclohexyl), 3.74 - 3.85 (m, 2H, Ph-CH₂-S-), 4.06 (q, *J* = 15.6 Hz, 2H, -NH-CH₂-CH₃), 5.46 (s, 1H, Ph-CH-S-), 7.14 - 7.23 (m, 4H, Phenyl), 7.94 (br s, 1H, -NH).

¹³C-NMR (75 MHz, Chloroform-d): δ [ppm] = 12.9 (-NH-CH₂-CH₃), 22.7 (Cyclohexyl C-3, Cyclohexyl C-5), 25.5 (Cyclohexyl C-4), 33.0 (Ph-CH₂-S-), 39.3 (-NH-CH₂-CH₃), 41.5 (Cyclohexyl C-2, Cyclohexyl C-6), 57.1 (-S-C-S-), 60.3 (Ph-CH-S-), 127.8 (Phenyl), 128.0 (Phenyl), 129.8 (Phenyl), 138.3 (Phenyl), 199.9 (C=S).

GC/MS (R_T = 16.04 min): m/z (%): 337 (5) [M]⁺, 304 (30), 223 (9), 190 (20), 135 (100), 115 (9), 91 (14), 81 (14).

4.14.3.10 *N*-tert.-Butyl-1,5-dihydrospiro[2,4-benzodithiepin-3,1'-cyclohexan]-5-carbothioamid **111g**

In einem sekurierten 50 ml-Zweihalskolben mit Serumkappe und Abgang zur Stickstoff-Vakuum-Linie werden 0.50 g (2.00 mmol) 1,5-Dihydrospiro(2,4-benzodithiepin-3,1'-cyclohexan) **105f** in 15 ml abs. THF gelöst und mittels Trockeneis/Aceton-Bad auf -40 °C gekühlt. Bei dieser Temperatur werden langsam 1.3 ml (2.00 mmol) *n*-Butyllithium (1.6 mol/l in *n*-Hexan) zur obigen Lösung zugetropft, wobei die Innentemperatur -30 °C nicht übersteigen darf. Die Reaktionsmischung wird für 1 h bei -40 °C gerührt. Danach gibt man 0.23 g (2.00 mmol) *tert.*-Butylisothiocyanat **31d** zu, erwärmt den Ansatz unter Rühren über Nacht auf Raumtemperatur und rührt weitere 3 d. Anschließend hydrolysiert man den Reaktionsansatz mit 20 ml Wasser und extrahiert dreimal mit je 75 ml Chloroform. Die vereinigten organischen Phasen werden über Natriumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Das gewünschte Produkt kann in der

Analytik nicht nachgewiesen werden. Der Austausch von abs. THF gegen abs. Diethylether führt ebenfalls nicht zum Produkt.

4.14.3.11 4'-*tert.*-Butyl-*N*-ethyl-1,5-dihydrospiro[2,4-benzodithiepin-3,1'-cyclohexan]-1-carbothioamid 111h

In einem sekurierten 50 ml-Zweihalskolben mit Serumkappe und Abgang zur Stickstoff-Vakuum-Linie werden 0.61 g (2.00 mmol) 4'-*tert.*-Butyl-1,5-dihydrospiro(2,4-benzodithiepin-3,1'-cyclohexan) **105g** in 15 ml abs. THF gelöst und mittels Trockeneis/Aceton-Bad auf -40 °C gekühlt. Bei dieser Temperatur werden langsam 1.5 ml (2.25 mmol) *n*-Butyllithium (1.6 mol/l in *n*-Hexan) zur obigen Lösung zugetropft, wobei die Innentemperatur -30 °C nicht übersteigen darf. Die Reaktionsmischung wird für 1 h bei -40 °C gerührt. Danach gibt man 0.17 ml (2.00 mmol) Ethylisothiocyanat **31a** zu und erwärmt den Ansatz unter Rühren über Nacht auf Raumtemperatur. Anschließend hydrolysiert man den Reaktionsansatz mit 20 ml Wasser und extrahiert dreimal mit je 75 ml Chloroform. Die vereinigten organischen Phasen werden über Natriumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Das Rohprodukt wird säulenchromatographisch mit Chloroform als Laufmittel gereinigt ($R_f = 0.54$), anschließend aus *n*-Hexan umkristallisiert und zwei Wochen bei -20 °C rekristallisiert.

Ausbeute: 210 mg (0.53 mmol) 27 % d. Th.

Schmelzpunkt: 196.4 °C

$^1\text{H-NMR}$ (600 MHz, d_6 -Dimethylsulfoxid): δ [ppm] = 0.87 (s, 9H, $-\text{C}(\text{CH}_3)_3$), 1.06 (tt, $J = 12.1$ Hz, $J = 3.4$ Hz, 1H, Cyclohexyl 4-H), 1.34 (t, $J = 7.3$ Hz, 3H, $-\text{NH}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$), 1.42 - 1.53 (m, 2H, Cyclohexyl 3-H, Cyclohexyl 5-H), 1.59 - 1.66 (m, 2H, Cyclohexyl 3-H, Cyclohexyl 5-H), 1.66 - 1.77 (m, 2H, Cyclohexyl 2-H, Cyclohexyl 6-H), 2.10 - 2.15 (m, 1H, Cyclohexyl), 2.40 - 2.48 (m, 1H, Cyclohexyl), 3.74 - 3.88 (m, 2H, $-\text{NH}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$), 3.99 (d, $J = 15.3$ Hz, 1H, $\text{Ph}-\text{CH}_2-\text{S}-$), 4.24 (d, $J = 15.4$ Hz, 1H, $\text{Ph}-\text{CH}_2-\text{S}-$), 5.38 (s, 1H, $\text{Ph}-\text{CH}-\text{S}-$), 7.15 - 7.22 (m, 4H, Phenyl), 8.15 (br s, 1H, $-\text{NH}$).

^{13}C -NMR (150 MHz, d_6 -Dimethylsulfoxid): δ [ppm] = 12.9 (-NH-CH₂-CH₃), 23.7 (Cyclohexyl C-3, Cyclohexyl C-5), 27.4 (-C(CH₃)₃), 32.4 (Ph-CH₂-S-), 33.1 (-C(CH₃)₃), 39.0 (Cyclohexyl C-2, Cyclohexyl C-6), 39.7 (-NH-CH₂-CH₃), 41.5 (Cyclohexyl C-4), 47.5 (Ph-CH-S-), 60.0 (-S-C-S-), 127.8 (Phenyl), 128.0 (Phenyl), 129.7 (Phenyl C-2), 138.0 (Phenyl C-1), 199.5 (C=S).

GC/MS (R_T = 21.80 min): m/z (%): 393 (6) [M]⁺, 360 (29), 223 (16), 191 (33), 178 (9), 135 (100), 104 (11), 57 (14).

MS (HR-ESI): C₂₁H₃₁NS₃ (393.67 g/mol):

Berechnete Werte ([M+H]⁺): 394.1691

Experimentell bestimmte ([M+H]⁺): 394.1694

4.14.3.12 N-Ethyl-1,5-dihydrospiro[2,4-benzodithiepin-3,4'-oxan]-1-carbothioamid 111i

In einem sekurierten 50 ml-Zweihalskolben mit Serumkappe und Abgang zur Stickstoff-Vakuum-Linie werden 0.50 g (2.00 mmol) 1,5-Dihydrospiro(2,4-benzodithiepin-3,4'-oxan) **105i** in 15 ml abs. THF gelöst und mittels Trockeneis/Aceton-Bad auf -40 °C gekühlt. Bei dieser Temperatur werden langsam 1.5 ml (2.25 mmol) *n*-Butyllithium (1.6 mol/l in *n*-Hexan) zur obigen Lösung zugetropft, wobei die Innentemperatur -30 °C nicht übersteigen darf. Die Reaktionsmischung wird für 1 h bei -40 °C gerührt. Danach gibt man 0.17 g (2.00 mmol) Ethylisothiocyanat **31a** zu und erwärmt den Ansatz unter Rühren über Nacht auf Raumtemperatur. Anschließend hydrolysiert man den Reaktionsansatz mit 20 ml Wasser und extrahiert dreimal mit je 75 ml Chloroform. Die vereinigten organischen Phasen werden über Natriumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Das Rohprodukt wird säulenchromatographisch mit einem 1:1-Gemisch aus Ethylacetat und *n*-Hexan gereinigt, anschließend aus Ethanol umkristallisiert (Rekristallisation bei -20 °C) und im Ölpumpenvakuum getrocknet.

Ausbeute: 150 mg (0.44 mmol) 22 % d. Th.

Schmelzpunkt: 182.9 °C

¹H-NMR (500 MHz, Chloroform-d): δ [ppm] = 1.32 (t, J = 7.3 Hz, 3H, -NH-CH₂-CH₃), 1.92 - 2.06 (m, 2H, Oxan 2-H, Oxan 6-H), 2.07 - 2.21 (m, 2H, Oxan 2-H, Oxan 6-H), 3.74 - 3.84 (m, 6H, Oxan 3-H, Oxan 5-H, -NH-CH₂-CH₃), 4.03 - 4.14 (m, 2H, Ph-CH₂-S-), 5.49 (s, 1H, Ph-CH-S-), 7.17 - 7.25 (Phenyl), 8.01 (br s, 1H, -NH).

¹³C-NMR (125 MHz, Chloroform-d): δ [ppm] = 12.9 (-NH-CH₂-CH₃), 32.9 (Ph-CH₂-S-), 39.4 (Oxan C-2, Oxan C-6), 41.5 (-NH-CH₂-CH₃), 57.0 (-S-C-S-), 63.4 (Ph-CH-S-), 64.2 (Oxan C-3, Oxan C-5), 128.0 (Phenyl), 128.3 (Phenyl), 129.9 (Phenyl C-2), 137.9 (Phenyl C-1), 199.4 (C=S).

MS (EI, 70 eV): m/z (%): 339 (6) [M]⁺, 306 (55), 223 (13), 190 (23), 167 (11), 148 (21), 135 (100), 91 (11), 85 (10), 71 (13), 57 (15).

Elementaranalyse: C₁₆H₂₁NOS₃ (339.54 g/mol)

Berechnete Werte: %C 56.60, %H 6.23, %N 4.13

Experimentell bestimmte Werte: %C 57.74, %H 6.30, %N 4.10

4.14.3.13 **N-Ethyl-1,5-dihydrospiro[2,4-benzodithiepin-3,1'-cyclobutan]-5-carbothioamid 111j**

In einem sekurierten 50 ml-Zweihalskolben mit Serumkappe und Abgang zur Stickstoff-Vakuum-Linie werden 0.50 g (2.25 mmol) 1,5-Dihydrospiro(2,4-benzodithiepin-3,1'-cyclobutan) **105j** in 15 ml abs. THF gelöst und mittels Trockeneis/Aceton-Bad auf -40 °C gekühlt. Bei dieser Temperatur werden langsam 1.5 ml (2.25 mmol) *n*-Butyllithium (1.6 mol/l in *n*-Hexan) zur obigen Lösung zugetropft, wobei die Innentemperatur -30 °C nicht übersteigen darf. Die Reaktionsmischung wird für 1 h bei -40 °C gerührt. Danach gibt man 0.22 ml (2.25 mmol) Ethylisothiocyanat **31a** zu, erwärmt den Ansatz unter Rühren über Nacht auf Raumtemperatur und rührt weitere 2 d. Anschließend hydrolysiert man den

Reaktionsansatz mit 20 ml Wasser und extrahiert dreimal mit je 75 ml Chloroform. Die vereinigten organischen Phasen werden über Natriumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Das Rohprodukt wird säulenchromatographisch mit Chloroform als Laufmittel gereinigt ($R_f = 0.54$).

Ausbeute: 0.14 g (0.45 mmol) 20 % d. Th.

Schmelzpunkt: 143.9 °C

$^1\text{H-NMR}$ (500 MHz, Chloroform- d): δ [ppm] = 1.37 (t, $J = 7.3$ Hz, 3H, -NH-CH₂-CH₃), 1.96 - 2.28 (m, 6H, Cyclobutyl), 3.75 - 3.90 (m, 2H, -NH-CH₂-CH₃), 3.90 - 4.02 (m, 2H, Ph-CH₂-S-), 5.40 (s, 1H, Ph-CH-S-), 7.22 - 7.31 (m, 4H, Phenyl), 8.97 (br s, 1H, -NH).

GC/MS ($R_T = 12.94$ min): m/z (%): 309 (8) $[\text{M}]^+$, 276 (85), 191 (41), 176 (13), 158 (13), 147 (11), 135 (100), 115 (11), 91 (13).

Elementaranalyse: C₁₅H₁₉NS₃ (309.51 g/mol)

Berechnete Werte: %C 58.21, %H 6.19, %N 4.53

Experimentell bestimmte Werte: %C 57.18, %H 6.29, %N 5.03

4.14.3.14 ***N*-Ethyl-4',6'-dioxo-11',13'-dithiaspiro[cyclohexan-1,12'-tricyclo[7.5.0.0^{3,7}]tetradecan]-1'(9'),2',7'-trien-10'-carbothioamid 111k**

In einem sekurierten 100 ml-Zweihalskolben mit Serumkappe und Abgang zur Stickstoff-/Vakuuminlinie werden 0.74 g (1.51 mmol) 4',6'-Dioxa-11',13'-dithiaspiro(cyclohexan-1,12'-tricyclo[7.5.0.0^{3,7}]tetradecan)-1'(9'),2',7'-trien **105m** in 20 ml abs. THF gelöst und mittels Trockeneis/Aceton-Bad auf -40 °C gekühlt. Bei dieser Temperatur werden langsam 6.3 ml (10.0 mmol) *n*-Butyllithium (1.6 mol/l in *n*-Hexan) zur obigen Lösung zugetropft, wobei die Innentemperatur -30 °C nicht übersteigen darf. Die Reaktionsmischung wird für 1 h bei -40 °C gerührt. Danach gibt man 0.87 g (10.0 mmol) Ethylisothiocyanat **31a** zu und erwärmt den Ansatz unter

Rühren über Nacht auf Raumtemperatur. Anschließend hydrolysiert man den Reaktionsansatz mit 20 ml Wasser und extrahiert dreimal mit je 75 ml Chloroform. Die vereinigten organischen Phasen werden über Natriumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Das gewünschte Produkt wird nur marginal gebildet.

GC/MS ($R_T = 14.77$ min): m/z (%): 381 (10) $[M]^+$, 293 (100), 260 (40), 234 (16), 221 (28), 203 (16), 161 (12), 149 (13).

4.14.3.15 N-Ethyl-2-oxo-3,5-dihydro-1H-2,4-benzodithiepin-3-carbothioamid 112

In einem sekurierten 50 ml-Zweihalskolben mit Abgang zur Stickstoff-Vakuum-Linie werden 0.11 g (0.55 mmol) 3,5-Dihydro-1H-2 λ^4 ,4-benzodithiepin-2-on **107** in 20 ml abs. THF gelöst, auf -78 °C gekühlt und 0.38 ml (0.60 mmol) *n*-Butyllithium (1.6 mol/l in *n*-Hexan) zugetropft. Man rührt 1 h bei -78 °C, gibt 0.05 ml Ethylisothiocyanat **31a** hinzu und lässt über Nacht auf Raumtemperatur erwärmen. Man hydrolysiert die Reaktionsmischung mit 5 ml Wasser, extrahiert die wässrige Phase dreimal mit je 20 ml Chloroform, trocknet die vereinigten organischen Phasen über Natriumsulfat und entfernt das Lösemittel am Rotationsverdampfer. Das gewünschte Produkt kann in der Analytik nicht nachgewiesen werden.

4.14.3.16 N-Ethyl-3,3-dimethyl-2-oxo-3,5-dihydro-1H-2 λ^4 ,4-benzodithiepin-1-carbothioamid 113a

In einem sekurierten 100 ml-Zweihalskolben mit Serumkappe und Abgang zur Stickstoff-Vakuum-Linie werden 0.29 g (2.87 mmol) Diisopropylamin in 10 ml abs. THF gelöst und mittels eines Trockeneis/Aceton-Bads auf -78 °C gekühlt. Dazu werden langsam 1.82 ml (2.87 mmol) *n*-Butyllithium (1.6 mol/l in *n*-Hexan) getropft und 30 min ohne Kühlung gerührt (max. 0 °C). Danach wird die Lösung wieder

auf $-78\text{ }^{\circ}\text{C}$ gekühlt und dazu eine auf dieselbe Temperatur gebrachte Lösung aus 0.59 g (2.61 mmol) 3,3-Dimethyl-3,5-dihydro-1*H*-2λ⁴,4-benzodithiepin-2-on **108a** in 10 ml abs. THF gegeben. Nach 30 min Rühren bei $-78\text{ }^{\circ}\text{C}$ werden 0.23 g (2.61 mmol) Ethylisothiocyanat **31a** zugegeben und der Ansatz über Nacht auf Raumtemperatur erwärmt. Man hydrolysiert den Reaktionsansatz mit 10 ml Wasser, extrahiert dreimal mit je 50 ml Chloroform, trocknet die vereinigten organischen Phasen über Natriumsulfat und entfernt das Lösemittel am Rotationsverdampfer. Das Rohprodukt wird aus Ethanol umkristallisiert und rekristallisiert in violetten Nadeln.

Ausbeute: 220 mg (0.70 mmol) 27 % d. Th.

Schmelzpunkt: $199.7\text{ }^{\circ}\text{C}$

¹H-NMR (500 MHz, d₆-Dimethylsulfoxid): δ [ppm] = 1.12 (d, $J = 7.3\text{ Hz}$, 3H, -NH-CH₂-CH₃), 1.27 (s, 3H, -CH₃), 1.65 (s, 3H, -CH₃), 3.49 - 3.59 (m, 2H, -NH-CH₂-CH₃), 3.64 (d, $J = 15.6\text{ Hz}$, 1H, Ph-CH₂-S-), 4.26 (d, $J = 15.5\text{ Hz}$, 1H, Ph-CH₂-S-), 5.57 (s, 1H, Ph-CH-S-), 7.19 - 7.29 (m, 3H, Phenyl), 7.57 - 7.60 (m, 1H, Phenyl 6-H), 10.23 (br s, 1H, -NH).

¹³C-NMR (125 MHz, d₆-Dimethylsulfoxid): δ [ppm] = 12.3 (-NH-CH₂-CH₃), 21.9 (-CH₃), 26.7 (Ph-CH₂-S-), 31.2 (-NH-CH₂-CH₃), 64.5 (Ph-CH-S-), 66.7 (-S-C-S-), 126.7 (Phenyl C-5), 128.1 (Phenyl C-4), 128.3 (Phenyl C-6), 129.1 (Phenyl C-3), 129.8 (Phenyl C-2), 139.9 (Phenyl C-1), 197.0 (C=S).

MS (EI, 70 eV): m/z (%): 313 (3) [M]⁺, 232 (13), 223 (44), 191 (100), 177 (20), 147 (13), 135 (74), 115 (12), 91 (10).

Elementaranalyse: C₁₄H₁₉NOS₃ (313.50 g/mol)

Berechnete Werte: %C 53.64, %H 6.11, %N 4.47

Experimentell bestimmte Werte: %C 53.59, %H 5.87, %N 4.54

4.14.3.17 *N*-Ethyl-2-oxo-1,5-dihydrospiro[2 λ ⁴,4-benzodithiepin-3,1'-cyclohexan]-1-carbothioamid **113b**

In einem sekurierten 100 ml-Zweihalskolben mit Serumkappe und Abgang zur Stickstoff-Vakuum-Linie werden 0.75 g (7.39 mmol) Diisopropylamin in 20 ml abs. THF gelöst und mittels eines Trockeneis/Aceton-Bads auf -78 °C gekühlt. Dazu werden langsam 4.7 ml (7.39 mmol) *n*-Butyllithium getropft und 30 min ohne Kühlung gerührt (max. 0 °C). Danach wird die Lösung wieder auf -78 °C gekühlt und dazu eine auf dieselbe Temperatur gebrachte Lösung aus 1.79 g (6.72 mmol) 1,5-Dihydrospiro-(2,4-benzodithiepin-3,1'-cyclohexan)-4-on **108b** in 20 ml abs. THF gegeben. Nach 30 min Rühren bei -78 °C werden 0.59 g (6.72 mmol) Ethylisothiocyanat **31a** zugegeben und der Ansatz über Nacht auf Raumtemperatur erwärmt. Man hydrolysiert den Reaktionsansatz mit 20 ml Wasser, extrahiert dreimal mit je 100 ml Chloroform, trocknet die vereinigten organischen Phasen über Natriumsulfat und entfernt das Lösemittel am Rotationsverdampfer. Das Rohprodukt wird aus Ethylacetat umkristallisiert.

Ausbeute: 1.19 g (3.37 mmol) 50 % d. Th.

Schmelzpunkt: 177.8 °C (Grünfärbung beim Schmelzen)

¹H-NMR (500 MHz, d₆-Dimethylsulfoxid): δ [ppm] = 1.12 (t, J = 7.3 Hz, 3H, -NH-CH₂-CH₃), 1.22 - 1.93 (m, 10H, Cyclohexyl), 3.50 - 3.58 (m, 2H, -NH-CH₂-CH₃), 3.61 (d, J = 15.6 Hz, 1H, Ph-CH₂-S-), 4.19 (d, J = 15.5 Hz, 1H, Ph-CH₂-S-), 5.62 (s, 1H, Ph-CH-S-), 7.18 - 7.27 (m, 3H, Phenyl 4-H, Phenyl 5-H, Phenyl 6-H), 7.57 - 7.61 (m, 1H, Phenyl 3-H), 10.22 (br s, 1H, -NH).

¹³C-NMR (125 MHz, d₆-Dimethylsulfoxid): δ [ppm] = 12.3 (-NH-CH₂-CH₃), 20.2 (Cyclohexyl), 20.5 (Cyclohexyl), 24.6 (Cyclohexyl), 28.0 (Ph-CH₂-S-), 29.9 (Cyclohexyl), 35.4 (-NH-CH₂-CH₃), 66.3 (-S-C-S-), 69.6 (Ph-CH-S-), 126.6 (Phenyl), 128.1 (Phenyl), 129.2 (Phenyl), 130.0 (Phenyl C-2), 140.2 (Phenyl C-1), 197.0 (C=S).

MS (EI, 70 eV): m/z (%): 353 (3) [M]⁺, 302 (22), 222 (24), 191 (100), 135 (64), 115 (15).

MS (ESI-HR): C₁₇H₂₃NOS₃Na⁺ Berechneter Wert: 376.08306

Gefundener Wert: 376.08340

Elementaranalyse: C₁₇H₂₃NOS₃ (353.57 g/mol)

Berechnete Werte: %C 57.75, %H 6.56, %N 3.96

Experimentell bestimmte Werte: %C 56.69, %H 6.89, %N 4.64

4.14.3.18 **N-Ethyl-2-oxo-1,5-dihydrospiro[2λ⁴,4-benzodithiepin-3,1'-cyclobutan]-5-carbothioamid 113c**

In einem sekurierten 100 ml-Zweihalskolben mit Serumkappe und Abgang zur Stickstoff-Vakuum-Linie werden 0.22 g (2.21 mmol) Diisopropylamin in 10 ml abs. THF gelöst und mittels eines Trockeneis-/Aceton-Bads auf -78 °C gekühlt. Dazu werden langsam 1.4 ml (2.21 mmol) *n*-Butyllithium (1.6 mol/l in *n*-Hexan) getropft und 30 min ohne Kühlung gerührt (max. 0 °C). Danach wird die Lösung wieder auf -78 °C gekühlt und dazu eine auf dieselbe Temperatur gebrachte Lösung aus 0.48 g (2.01 mmol) 1,5-Dihydrospiro(2,4-benzodithiepin-3,1'-cyclobutan)-4-on **108d** in 20 ml abs. THF gegeben. Nach 30 min Rühren bei -78 °C werden 0.18 g (2.01 mmol) Ethylisothiocyanat **31a** zugegeben und der Ansatz über Nacht auf Raumtemperatur erwärmt. Man hydrolysiert den Reaktionsansatz mit 20 ml Wasser, extrahiert dreimal mit je 50 ml Chloroform, trocknet die vereinigten organischen Phasen über Natriumsulfat und entfernt das Lösemittel am Rotationsverdampfer. Das gewünschte Produkt kann in der Analytik nicht nachgewiesen werden.

4.14.4 Synthese der Amide mit Benzodithiepin-Struktur

4.14.4.1 *N*-tert.-Butyl-3,5-dihydro-1*H*-2,4-benzodithiepin-3-carboxamid **114**

In einem 100 ml-Einhalskolben mit Abgang zur Stickstoff-Vakuum-Linie werden 0.50 g (2.75 mmol) 1,5-Dihydrobenzodithiepin **103** in 10 ml abs. THF gelöst, auf -60 °C gekühlt und 2.1 ml (3.30 mmol) *n*-Butyllithium (1.6 mol/l in *n*-Hexan) zugegeben. Man rührt 2 h bei -40 °C (Lösung wird rot) und kühlt anschließend auf -60 °C. Danach gibt man 0.32 g (2.75 mmol) *tert.*-Butylisocyanat **31d** zu, rührt weitere 3 h bei -60 °C und erwärmt über Nacht auf Raumtemperatur. Die Reaktionsmischung wird mit 10 ml dest. Wasser hydrolysiert, dreimal mit je 30 ml Chloroform extrahiert, die organischen Phasen über Natriumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Das gewünschte Produkt kann in der Analytik nicht nachgewiesen werden.

4.15 Versuche zur Synthese der Isothiochromanon-Derivate

4.15.1 Allgemeine Arbeitsvorschrift für die Synthese der Benzylsulfanylcarbonsäuren

In einem 100 ml-Zweihalskolben mit Rückflusskühler werden 4.49 g (80.0 mmol) Kaliumhydroxid in 40 ml Ethanol gelöst und mit 80.0 mmol des entsprechenden Thiols versetzt. Anschließend gibt man 40.0 mmol der entsprechenden 2-Bromcarbonsäure hinzu und erhitzt die Reaktionsmischung für 1 h zum Rückfluss. Das Lösemittel wird am Rotationsverdampfer entfernt, der Rückstand in Diethylether gelöst und mit 50 ml ges. Natriumhydrogencarbonat-Lösung extrahiert. Die wässrige Phase wird im Anschluss mit 50 ml Diethylether gewaschen, mit konz. Salzsäure auf pH 4 gebracht und dreimal mit je 50 ml Diethylether extrahiert. Die vereinten

organischen Extrakte aus dem letzten Arbeitsschritt werden danach am Rotationsverdampfer vom Lösemittel befreit.

Ausgehend von dieser allgemeinen Arbeitsvorschrift wurden die folgenden Produkte erhalten und charakterisiert:

4.15.1.1 2-(Benzylsulfanyl)propansäure **117a**

Gemäß der allgemeinen Arbeitsvorschrift werden 9.94 g (80.0 mmol) Benzylthiol **115** und 6.12 g (40.0 mmol) 2-Brompropansäure **116a** eingesetzt. Es ist keine Reinigung nötig.

Ausbeute: 6.74 g (34.3 mmol) 86 % d. Th.

$^1\text{H-NMR}$ (300 MHz, Chloroform- d): δ [ppm] = 1.34 (d, J = 7.2 Hz, 3H, $-\text{CH}_3$), 3.22 (q, J = 7.2 Hz, 1H, $-\text{S-CH-}$), 3.77 (d, J = 13.4 Hz, 1H, $\text{Ph-CH}_2\text{-S-}$), 3.89 (d, J = 13.4 Hz, 1H, $\text{Ph-CH}_2\text{-S-}$), 7.16 - 7.25 (m, 2H, Phenyl 3-H, Phenyl 5-H), 7.26 - 7.33 (m, 3H, Phenyl 2-H, Phenyl 4-H, Phenyl 6-H), 10.67 (br s, 1H, $-\text{COOH}$).

GC/MS (R_T = 7.76 min): m/z (%): 196 (11) $[\text{M}]^+$, 123 (85), 91 (100), 65 (8).

4.15.1.2 2-(Benzylsulfanyl)butansäure **117b**

Gemäß der allgemeinen Arbeitsvorschrift werden 9.94 g (80.0 mmol) Benzylthiol **115** und 6.68 g (40.0 mmol) 2-Brombutansäure **116b** eingesetzt. Das Rohprodukt wird wie zuvor beschrieben isoliert.

Ausbeute: 6.48 g (30.8 mmol) 77 % d. Th.

Alternativ werden 75.0 mmol 2-Brombutansäure **116b** eingesetzt. In diesem Fall besitzt das Rohprodukt bereits eine hohe Reinheit und es bedarf keiner weiteren Reinigung.

Ausbeute: 8.10 g (38.5 mmol) 51 % d. Th.

$^1\text{H-NMR}$ (600 MHz, Chloroform-d): δ [ppm] = 0.90 (t, J = 7.4 Hz, 3H, $-\text{CH}_2\text{-CH}_3$), 1.57 - 1.64 (m, 1H, $-\text{CH}_2\text{-CH}_3$), 1.78 - 1.86 (m, 1H, $-\text{CH}_2\text{-CH}_3$), 3.01 (dd, J = 7.8 Hz, J = 7.1 Hz, 1H, $-\text{S-CH-}$), 3.77 (d, J = 13.4 Hz, 1H, Ph- $\text{CH}_2\text{-S-}$), 3.83 (d, J = 13.4 Hz, 1H, Ph- $\text{CH}_2\text{-S-}$), 7.17 - 7.21 (m, 1H, Phenyl 4-H), 7.24 - 7.28 (m, 2H, Phenyl 3-H, Phenyl 5-H), 7.28 - 7.32 (m, 2H, Phenyl 2-H, Phenyl 6-H), 10.87 (br s, 1H, $-\text{COOH}$).

$^{13}\text{C-NMR}$ (150 MHz, Chloroform-d): δ [ppm] = 11.7 ($-\text{CH}_2\text{-CH}_3$), 24.1 ($-\text{CH}_2\text{-CH}_3$), 36.0 (Ph- $\text{CH}_2\text{-S-}$), 47.2 ($-\text{S-CH-}$), 127.2 (Phenyl C-4), 128.5 (Phenyl C-2, Phenyl C-6), 129.1 (Phenyl C-3, Phenyl C-5), 137.3 (Phenyl C-1), 179.2 ($-\text{COOH}$).

GC/MS (R_T = 8.19 min): m/z (%): 210 (10) $[\text{M}]^+$, 123 (100), 91 (96), 65 (8).

4.15.1.3 2-(Benzylsulfanyl)pentansäure 117c

Gemäß der allgemeinen Arbeitsvorschrift werden 9.94 g (80.0 mmol) Benzylthiol **115** und 7.24 g (40.0 mmol) 2-Brompentansäure **116c** eingesetzt. Die Trennung des Produktes vom Nebenprodukt gelingt nicht.

Rohprodukt: 7.85 g (ca. 70 %ig lt. GC/MS)

GC/MS (R_T = 8.66 min): m/z (%): 246 (13) $[\text{M}]^+$, 181 (6), 91 (100), 65 (6).

4.15.1.4 3,5-Dimethoxytoluol 120

In einem sekurierten 1 l-Einhalskolben mit Tropftrichter, Rückflusskühler, Claisen-Aufsatz und Abgang zur Stickstoff-Vakuum-Linie werden 12.4 g (100 mmol) 3,5-Dihydroxytoluol **119** und 82.9 g (600 mmol) Kaliumcarbonat vermischt und mit 250 ml Aceton versetzt. Nach der Zugabe von 56.8 g (400 mmol) Iodmethan **90** über den Tropftrichter wird der Reaktionsansatz 6 h zum Rückfluss erhitzt. Dabei ist auf ausreichendes Rühren zu achten. Nach dem Abkühlen auf Raumtemperatur gibt

man 500 ml dest. Wasser zu der Reaktionsmischung und entfernt das organische Lösemittel am Rotationsverdampfer. Anschließend wird die wässrige Phase mehrmals mit *n*-Hexan extrahiert, die resultierende organische Phase zweimal mit Kaliumhydroxid-Lösung (7 %ig) gewaschen, über Magnesiumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Das Rohprodukt wird fraktioniert destilliert (11 mbar, 103 °C; Lit. 10.7 mbar, 102 °C).

Ausbeute: 10.8 g (71.0 mmol) 71 % d. Th. (Lit. 76 %)

¹H-NMR (600 MHz, Chloroform-d): δ [ppm] = 2.34 (br s, 3H, -CH₃), 3.80 (d, *J* = 1.1 Hz, 6H, -O-CH₃), 6.31 - 6.34 (m, 1H, 4-H), 6.36 - 6.39 (m, 2H, 2-H, 6-H).

¹³C-NMR (150 MHz, Chloroform-d): δ [ppm] = 21.7 (-CH₃), 55.1 (-O-CH₃), 97.4 (C-4), 107.0 (C-2, C-6), 140.1 (C-1), 160.7 (C-3, C-5).

GC/MS (R_T = 5.23 min): *m/z* (%): 152 (100) [M]⁺, 123 (59), 109 (15), 91 (25), 77 (20).

4.15.1.5 Bromierung von 3,5-Dimethoxytoluol **120**

In einem 250 ml-Einhalskolben mit Rückflusskühler werden 12.2 g (80.2 mmol) 3,5-Dimethoxytoluol **120** in 120 ml Tetrachlormethan gelöst und mit 14.3 g (80.2 mmol) *N*-Bromsuccinimid **97** sowie 0.20 g (1.22 mmol) AIBN versetzt. Die Reaktionsmischung wird vorsichtig unter Rückfluss erwärmt, bis die Reaktion startet. Sobald sich das *N*-Bromsuccinimid **97** vollständig gelöst hat und das freigewordene Succinimid an der Oberfläche der Lösung schwimmt, erhitzt man nochmals für 10 min zum Sieden. Nach dem Abkühlen wird der Feststoff abgesaugt, das Succinimid mit etwas Tetrachlormethan gewaschen und aus den vereinigten Filtraten das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Das Rohprodukt, 2-Brom-3,5-dimethoxytoluol **122**, besitzt bereits eine äußerst hohe Reinheit und bedarf keiner weiteren Isolierung.

Ausbeute: 18.4 g (79.6 mmol) 99 % d. Th.

$^1\text{H-NMR}$ (600 MHz, Chloroform-d): δ [ppm] = 2.39 (s, 3H, -CH₃), 3.78 (s, 3H, C-5-O-CH₃), 3.85 (s, 3H, C-3-O-CH₃), 6.34 (d, J = 2.7 Hz, 1H, 4-H), 6.42 (d, J = 2.7 Hz, 1H, 6-H).

$^{13}\text{C-NMR}$ (150 MHz, Chloroform-d): δ [ppm] = 23.5 (-CH₃), 55.4 (C-5-O-CH₃), 56.2 (C-3-O-CH₃), 97.1 (C-4), 105.0 (C-2), 107.2 (C-6), 139.7 (C-1), 156.6 (C-5), 159.2 (C-3).

GC/MS (R_T = 7.11 min): m/z (%): 232 (90) [M]⁺, 230 (100) [M]⁺, 189 (18), 187 (22), 121 (39), 108 (20), 91 (14), 77 (17).

4.15.1.6 3,5-Dimethoxybenzylthiol **123**

In 250 ml-Einhalskolben werden 4.25 g (18.4 mmol) 1-Brommethyl-3,5-dimethoxybenzol **121** und 1.75 g (23.0 mmol) Thioharnstoff in 60 ml Ethanol gelöst und 6 h zum Rückfluss erhitzt. Anschließend wird das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt und der feste Rückstand in 110 ml Wasser gelöst. Danach gibt man eine Lösung aus 3.00 g Natriumhydroxid und 30 ml Wasser hinzu und erhitzt das Gemisch für weitere 6 h zum Rückfluss. Man lässt die Mischung erkalten, neutralisiert mit 36 ml verdünnter Schwefelsäure (2 mol/l) und extrahiert die wässrige Phase viermal mit je 75 ml Dichlormethan. Die vereinten organischen Phasen werden über Natriumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt.

Ausbeute: 3.34 g (18.1 mmol) 99 % d. Th.

$^1\text{H-NMR}$ (600 MHz, Chloroform-d): δ [ppm] = 1.78 (t, J = 7.7 Hz, 1H, -SH), 3.68 (d, J = 7.7 Hz, 2H, -Ph-CH₂-SH), 3.79 (s, 6H, -O-CH₃), 6.35 (t, J = 2.2 Hz, 1H, 4-H), 6.49 (d, J = 2.2 Hz, 2H, 2-H, 6-H).

$^{13}\text{C-NMR}$ (150 MHz, Chloroform-d): δ [ppm] = 29.2 (Ph-CH₂-SH), 55.3 (-O-CH₃), 99.1 (C-4), 106.0 (C-2, C-6), 143.4 (C-1), 160.9 (C-3, C-5).

GC/MS (R_T = 7.29 min): m/z (%): 184 (63) [M]⁺, 151 (100), 91 (11), 77 (10).

4.15.1.7 2-[(3,5-Dimethoxyphenyl)methyl]sulfanyl]essigsäure 124a

In einem 100 ml-Zweihalskolben mit Rückflusskühler werden 1.22 g (21.8 mmol) Kaliumhydroxid in 20 ml Ethanol gelöst und mit 4.01 g (21.8 mmol) 3,5-Dimethoxybenzylthiol **123** versetzt. Anschließend gibt man 3.03 g (21.8 mmol) 2-Bromessigsäure **116d** hinzu und erhitzt die Reaktionsmischung für 1 h zum Rückfluss. Das Lösemittel wird am Rotationsverdampfer entfernt und der Rückstand in 20 ml ges. Natriumhydrogencarbonat-Lösung aufgenommen. Diese wird im Anschluss einmal mit 20 ml Diethylether extrahiert und die resultierende organische Phase wird verworfen. Die wässrige Phase wird mit konz. Salzsäure angesäuert (pH 4), erneut dreimal mit je 20 ml Diethylether extrahiert und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Das Rohprodukt wird erneut auf obige Weise extrahiert: Der Rückstand wird in Diethylether aufgenommen, mit ges. Natriumhydrogencarbonat-Lösung extrahiert, die wässrige Phase mit konz. Salzsäure angesäuert und erneut mit Diethylether extrahiert. Die vereinigten Diethylether-Extrakte werden am Rotationsverdampfer vom Lösemittel befreit.

Ausbeute: 2.32 g (9.58 mmol) 44 % d. Th.

GC/MS ($R_T = 9.99$ min): m/z (%): 242 (41) $[M]^+$, 183 (17), 152 (100), 121 (10), 91 (14), 77 (12).

4.15.1.8 Ethyl-2-(3,5-dimethoxyphenyl)methylsulfanylpropionat 126

In einem 100 ml-Einhalskolben mit Rückflusskühler werden 5.79 g (41.9 mmol) Kaliumcarbonat und 3.71 g (27.7 mmol) Ethyl-2-mercaptopropionat **125** in 50 ml Acetonitril suspendiert und anschließend mit 5.10 g (27.7 mmol) 3,5-Dimethoxybenzylbromid **123** versetzt. Die Reaktionsmischung wird für 30 min bei Raumtemperatur gerührt, in 150 ml Wasser gegossen und mit Ethylacetat erschöpfend extrahiert. Die organische Phase wird über Magnesiumsulfat getrocknet, filtriert und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Eine weitere Aufarbeitung ist wegen der hohen Reinheit nicht nötig.

Ausbeute: 6.38 g (22.4 mmol) 81 % d. Th.

$^1\text{H-NMR}$ (600 MHz, Chloroform-d): δ [ppm] = 1.30 (t, J = 7.1 Hz, 3H, -O-CH₂-CH₃), 1.39 (d, J = 7.2 Hz, 3H, -CH₃), 3.31 (q, J = 7.2 Hz, 1H, -S-CH-), 3.72 (d, J = 13.5 Hz, 1H, Ph-CH₂-S-), 3.78 (s, 6H, -O-CH₃), 3.80 (d, J = 13.5 Hz, 1H, Ph-CH₂-S-), 4.15 - 4.21 (m, 2H, -O-CH₂-CH₃), 6.35 (t, J = 2.3 Hz, 1H, 4-H), 6.50 (d, J = 2.3 Hz, 2H, 2-H, 6-H).

$^{13}\text{C-NMR}$ (150 MHz, Chloroform-d): δ [ppm] = 14.2 (-O-CH₂-CH₃), 16.9 (-CH₃), 36.2 (Ph-CH₂-S-), 40.3 (-S-CH-), 55.3 (-O-CH₃), 61.1 (-O-CH₂-CH₃), 99.3 (C-4), 106.9 (C-2, C-6), 139.9 (C-1), 160.8 (C-3, C-5), 173.0 (C=O).

GC/MS (R_T = 9.83 min): m/z (%): 284 (31) [M]⁺, 183 (75), 152 (100), 139 (12).

4.15.1.9 2-(3,5-Dimethoxyphenyl)methylsulfanylpropansäure **124b**

In einem 50 ml-Zweihalskolben mit Rückflusskühler werden 0.51 g (9.06 mmol) Kaliumhydroxid in 10 ml Ethanol gelöst und mit 1.67 g (9.06 mmol) 3,5-Dimethoxybenzylthiol **123** versetzt. Anschließend gibt man 1.39 g (9.06 mmol) 2-Brompropansäure **116a** hinzu und erhitzt die Reaktionsmischung für 1 h zum Rückfluss. Das Lösemittel wird am Rotationsverdampfer entfernt und der Rückstand in 10 ml ges. Natriumhydrogencarbonat-Lösung aufgenommen. Diese wird im Anschluss einmal mit 10 ml Diethylether extrahiert und die resultierende organische Phase wird verworfen. Die wässrige Phase wird mit konz. Salzsäure angesäuert (pH 4), erneut dreimal mit je 10 ml Diethylether extrahiert und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. In der Analytik ist selbst nach erneuter Extraktion nur das Edukt nachweisbar.

Wird dem Reaktionsansatz bei gleichen Stoffmengenverhältnissen und Bedingungen eine Spatelspitze Natriumiodid zugefügt, so findet ein teilweiser Umsatz des Edukts zum Ethylester des gewünschten Produktes statt.

GC/MS (R_T = 9.82 min): m/z (%): 284 (24) [M]⁺, 183 (72), 152 (100).

In einem 50 ml-Einhalskolben mit Rückflusskühler werden 4.58 g ($\equiv$ 13.6 mmol) Ethyl-2-(3,5-dimethoxyphenyl)methylsulfanylpropionat **126** (84 %ig) in 25 ml eines 1:1-Gemisches aus THF und Methanol gelöst und mit einer Lösung aus 0.36 g (9.00 mmol) Natriumhydroxid und 10 ml Wasser versetzt. Diese Reaktionsmischung wird 1 d bei Raumtemperatur gerührt und anschließend am Rotationsverdampfer vom Lösemittel befreit. Der Rückstand wird in 10 ml Salzsäure (1 mol/l) aufgenommen und dreimal mit je 50 ml Dichlormethan extrahiert. Die organische Phase wird über Magnesiumsulfat getrocknet und das Lösemittel im Vakuum entfernt. Das gewünschte Produkt wird nur wenig gebildet. Stattdessen reagiert der Ethylester zum Methylester **127**. Wird bei gleichem Lösemittelvolumen auf Methanol verzichtet, so findet überhaupt kein Umsatz des Eduktes statt.

GC/MS ($R_T = 9.82$ min): m/z (%): 270 (17) $[M]^+$, 183 (48), 152 (100), 139 (11), 91 (9), 77 (9).

In einem 50 ml-Einhalskolben mit Rückflusskühler werden 2.65 g (9.32 mmol) Ethyl-2-(3,5-dimethoxyphenyl)methylsulfanylpropanoat **126** in 25 ml Ethanol gelöst und mit einer Lösung aus 0.61 g (15.3 mmol) Natriumhydroxid und 10 ml Wasser versetzt. Diese Reaktionsmischung wird 52 h zum Rückfluss erhitzt und anschließend am Rotationsverdampfer vom Lösemittel befreit. Der Rückstand wird in 10 ml Salzsäure (1 mol/l) aufgenommen und dreimal mit je 50 ml Dichlormethan extrahiert. Die organische Phase wird über Magnesiumsulfat getrocknet und das Lösemittel im Vakuum entfernt. Das Rohprodukt ist in höchstem Maße rein.

Ausbeute: 2.21 g (8.62 mmol) 93 % d. Th.

$^1\text{H-NMR}$ (600 MHz, Chloroform-d): δ [ppm] = 1.41 (d, $J = 7.2$ Hz, 3H, $-\text{CH}_3$), 3.33 (q, $J = 7.2$ Hz, 1H, $-\text{S-CH}_2-$), 3.76 (d, $J = 13.5$ Hz, $\text{Ph-CH}_2-\text{S-}$), 3.79 (s, 6H, $-\text{O-CH}_3$), 3.87 (d, $J = 13.5$ Hz, 1H, $\text{Ph-CH}_2-\text{S-}$), 6.36 (t, $J = 2.3$ Hz, 1H, 4-H), 6.53 (d, $J = 2.3$ Hz, 2H, 2-H, 6-H), 9.21 (br s, 1H, $-\text{COOH}$).

^{13}C -NMR (150 MHz, Chloroform-d): δ [ppm] = 16.6 (-CH₃), 36.4 (-S-CH-), 39.9 (Ph-CH₂-S-), 55.3 (-O-CH₃), 99.4 (C-4), 107.0 (C-2, C-6), 139.6 (C-1), 160.8 (C-3, C-5), 179.1 (-COOH).

GC/MS (R_T = 10.14 min): m/z (%): 256 (14) [M]⁺, 183 (19), 152 (100), 91 (9), 77 (8).

4.15.1.10 2-(4-Chlorbenzylsulfanyl)propansäure **129**

Gemäß der allgemeinen Arbeitsvorschrift werden 12.7 g (80.0 mmol) 4-Chlorbenzylthiol **128** und 6.12 g (40.0 mmol) 2-Brompropansäure **116a** eingesetzt. Das Rohprodukt wird wie zuvor beschrieben isoliert.

Ausbeute: 4.61 g (20.0 mmol) 50 % d. Th.

GC/MS (R_T = 8.96 min): m/z (%): 232 (3) [M]⁺, 230 (8) [M]⁺, 159 (25), 157 (70), 127 (31), 125 (100), 89 (13).

4.15.2 Ringschluss zum Isothiochromanon

4.15.2.1 Isothiochroman-4-on **131a**

In einem 100 ml-Zweihalskolben mit Rückflusskühler werden 9.97 g (54.7 mmol) 2-(Benzylsulfanyl)essigsäure **130**, 16.0 g (56.3 mmol) Phosphorpentoxid und 2.40 g Celite in 300 ml Benzol aufgenommen und für 6 h zum Rückfluss erhitzt. Nach dem Abkühlen wird die Reaktionsmischung filtriert und das Filtrat mit dem halben Volumen dest. Wasser und dem halben Volumen ges. wässriger Natriumhydrogencarbonat-Lösung gewaschen und über Magnesiumsulfat getrocknet. Das Lösemittel wird am Rotationsverdampfer entfernt. Bei Bedarf kann das Rohprodukt in Diethylether gelöst und mit ges. Natriumhydrogencarbonat-Lösung gewaschen werden, um überschüssige Säure zu entfernen.

Ausbeute: 5.73 g (34.9 mmol) 64 % d. Th.

$^1\text{H-NMR}$ (600 MHz, Chloroform- d): δ [ppm] = 3.47 (s, 2H, 1-H), 3.84 (s, 2H, 3-H), 7.10 - 7.25 (m, 2H, 7-H, 8-H), 7.38 (dt, $J = 7.5$ Hz, $J = 1.3$ Hz, 1H, 6-H), 8.01 (dd, $J = 7.8$ Hz, $J = 1.0$ Hz, 1H, 5-H).

GC/MS ($R_T = 7.21$ min): m/z (%): 164 (76) $[\text{M}]^+$, 118 (100), 90 (58).

4.15.2.2 3-Methylisothiochroman-4-on 131b

In einem 50 ml-Einhal Kolben werden 0.98 g (5.00 mmol) 2-(Benzylsulfanyl)propansäure **117a**, 12.5 ml Polyphosphorsäuretrimethylsilylester (PPSE) eingebracht und für 3 h auf 160 °C erhitzt. Nach dem Abkühlen wird die Reaktionsmischung in 100 ml Wasser eingebracht, die wässrige Phase dreimal mit je 50 ml Chloroform extrahiert und die vereinten organischen Phasen über Magnesiumsulfat getrocknet. Das Lösemittel wird am Rotationsverdampfer entfernt. Die Isolierung des gewünschten Produktes scheitert an der Vielzahl an unterschiedlichen Reaktionsprodukten.

In einem 100 ml-Einhal Kolben werden 2.69 g (13.7 mmol) 2-(Benzylsulfanyl)propansäure **117a** bis zum Schmelzen erwärmt, mit 10.0 g auf 90 °C erhitzter Polyphosphorsäure (PPA) versetzt und für 4 min gerührt. Danach werden nochmals 7.00 g PPA hinzugegeben und weitere 5 min gerührt. Anschließend werden 12.0 g Eis in den Kolben eingebracht und die Reaktionsmischung nach dem Abkühlen dreimal mit je 25 ml Diethylether extrahiert. Die erhaltene organische Phase wird zweimal mit je 10 ml einer wässrigen Natriumhydroxid-Lösung (5 %ig), zweimal mit je 10 ml Wasser, einmal mit 10 ml einer wässrigen Essigsäure-Lösung (3 %ig), einmal mit 10 ml einer wässrigen Natriumhydrogencarbonat-Lösung (5 %ig) sowie einmal mit 10 ml einer wässrigen Natriumchlorid-Lösung (5 %ig) gewaschen. Die organische Phase wird über

Magnesiumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Das gewünschte Produkt ist in der Analytik nur in Spuren nachweisbar.

In einem 1 l-Einhalskolben mit Rückflusskühler werden 19.6 g (100 mmol) 2-(Benzylsulfanyl)propansäure **117a**, 28.4 g (200 mmol) Phosphorpentoxid und 10.0 g Celite in 500 ml Benzol eingebracht und für 24 h zum Rückfluss erhitzt. Nach dem Abkühlen wird die Reaktionsmischung filtriert, der Filtrerrückstand mit Benzol und die erhaltene organische Phase mit dem gleichen Volumen dest. Wasser gewaschen. Die Benzolphase wird anschließend über Magnesiumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Das Rohprodukt wird fraktioniert destilliert (0.1 mbar, 97 - 100 °C).

Ausbeute: 4.11 g (23.1 mmol) 23 % d. Th.

$^1\text{H-NMR}$ (600 MHz, Chloroform-d): δ [ppm] = 1.52 (d, J = 6.9 Hz, 3H, -CH₃), 3.69 (q, J = 6.9 Hz, 1H, 3-H), 3.77 (d, J = 16.6 Hz, 1H, 1-H), 4.22 (d, J = 16.6 Hz, 1H, 1-H), 7.18 (d, J = 7.7 Hz, 1H, 8-H), 7.35 (t (dd), J = 7.6 Hz, 1H, 7-H), 7.44 (dt, J = 7.5 Hz, J = 1.3 Hz, 1H, 6-H), 8.06 (dd, J = 7.9 Hz, J = 0.9 Hz, 1H, 5-H).

$^{13}\text{C-NMR}$ (150 MHz, Chloroform-d): δ [ppm] = 14.6 (-CH₃), 29.9 (C-1), 42.5 (C-3), 127.4 (C-8), 127.7 (C-5), 129.2 (C-6), 132.2 (C-8'), 132.5 (C-7), 141.3 (C-4'), 193.6 (C=O).

GC/MS (R_T = 7.39 min): m/z (%): 178 (45) [M]⁺, 118 (100), 90 (37).

In einem 250 ml-Zweihalskolben mit Rückflusskühler, Trockenrohr (Calciumchlorid) und Tropftrichter werden 15 ml frisch destilliertes Thionylchlorid vorgelegt und auf -20 °C gekühlt. Über den Tropftrichter werden 5.00 g (25.5 mmol) 2-(Benzylsulfanyl)propansäure **117a** gelöst in 25 ml Benzol vorsichtig zugetropft. Die Reaktionsmischung wird für einige Minuten bei -20 °C gerührt und anschließend langsam auf Raumtemperatur erwärmt. Danach wird der Ansatz für 2 h bei 60 °C gerührt und der Überschuss an Thionylchlorid bei vermindertem Druck entfernt.

In einem 100 ml-Zweihalskolben mit Rückflusskühler, Trockenrohr (Calciumchlorid) und Tropftrichter werden 3.87 g (29.0 mmol) Aluminiumchlorid in 25 ml abs. Dichlormethan aufgenommen und auf -20 °C gekühlt. Anschließend werden über den Tropftrichter das zuvor gebildete und in 10 ml abs. Dichlormethan gelöste Säurechlorid langsam zugegeben. Die Reaktionsmischung wird unter Rühren über Nacht auf Raumtemperatur gebracht. Überschüssiges Aluminiumchlorid wird durch Ausschütteln mit dest. Wasser entfernt. Die organische Phase wird über Magnesiumsulfat getrocknet. Das Lösemittel wird am Rotationsverdampfer entfernt. Es bilden sich nach einigen Minuten Kristalle des Produkts. Bei Bedarf (größerer Ansatz) wird das Rohprodukt fraktioniert destilliert (0.68 mbar, 105 - 120 °C), ist aber im Normalfall bereits äußerst rein.

Ausbeute: 4.27 g (24.0 mmol) 94 % d. Th.

¹H-NMR (600 MHz, Chloroform-d): δ [ppm] = 1.50 (d, J = 7.0 Hz, 3H, -CH₃), 3.67 (dq, J = 7.0 Hz, J = 0.9 Hz, 1H, 3-H), 3.75 (d, J = 16.6 Hz, 1H, 1-H), 4.20 (d, J = 16.5 Hz, 1H, 1-H), 7.17 (d, J = 7.7 Hz, 1H, 8-H), 7.33 (t, J = 7.5 Hz, 1H, 7-H), 7.42 (dt (ddd), J = 7.5 Hz, J = 1.5 Hz, 1H, 6-H), 8.04 (dd, J = 7.9 Hz, J = 1.4 Hz, 1H, 5-H).

¹³C-NMR (150 MHz, Chloroform-d): δ [ppm] = 14.5 (-CH₃), 29.8 (C-1), 42.4 (C-3), 127.3 (C-8), 127.7 (C-5), 129.1 (C-6), 132.2 (C-8'), 132.5 (C-7), 141.2 (C-4'), 193.5 (C=O).

GC/MS (R_T = 7.41 min): m/z (%): 178 (41) [M]⁺, 118 (100), 90 (42).

4.15.2.3 3-Ethylisothiochroman-4-on 131c

In einem 250 ml-Einhalskolben mit Rückflusskühler werden 7.36 g (entspr. 19.9 mmol) 2-(Benzylsulfanyl)butansäure **117b** (57 %ig), 6.30 g (44.4 mmol) Phosphorpentoxid und 6.00 g Celite in 175 ml Benzol eingebracht und für 4 h zum Rückfluss erhitzt. Nach dem Abkühlen wird die Reaktionsmischung filtriert, der Filterrückstand mit Benzol und die erhaltene organische Phase mit dem gleichen Volumen dest. Wasser gewaschen. Die Benzolphase wird anschließend über

Magnesiumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Das gewünschte Produkt kann in der Analytik nicht nachgewiesen werden, da kein Umsatz stattfand.

In einem 1 l-Zweihalskolben mit Rückflusskühler, Trockenrohr (Calciumchlorid) und Tropftrichter werden 280 ml frisch destilliertes Thionylchlorid vorgelegt und auf -20 °C gekühlt. Über den Tropftrichter werden 98.2 g (467 mmol) 2-(Benzylsulfanyl)butansäure **117b** in 470 ml Benzol gelöst und vorsichtig zugetropft. Die Reaktionsmischung wird für einige Minuten bei -20 °C gerührt und anschließend langsam auf Raumtemperatur erwärmt. Danach wird der Ansatz für 2 h bei 60 °C gerührt und der Überschuss an Thionylchlorid bei vermindertem Druck entfernt.

In einem 1 l-Zweihalskolben mit Rückflusskühler, Trockenrohr (Calciumchlorid) und Tropftrichter werden 70.8 g (531 mmol) Aluminiumchlorid in 470 ml abs. Dichlormethan aufgenommen und auf -20 °C gekühlt. Anschließend werden über den Tropftrichter das zuvor gebildete und in 190 ml abs. Dichlormethan gelöste Säurechlorid langsam zugegeben. Die Reaktionsmischung wird unter Rühren über Nacht auf Raumtemperatur gebracht, danach in dest. Wasser gegeben und 4 h gerührt. Die wässrige Phase wird mit Dichlormethan erschöpfend extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen werden über Magnesiumsulfat getrocknet. Das Lösemittel wird am Rotationsverdampfer entfernt. Das Rohprodukt wird im Ölpumpenvakuum fraktioniert destilliert.

Ausbeute: 39.4 g (205 mmol) 44 % d. Th.

GC/MS ($R_T = 7.90$ min): m/z (%): 192 (22) $[M]^+$, 164 (7), 118 (100), 90 (35).

4.15.2.4 5,7-Dimethoxyisothiochroman-4-on **132a**

In einem 50 ml-Einhalskolben mit Rückflusskühler werden 0.70 g (2.89 mmol) 2-(3,5-Dimethoxyphenyl)methylsulfanylessigsäure **124a**, 0.41 g (2.89 mmol) Phosphorpentoxid und 0.45 g Celite in 15 ml Benzol eingebracht und für 4 h zum

Rückfluss erhitzt. Nach dem Abkühlen wird die Reaktionsmischung filtriert, der Filtrerrückstand mit Benzol und die erhaltene organische Phase mit dem gleichen Volumen dest. Wasser gewaschen. Die Benzolphase wird anschließend über Magnesiumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Das Rohprodukt wird mit ges. Natriumhydrogencarbonat-Lösung gewaschen.

Ausbeute: 0.24 g (1.07 mmol) 37 % d. Th.

$^1\text{H-NMR}$ (600 MHz, Chloroform-d): δ [ppm] = 3.51 (d, J = 1.6 Hz, 2H, 1-H), 3.78 (br s (m), 2H, 3-H), 3.85 (s, 3H, C-5-O-CH₃), 3.88 (s, 3H, C-7-O-CH₃), 6.30 (d, J = 2.3 Hz, 1H, 6-H), 6.40 (d, J = 2.3 Hz, 1H, 8-H).

$^{13}\text{C-NMR}$ (150 MHz, Chloroform-d): δ [ppm] = 31.9 (C-1), 38.7 (C-3), 55.5 (C-7-O-CH₃), 56.2 (C-5-O-CH₃), 98.0 (C-6), 104.2 (C-8), 115.5 (C-4'), 146.1 (C-8'), 162.9 (C-5), 163.5 (C-7), 189.5 (C-4).

GC/MS (R_T = 7.29 min): m/z (%): 224 (30) $[\text{M}]^+$, 178 (100), 135 (9).

4.15.2.5 5,7-Dimethoxy-3-methylisothiochroman-4-on **132b**

In einem 100 ml-Einhalskolben mit Rückflusskühler werden 4.58 g ($\equiv$ 13.6 mmol) Ethyl-2-(3,5-dimethoxyphenyl)methylsulfanylpropanoat **126** (84 %ig), 4.26 g (30.0 mmol) Phosphorpentoxid und 3.30 g Celite in 75 ml Benzol eingebracht und für 6 h zum Rückfluss erhitzt. Nach dem Abkühlen wird die Reaktionsmischung filtriert, der Filtrerrückstand mit Benzol und die erhaltene organische Phase mit dem gleichen Volumen dest. Wasser gewaschen. Die Benzolphase wird anschließend über Magnesiumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Die Analytik zeigt, dass kein Umsatz stattfindet.

In einem 250 ml-Einhalskolben mit Rückflusskühler werden 7.00 g (27.3 mmol) 2-(3,5-Dimethoxyphenyl)methylsulfanylpropansäure **124b**, 5.82 g (41.0 mmol) Phosphorpentoxid und 3.50 g Celite in 150 ml Benzol eingebracht und für 40 h zum

Rückfluss erhitzt. Nach dem Abkühlen wird die Reaktionsmischung filtriert, der Filterrückstand mit Benzol und die erhaltene organische Phase mit dem gleichen Volumen dest. Wasser gewaschen. Die Benzolphase wird anschließend über Magnesiumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Das Rohprodukt wird in 200 ml Benzol gelöst, zusammen mit 2.17 g Kaliumhydrogencarbonat 1 h zum Rückfluss erhitzt und anschließend am Rotationsverdampfer vom Lösemittel befreit. Der so erhaltene Rückstand wird unter vermindertem Druck fraktioniert destilliert ($6 \cdot 10^{-2}$ mbar, 163 °C). Die Fraktion, welche das Produkt enthält, wird in 100 ml Diethylether gelöst, mit 20 ml Natriumhydroxid-Lösung (5 %ig) gewaschen, über Magnesiumsulfat getrocknet und vom Lösemittel befreit.

Ausbeute: 0.79 g (3.32 mmol) 12 % d. Th.

$^1\text{H-NMR}$ (600 MHz, Chloroform- d): δ [ppm] = 1.47 (d, J = 6.9 Hz, 3H, $-\text{CH}_3$), 3.61 (q, J = 6.8 Hz, 1H, 3-H), 3.70 (d, J = 16.3 Hz, 1H, Ph- CH_2 -S-), 3.83 (s, 3H, C-5-O- CH_3), 3.86 (s, 3H, C-7-O- CH_3), 4.07 (d, J = 16.7 Hz, 1H, Ph- CH_2 -S-), 6.25 (d, J = 2.3 Hz, 1H, 6-H), 6.38 (d, J = 2.3 Hz, 1H, 8-H).

$^{13}\text{C-NMR}$ (150 MHz, Chloroform- d): δ [ppm] = 15.4 ($-\text{CH}_3$), 30.6 (C-1), 43.7 (C-3), 55.4 (C-7-O- CH_3), 56.1 (C-5-O- CH_3), 97.9 (C-6), 104.0 (C-8), 116.0 (C-4'), 145.2 (C-8'), 162.4 (C-5), 163.0 (C-7), 192.4 (C-4).

GC/MS (R_T = 10.09 min): m/z (%): 238 (12) $[\text{M}]^+$, 178 (100), 135 (6).

MS (HR-ESI): $\text{C}_{12}\text{H}_{14}\text{O}_3\text{S}$ (238.30 g/mol):

Berechnete Werte ($[\text{M}+\text{H}]^+$): 239.07364

Experimentell bestimmte ($[\text{M}+\text{H}]^+$): 239.07343

4.15.2.6 6-Chlor-3-methylisothiochroman-4-on 133

In einem 25 ml-Einhalskolben mit Rückflusskühler und Trockenrohr (Calciumchlorid) werden 4.61 g (20.0 mmol) 2-(4-Chlorphenyl)methylsulfanylpropansäure **129** und

20 ml frisch destilliertes Thionylchlorid solange zum Rückfluss erhitzt, bis die Gasentwicklung abgeschlossen ist (24 h). Anschließend wird überschüssiges Thionylchlorid abdestilliert. Danach wird der Rückstand in 25 ml Dischwefelkohlenstoff gelöst, mit 3.50 g (26.2 mmol) Aluminiumchlorid versetzt und für 20 h zum Rückfluss erhitzt. Nach dem Abkühlen wird das Reaktionsgemisch in 50 ml Wasser gegossen, vom Feststoff abfiltriert, dieser dreimal mit 75 ml Ethylacetat aufgeschlämmt und erneut filtriert und die wässrige Phase dreimal mit je 75 ml Ethylacetat extrahiert. Die vereinten organischen Phasen werden über Magnesiumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Das gewünschte Produkt ist in der Analytik nicht nachweisbar.

4.15.3 Synthese der Thioamide mit Thio- und Isothiochromanon-Struktur

4.15.3.1 *N*-Ethyl-4-oxo-3,4-dihydro-2*H*-1-benzothiopyran-3-carbothioamid 135

In einem sekurierten 50 ml-Zweihalskolben mit Serumkappe und Abgang zur Stickstoff-Vakuum-Linie werden 0.56 g (5.50 mmol) Diisopropylamin in 15 ml abs. THF gelöst, auf -78 °C gekühlt und langsam mit 3.4 ml (5.50 mmol) *n*-Butyllithium (1.6 mol/l in *n*-Hexan) versetzt. Anschließend wird die Lösung 30 min bei 0 °C gerührt und danach wieder auf -78 °C gekühlt. Zu dieser Lösung wird nun eine auf -78 °C gekühlte Lösung aus 0.82 g (5.0 mmol) Thiochroman-4-on **134** in 15 ml abs. THF gegeben. Die Reaktionsmischung wird für 1 h ohne Kühlung gerührt, anschließend mit 0.44 g (5.00 mmol) Ethylisothiocyanat **31a** versetzt und über Nacht weiter gerührt. Man hydrolysiert den Reaktionsansatz mit 20 ml Wasser und 10 ml ges. Natriumchlorid-Lösung und extrahiert die wässrige Phase dreimal mit je 75 ml Chloroform. Die vereinigten organischen Phasen werden über Natriumsulfat getrocknet, filtriert und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Das gewünschte Produkt ist in der Analytik nur in Spuren nachweisbar.

In einem sekurierten 100 ml-Zweihalskolben mit Serumkappe und Abgang zur Stickstoff-Vakuum-Linie werden 0.82 g (5.00 mmol) Thiochroman-4-on **134** in 15 ml abs. Diethylether gelöst, auf $-78\text{ }^{\circ}\text{C}$ gekühlt und langsam mit 3.4 ml (5.50 mmol) *n*-Butyllithium (1.6 mol/l in *n*-Hexan) versetzt. Anschließend wird die Lösung 1 h bei derselben Temperatur gerührt. Zu dieser Lösung werden 0.44 g (5.00 mmol) Ethylisothiocyanat **31a** gegeben und diese wird über Nacht unter Rühren auf Raumtemperatur erwärmt. Man hydrolysiert den Reaktionsansatz mit 20 ml Wasser und 20 ml ges. Ammoniumchlorid-Lösung und extrahiert die wässrige Phase dreimal mit je 75 ml Chloroform. Die vereinigten organischen Phasen werden über Natriumsulfat getrocknet, filtriert und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Das Rohprodukt wird in einem 2:1-Gemisch aus *n*-Hexan und Ethylacetat aufgenommen und der unlösliche Feststoff abfiltriert, anschließend aus *n*-Hexan umkristallisiert und danach säulenchromatographisch mit einem 2:1-Gemisch aus *n*-Hexan und Ethylacetat gereinigt ($R_f = 0.81$).

Ausbeute: 0.12 g (0.48 mmol) 10 % d. Th.

Schmelzpunkt: $119.1\text{ }^{\circ}\text{C}$

$^1\text{H-NMR}$ (600 MHz, Chloroform-*d*): δ [ppm] = 1.30 (t, $J = 7.3\text{ Hz}$, 3H, -NH-CH₂-CH₃), 3.55 - 3.61 (m (q), 1H, 3-H), 3.67 - 3.77 (m, 2H, 2-H), 3.83 - 3.90 (m (q), 2H, -NH-CH₂-CH₃), 7.12 - 7.16 (m, 1H, 6-H), 7.23 (d, $J = 7.9\text{ Hz}$, 1H, 7-H), 7.34 - 7.38 (m, 1H, 8-H), 8.02 (dd, $J = 8.0\text{ Hz}$, $J = 1.3\text{ Hz}$, 1H, 5-H), 8.67 (br s, 1H, -NH).

$^{13}\text{C-NMR}$ (150 MHz, Chloroform-*d*): δ [ppm] = 12.9 (-NH-CH₂-CH₃), 31.7 (C-2), 41.3 (-NH-CH₂-CH₃), 59.3 (C-3), 125.1 (C-6), 127.6 (C-8), 129.9 (C-5), 130.7 (C-4'), 133.8 (C-7), 142.4 (C-8'), 193.0 (C=O), 196.9 (C=S).

GC/MS ($R_T = 11.10\text{ min}$): m/z (%): 251 (30) $[\text{M}]^+$, 205 (4), 163 (100), 147 (5).

MS (HR-ESI): C₁₂H₁₃NOS₂ (251.37 g/mol):

Berechnete Werte ($[\text{M}+\text{H}]^+$): 252.0511

Experimentell bestimmte ($[\text{M}+\text{H}]^+$): 252.0511

4.15.3.2 **N-Ethyl-3-methyl-4-oxo-3,4-dihydro-1H-2-benzothiopyran-3-carbothioamid 136a**

In einem 50 ml-Zweihalskolben mit Abgang zur Stickstoff-Vakuum-Linie werden 79 mg (0.70 mmol) Kalium-*tert.*-butanolat sekuriert und anschließend in 5 ml Dimethylsulfoxid gelöst. Danach wird eine Lösung aus 117 mg (0.66 mmol) 3-Methylisothiochroman-4-on **131b** in 5 ml Dimethylsulfoxid zugegeben und die Reaktionsmischung 30 min gerührt. Daraufhin werden 61 mg (0.70 mmol) Ethylisothiocyanat **31a** zugetropft, weitere 16 h bei Raumtemperatur gerührt und im Anschluss 0.15 ml Salzsäure (6 mol/l) zugegeben. Diese Lösung wird mit 25 ml Dichlormethan extrahiert und die resultierende organische Phase mit 25 ml dest. Wasser gewaschen und über Magnesiumsulfat getrocknet. Das Lösemittel wird am Rotationsverdampfer entfernt. Das gewünschte Produkt kann in der Analytik nicht nachgewiesen werden.

4.15.3.3 **N-tert.-Butyl-3-methyl-4-oxo-3,4-dihydro-1H-2-benzothiopyran-3-carbothioamid 136b**

In einem 100 ml-Zweihalskolben mit Serumkappe und Abgang zur Stickstoff-Vakuum-Linie werden 753 mg (6.72 mmol) Kalium-*tert.*-butanolat sekuriert und in 10 ml abs. THF aufgenommen. Ein zweiter 50 ml-Zweihalskolben mit 998 mg (5.60 mmol) 3-Methylisothiochromanon **131b** wird ebenfalls sekuriert und anschließend werden 10 ml abs. THF zugegeben. Diese Lösung wird danach in den ersten Kolben überführt. Man rührt die Reaktionsmischung nun für 40 min bei Raumtemperatur. Danach werden 774 mg (6.72 mmol) *tert.*-Butylisothiocyanat **31d** hinzugegeben, wobei die Temperatur 20 °C nicht übersteigen darf, und der Reaktionsansatz über Nacht bei Raumtemperatur gerührt. Im Anschluss wird Salzsäure (6 mol/l) bis zur schwach sauren Reaktion hinzugegeben und die Mischung dreimal mit je 75 ml Dichlormethan extrahiert. Die organische Phase wird mit 20 ml dest. Wasser gewaschen und über Magnesiumsulfat getrocknet. Das

Lösemittel wird am Rotationsverdampfer entfernt. Das Rohprodukt wird säulenchromatographisch mit einem 10:1-Gemisch aus *n*-Hexan und Ethylacetat gereinigt ($R_f = 0.25$).

Ausbeute: 78 mg (0.27 mmol) 5 % d. Th.

Schmelzpunkt : 134.3 °C

$^1\text{H-NMR}$ (600 MHz, Chloroform-*d*): δ [ppm] = 1.53 (s, 9H, $-\text{C}(\text{CH}_3)_3$), 1.75 (s, 3H, $-\text{S-CH-CH}_3$), 3.58 (d, $J = 16.8$ Hz, 1H, $\text{Ph-CH}_2\text{-S-}$), 4.13 (d, $J = 16.7$ Hz, 1H, $\text{Ph-CH}_2\text{-S-}$), 7.06 - 7.09 (m, 1H, 6-H), 7.31 - 7.38 (m, 2H, 7-H, 8-H), 8.00 (dd, $J = 7.5$ Hz, $J = 1.8$ Hz, 1H, 5-H), 8.74 (s, 1H, -NH).

$^{13}\text{C-NMR}$ (150 MHz, Chloroform-*d*, Diastereomerengemisch): δ [ppm] = 24.7 ($-\text{S-CH-CH}_3$), 27.4 ($-\text{C}(\text{CH}_3)_3$), 28.9 (C-1), 55.6 ($-\text{C}(\text{CH}_3)_3$), 61.5 (C-3), 127.3 (C-6), 127.7 (C-8), 130.4 (C-5), 131.4 (C-7), 134.2 (C-4'), 138.0 (C-8'), 189.2 (C=S), 196.6 (C=O).

ESI: m/z (%): 294 (100) $[\text{M}+\text{H}]^+$, 179 (51), 145 (4).

MS (HR-ESI): $\text{C}_{15}\text{H}_{20}\text{NOS}_2$ (293.45 g/mol):

Berechnete Werte ($[\text{M}+\text{H}]^+$): 294.0981

Experimentell bestimmte ($[\text{M}+\text{H}]^+$): 294.0984

4.15.3.4 2-({[1-*tert*-Butylcarbamothioyl]ethyl}sulfanyl)methyl)benzoesäure 139a

In einem 100-ml-Zweihalskolben mit Serumkappe und Abgang zur Stickstoff-Vakuum-Linie werden 998 mg (5.60 mmol) 3-Methylisothiochromanon **131b** sekuriert, in einem weiteren 100-ml Zweihalskolben mit Serumkappe werden 753 mg (6.72 mmol) Kalium-*tert*-butanolat und 376 mg (6.72 mmol) Natriumhydroxid sekuriert. Unter Stickstoff wird das Isothiochromanon **131b** in 10 ml abs. THF gelöst und anschließend in den Zweihalskolben mit in 10 ml abs. THF aufgeschlammtem Kalium-*tert*-butanolat überführt. Anschließend wird für 40 min gerührt. Darauf folgt

die Zugabe von 774 mg (0.85 ml) *tert.*-Butylisothiocyanat **31d** (6.72 mmol). Das Reaktionsgemisch wird über Nacht bei Raumtemperatur gerührt. Es folgt die Zugabe von 1.5 ml Salzsäure (4 mol/l). Der Kolbeninhalt wird in 50 ml Dichlormethan aufgenommen und mit demselben Volumen Wasser gewaschen. Die organische Phase wird über Magnesiumsulfat getrocknet und das Lösungsmittel am Rotationsverdampfer entfernt. Das Rohprodukt wird aus Ethanol umkristallisiert.

Ausbeute: 209 mg (0.67 mmol) 12 % d. Th.

Schmelzpunkt : 149.9 °C

¹H-NMR (600 MHz, Chloroform-d): δ [ppm] = 1.44 (d, *J* = 7.3 Hz, 3H, -S-CH-CH₃), 1.51 (s, 9H, -C(CH₃)₃), 3.84 (d, *J* = 13.3 Hz, 1H, Ph-CH₂-S-), 3.90 (q, *J* = 7.3 Hz, 1H, -S-CH-CH₃), 4.31 (d, *J* = 13.2 Hz, 1H, Ph-CH₂-S-), 7.35 - 7.40 (m, 2H, Phenyl 3-H, Phenyl 5-H), 7.53 (dt, *J* = 7.5 Hz, *J* = 1.4 Hz, 1H, Phenyl 6-H), 8.13 (dd, *J* = 7.8 Hz, *J* = 1.3 Hz, Phenyl 4-H), 8.58 (s, 1H, -NH).

¹³C-NMR (150 MHz, Chloroform-d, Diastereomerengemisch): δ [ppm] = 22.2 (-S-CH-CH₃), 27.3 (-C(CH₃)₃), 35.4 (Ph-CH₂-S-), 55.1 (-C(CH₃)₃), 56.4 (-S-CH-CH₃), 127.2 (Phenyl C-2), 127.7 (Phenyl C-4), 131.8 (Phenyl C-5), 132.5 (Phenyl C-6), 133.4 (Phenyl C-3), 140.8 (Phenyl C-1), 171.7 (C=O), 201.7 (C=S).

ESI: m/z (%): 312 (100) [M+H]⁺, 278 (5).

MS (HR-ESI): C₁₅H₂₁NO₂S₂ (311.46 g/mol):

Berechnete Werte ([M+H]⁺): 312.1086

Experimentell bestimmte ([M+H]⁺): 312.1090

4.15.3.5 ***N*-Norbornyl-3-methyl-4-oxo-3,4-dihydro-1*H*-2-benzothiopyran-3-carbothioamid 136c**

In einem 50 ml-Zweihalskolben mit Serumkappe und Abgang zur Stickstoff-Vakuum-Linie werden 337 mg (3.00 mmol) Kalium-*tert.*-butanolat sekuriert und in 15 ml abs.

THF aufgenommen. Ein zweiter 25 ml-Zweihalskolben mit 267 mg (1.50 mmol) 3-Methylisothiochromanon **131b** wird ebenfalls sekuriert und anschließend werden 15 ml abs. THF zugegeben. Diese Lösung wird danach in den ersten Kolben überführt. Man rührt die Reaktionsmischung nun für 1 h bei Raumtemperatur. Danach werden 230 mg (1.50 mmol) *exo*-2-Norbornylisothiocyanat **31h** hinzugegeben, wobei die Temperatur 20 °C nicht übersteigen darf, und der Reaktionsansatz für 5 d bei Raumtemperatur gerührt. Im Anschluss wird Salzsäure (6 mol/l) bis zur schwach sauren Reaktion hinzugegeben und die Mischung dreimal mit je 75 ml Dichlormethan extrahiert. Die organische Phase wird mit 20 ml dest. Wasser gewaschen und über Magnesiumsulfat getrocknet. Das Lösemittel wird am Rotationsverdampfer entfernt. Das gewünschte Produkt ist in der Analytik nicht nachweisbar.

4.15.3.6 ***N*-[(1*R*)-1-Cyclohexylethyl]-4-oxo-3,4-dihydro-1*H*-2-benzothiopyran-3-carbothioamid 137a**

In einem 50 ml-Zweihalskolben mit Serumkappe und Abgang zur Stickstoff-Vakuum-Linie werden 130 mg (1.16 mmol) Kalium-*tert.*-butanolat sekuriert und in 10 ml abs. THF aufgenommen. Ein zweiter 25 ml-Zweihalskolben mit 190 mg (1.16 mmol) Isothiochroman-4-on **131a** wird ebenfalls sekuriert und anschließend werden 10 ml abs. THF zugegeben. Diese Lösung wird danach in den ersten Kolben überführt. Man rührt die Reaktionsmischung nun für 1 h bei Raumtemperatur. Danach werden 196 mg (1.16 mmol) (*R*)-(-)-1-Cyclohexylethylisothiocyanat **31k** hinzugegeben und die Reaktion für 4 d bei Raumtemperatur gerührt. Im Anschluss wird Salzsäure (6 mol/l) bis zur schwach sauren Reaktion hinzugegeben und die Mischung dreimal mit je 75 ml Dichlormethan extrahiert. Die organische Phase wird mit 20 ml dest. Wasser gewaschen und über Magnesiumsulfat getrocknet. Das Lösemittel wird am Rotationsverdampfer entfernt. Das Rohprodukt wird zweimal säulenchromatographisch mit Chloroform als Laufmittel gereinigt ($R_f = 0.86$).

Ausbeute: 46 mg (0.138 mmol) 12 % d. Th.

$^1\text{H-NMR}$ (600 MHz, Chloroform- d): δ [ppm] = 0.80 - 1.80 (m, 11H, Cyclohexyl), 1.23 (d, J = 6.7 Hz, 3H, -NH-CH-CH $_3$), 3.75 (d, J = 14.3 Hz, 1H, 1-H), 3.81 (d, J = 14.3, 1H, 1-H), 4.49 (m, 1H, -NH-CH-CH $_3$), 7.16 - 7.19 (m, 1H, 8-H), 7.35 - 7.40 (m, 2H, 6-H, 7-H), 7.94 - 7.97 (m, 1H, 5-H), 8.09 (d, J = 8.0 Hz, 1H, -NH), 15.13 (s, 1H, -OH).

$^{13}\text{C-NMR}$ (150 MHz, Chloroform- d): δ [ppm] = 16.4 (-NH-CH-CH $_3$), 26.1 (Cyclohexyl C-5), 26.2 (Cyclohexyl C-3), 26.3 (Cyclohexyl C-4), 28.9 (Cyclohexyl C-6), 29.2 (Cyclohexyl C-2), 31.1 (C-1), 42.5 (Cyclohexyl C-1), 54.2 (-NH-CH-CH $_3$), 100.1 (C-3), 125.8 (C-8), 127.2 (C-5), 127.7 (C-6), 130.9 (C-7), 132.1 (C-8'), 136.3 (C-4'), 162.9 (C-4), 187.0 (C=S).

MS (HR-ESI): C $_{18}$ H $_{23}$ NOS $_2$ (333.51 g/mol):

Berechnete Werte ([M+H] $^+$): 334.1294

Experimentell bestimmte ([M+H] $^+$): 334.1294

4.15.3.7 ***N*-[(1*S*)-1-Cyclohexylethyl]-4-oxo-3,4-dihydro-1*H*-2-benzothiopyran-3-carbothioamid 137b**

In einem 50 ml-Zweihalskolben mit Serumkappe und Abgang zur Stickstoff-Vakuum-Linie werden 171 mg (1.52 mmol) Kalium-*tert.*-butanolat sekuriert und in 10 ml abs. THF aufgenommen. Ein zweiter 25 ml-Zweihalskolben mit 250 mg (1.52 mmol) Isothiochroman-4-on **131a** wird ebenfalls sekuriert und anschließend werden 10 ml abs. THF zugegeben. Diese Lösung wird danach in den ersten Kolben überführt. Man rührt die Reaktionsmischung nun für 1 h bei Raumtemperatur. Danach werden 257 mg (1.52 mmol) (*S*)-(+)-1-Cyclohexylethylisothiocyanat **311** hinzugegeben und die Reaktion für 5 d bei Raumtemperatur gerührt. Im Anschluss wird Salzsäure (6 mol/l) bis zur schwach sauren Reaktion hinzugegeben und die Mischung dreimal mit je 75 ml Dichlormethan extrahiert. Die organische Phase wird mit 20 ml dest. Wasser gewaschen und über Magnesiumsulfat getrocknet. Das Lösemittel wird am Rotationsverdampfer entfernt. Das Rohprodukt wird säulenchromatographisch mit einem 4:1-Gemisch aus *n*-Hexan und Ethylacetat gereinigt (R_f = 0.55).

Ausbeute: 100 mg (0.30 mmol) 20 % d. Th.

$^1\text{H-NMR}$ (600 MHz, Chloroform-d): δ [ppm] = 1.00 - 1.85 (m, 11H, Cyclohexyl), 1.23 (d, $J = 6.7$ Hz, 3H, -NH-CH-CH₃), 3.75 (d, $J = 14.3$ Hz, 1H, 1-H), 3.81 (d, $J = 14.3$ Hz, 1H, 1-H), 4.49 (dqin, $J = 8.6$ Hz, $J = 6.6$ Hz, 1H, -NH-CH-CH₃), 7.16 - 7.19 (m, 1H, 8-H), 7.35 - 7.40 (m, 2H, 6-H, 7-H), 7.94 - 7.98 (m, 1H, 5-H), 8.08 (d, $J = 7.9$ Hz, 1H, -NH), 15.13 (s, 1H, -OH).

$^{13}\text{C-NMR}$ (150 MHz, Chloroform-d): δ [ppm] = 16.4 (-NH-CH-CH₃), 26.1 (Cyclohexyl C-5), 26.2 (Cyclohexyl C-3), 26.3 (Cyclohexyl C-4), 28.9 (Cyclohexyl C-6), 29.2 (Cyclohexyl C-2), 31.1 (C-1), 42.5 (Cyclohexyl C-1), 54.2 (-NH-CH-CH₃), 100.1 (C-3), 125.8 (C-8), 127.2 (C-5), 127.7 (C-6), 130.9 (C-7), 132.1 (C-8'), 136.3 (C-4'), 162.9 (C-4), 187.0 (C=S).

MS (HR-ESI): C₁₈H₂₃NOS₂ (333.51 g/mol):

Berechnete Werte ([M-H]⁺): 332.1137

Experimentell bestimmte ([M-H]⁺): 332.1139

4.15.3.8 ***N*-[(1*R*)-1-Cyclohexylethyl]-3-methyl-4-oxo-3,4-dihydro-1*H*-2-benzothiopyran-3-carbothioamid 138a**

In einem 50 ml-Zweihalskolben mit Serumkappe, Rückflusskühler und Abgang zur Stickstoff-Vakuum-Linie werden 178 mg (1.00 mmol) 3-Methylisothiochroman-4-on **131b** sekuriert und in 15 ml abs. THF gelöst. Anschließend wird die Lösung auf 0 °C gekühlt und 1.0 ml (1.00 mmol) Kaliumhexamethyldisilazid (1 mol/l in THF) zugegeben. Diese Lösung wird für 1 h bei Raumtemperatur gerührt. Danach werden 170 mg (1.00 mmol) (*R*)-(-)-1-Cyclohexylethylisothiocyanat **31k** hinzugegeben und der Reaktionsansatz für 1 h bei 50 °C gerührt. Im Anschluss wird der Ansatz mit 10 ml ges. Ammoniumchlorid-Lösung und 10 ml dest. Wasser hydrolysiert und dreimal mit je 75 ml Dichlormethan extrahiert. Die vereinten organischen Phasen werden über Magnesiumsulfat getrocknet und das Lösemittel am

Rotationsverdampfer entfernt. Das Rohprodukt wird säulenchromatographisch mit Chloroform als Laufmittel gereinigt ($R_f = 0.44$).

Ausbeute: 49 mg (0.14 mmol) 14 % d. Th.

Schmelzpunkt: 137.4 °C

$^1\text{H-NMR}$ (600 MHz, Chloroform-d, Diastereomerengemisch ca. 2:1): δ [ppm] = 1.18 (d, $J = 6.7$ Hz, 3H, -NH-CH-CH₃), 1.00 - 1.80 (m, 11H, Cyclohexyl), 1.77 (s, 3H, C-3-CH₃), 3.56 (d, $J = 16.8$ Hz, 1H, Ph-CH₂-S-), 4.09 (d, $J = 16.8$ Hz, 1H, Ph-CH₂-S-), 4.40 (dqin, $J = 9.1$ Hz, $J = 6.6$ Hz, 1H, -NH-CH-CH₃), 7.04 - 7.10 (m, 1H, 8-H), 7.36 (dqin, $J = 7.2$ Hz, $J = 1.7$ Hz, 2H, 6-H, 7-H), 8.00 - 8.07 (m, 1H, 5-H), 8.68 (d, $J = 8.9$ Hz, 1H, -NH).

$^{13}\text{C-NMR}$ (150 MHz, Chloroform-d, Diastereomerengemisch ca. 2:1): δ [ppm] = 16.5 (-NH-CH-CH₃), 24.7 (C-3-CH₃), 26.0 (Cyclohexyl C-3), 26.0 (Cyclohexyl C-5), 26.2 (Cyclohexyl C-4), 28.7 (C-1), 29.1 (Cyclohexyl C-2), 29.1 (Cyclohexyl C-6), 42.5 (Cyclohexyl C-1), 55.0 (C-3), 60.3 (-NH-CH-CH₃), 127.4 (C-6), 127.7 (C-8), 130.5 (C-5), 131.6 (C-7), 134.0 (C-4'), 138.2 (C-8'), 189.0 (C=S), 196.6 (C=O).

ESI: m/z (%): 348 (100) $[\text{M}+\text{H}]^+$, 234 (2), 214 (4), 179 (6).

MS (HR-ESI): C₁₉H₂₅NOS₂ (347.54 g/mol):

Berechnete Werte ($[\text{M}-\text{H}]^+$): 348.1450

Experimentell bestimmte ($[\text{M}-\text{H}]^+$): 348.1456

4.15.3.9 ***N*-[(1*S*)-1-Cyclohexylethyl]-3-methyl-4-oxo-3,4-dihydro-1*H*-2-benzothiopyran-3-carbothioamid 138b**

In einem 50 ml-Zweihalskolben mit Serumkappe und Abgang zur Stickstoff-Vakuuminie werden 337 mg (3.00 mmol) Kalium-*tert*-butanolat sekuriert und in 15 ml abs. THF aufgenommen. Ein zweiter 25 ml-Zweihalskolben mit 267 mg (1.50 mmol) 3-Methylisothiochroman-4-on **131b** wird ebenfalls sekuriert und anschließend werden

15 ml abs. THF zugegeben. Diese Lösung wird danach in den ersten Kolben überführt. Man rührt die Reaktionsmischung nun für 1 h bei Raumtemperatur. Danach werden 254 mg (1.50 mmol) (S)-(+)-1-Cyclohexylethylisothiocyanat **31I** hinzugegeben, wobei die Temperatur 20 °C nicht übersteigen darf, und der Reaktionsansatz für 3 d bei Raumtemperatur gerührt. Im Anschluss wird Salzsäure (6 mol/l) bis zur schwach sauren Reaktion hinzugegeben und die Mischung dreimal mit je 75 ml Dichlormethan extrahiert. Die organische Phase wird mit 20 ml dest. Wasser gewaschen und über Magnesiumsulfat getrocknet. Das Lösemittel wird am Rotationsverdampfer entfernt. Das gewünschte Produkt kann in der Analytik nur als Nebenprodukt nachgewiesen werden.

In einem 100 ml-Zweihalskolben mit Serumkappe und Abgang zur Stickstoff-Vakuum-Linie werden 0.50 g (2.81 mmol) 3-Methylisothiochromanon **131b** sekuriert, in 25 ml abs. THF gelöst und auf 0 °C gekühlt. Anschließend werden 3.1 ml (3.10 mmol) Lithiumhexamethyldisilazid (1 mol/l in THF) zugegeben. Diese Lösung wird für 3 h bei Raumtemperatur gerührt. Danach werden 475 mg (2.81 mmol) (S)-(+)-1-Cyclohexylethylisothiocyanat **31I** hinzugegeben und die Reaktion für 2 d bei Raumtemperatur gerührt. Im Anschluss wird der Ansatz mit 10 ml ges. Ammoniumchlorid-Lösung und 10 ml dest. Wasser hydrolysiert und dreimal mit je 75 ml Dichlormethan extrahiert. Die organische Phase wird über Magnesiumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Das entstehende Öl beinhaltet kleinste Kristalle, die in Aceton unlöslich sind. Das gewünschte Produkt kann weder im Öl noch in den Kristallen nachgewiesen werden. Auch die Zugabe einer Spatelspitze Lithiumchlorid führt nicht zum gewünschten Produkt.

In einem 50 ml-Zweihalskolben mit Serumkappe und Abgang zur Stickstoff-Vakuum-Linie werden 0.69 g (3.10 mmol) 2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-Hydrobromid sekuriert, in 20 ml abs. THF gelöst, auf -78 °C gekühlt und mit 1.94 ml *n*-Butyllithium (1.6 mol/l in *n*-Hexan) versetzt. Anschließend erwärmt man die Reaktionsmischung auf 0 °C. In einem weiteren 50 ml-Zweihalskolben werden 0.50 g (2.81 mmol) 3-Methylisothiochroman-4-on **131b** sekuriert, in 20 ml abs. THF gelöst, auf 0 °C gekühlt und per Doppelkanüle in den ersten Kolben überführt. Diese Lösung wird für

2 h bei 0 °C gerührt. Danach werden 475 mg (2.81 mmol) (S)-(+)-1-Cyclohexylethylisothiocyanat **311** hinzugegeben und die Reaktion für 18 h bei Raumtemperatur gerührt. Im Anschluss wird der Ansatz mit 10 ml ges. Ammoniumchlorid-Lösung und 20 ml dest. Wasser hydrolysiert und dreimal mit je 75 ml Dichlormethan extrahiert. Die organische Phase wird über Magnesiumsulfat getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Das gewünschte Produkt ist in der Analytik nicht nachweisbar.

In einem 100 ml-Zweihalskolben mit Serumkappe und Abgang zur Stickstoff-Vakuum-Linie werden 378 mg (3.37 mmol) Kalium-*tert.*-butanolat sekuriert und in 10 ml abs. THF gelöst. In einem 50 ml-Zweihalskolben mit Serumkappe und Abgang zur Stickstoff-Vakuum-Linie werden 500 mg (2.81 mmol) 3-Methylisothiochromanon **131b** sekuriert und in 10 ml abs. THF gelöst. Bei Raumtemperatur wird die Isothiochromanon-Lösung zu der Butanolat-Lösung gegeben und 40 min bei Raumtemperatur gerührt. Anschließend werden 570 mg (3.37 mmol) (S)-(+)-1-Cyclohexylethylisothiocyanat **311** zugegeben und der Reaktionsansatz über Nacht bei Raumtemperatur gerührt. Danach wird Salzsäure (6 mol/l) bis zur schwach sauren Reaktion zugetropft. Die Lösung wird mit Dichlormethan erschöpfend extrahiert und die organische Phase über Magnesiumsulfat getrocknet. Das Lösemittel wird am Rotationsverdampfer entfernt. Das Rohprodukt wird säulenchromatographisch mit einem 5:1-Gemisch aus *n*-Hexan und Ethylacetat gereinigt ($R_f = 0.40$). Das Produkt bildet ein gelbes Öl.

Ausbeute: 577 mg (1.66 mmol) 59 % d. Th.

$^1\text{H-NMR}$ (600 MHz, Chloroform-*d*, Diastereomerengemisch ca. 2:1): δ [ppm] = 1.18 (d, $J = 6.7$ Hz, 3H, -NH-CH-CH₃), 1.00 - 1.80 (m, 11H, Cyclohexyl), 1.77 (s, 3H, C-3-CH₃), 3.56 (d, $J = 16.9$ Hz, 1H, Ph-CH₂-S-), 4.09 (d, $J = 16.9$ Hz, 1H, Ph-CH₂-S-), 4.33 - 4.43 (m, 1H, -NH-CH-CH₃), 7.05 - 7.09 (m, 1H, 8-H), 7.32 - 7.39 (m, 2H, 6-H, 7-H), 8.03 (dd, $J = 7.5$ Hz, $J = 1.7$ Hz, 1H, 5-H), 8.68 (d, $J = 7.4$ Hz, -NH).

$^{13}\text{C-NMR}$ (150 MHz, Chloroform-*d*, Diastereomerengemisch ca. 2:1): δ [ppm] = 16.5 (-NH-CH-CH₃), 24.7 (C-3-CH₃), 26.0 (Cyclohexyl C-3), 26.2 (Cyclohexyl C-5), 26.3

(Cyclohexyl C-4), 28.7 (C-1), 29.1 (Cyclohexyl C-2), 29.2 (Cyclohexyl C-6), 42.5 (Cyclohexyl C-1), 55.0 (C-3), 60.3 (-NH-CH-CH₃), 127.4 (C-6), 127.7 (C-8), 130.5 (C-5), 131.5 (C-7), 133.9 (C-4'), 138.1 (C-8'), 189.0 (C=S), 196.6 (C=O).

ESI: m/z (%): 348 (100) [M+H]⁺, 209 (5), 179 (8).

MS (HR-ESI): C₁₉H₂₅NOS₂ (347.54 g/mol):

Berechnete Werte ([M-H]⁺): 348.1450

Experimentell bestimmte ([M-H]⁺): 348.1452

4.15.3.10 2-[[[1-[[[(1R)-1-Cyclohexylethyl]carbamothioyl]ethyl)sulfanyl]methyl]benzoesäure 139b

In einem 100 ml-Zweihalskolben mit Serumkappe und Abgang zur Stickstoff-Vakuum-Linie werden 188 mg (1.68 mmol) Kalium-*tert.*-butanolat und 300 mg (1.68 mmol) 3-Methylisothiochroman-4-on **131b** sekuriert, in 25 ml abs. THF aufgenommen und für 1 h bei Raumtemperatur gerührt. Danach werden 284 mg (1.68 mmol) (*R*)-(-)-1-Cyclohexylethylisothiocyanat **31k** hinzugegeben und die Reaktion für 4 d bei Raumtemperatur gerührt. Im Anschluss wird Salzsäure (6 mol/l) bis zur schwach sauren Reaktion hinzugegeben und die Mischung dreimal mit je 75 ml Dichlormethan extrahiert. Die organische Phase wird mit 30 ml dest. Wasser gewaschen und über Magnesiumsulfat getrocknet. Das Lösemittel wird am Rotationsverdampfer entfernt. Das Rohprodukt wird säulenchromatographisch mit einem 1:1-Gemisch aus Ethylacetat und *n*-Hexan als Laufmittel gereinigt (R_f = 0.45).

Ausbeute: 160 mg (0.46 mmol) 27 % d. Th.

Schmelzpunkt: 121.0 °C

¹H-NMR (600 MHz, Chloroform-d, Diastereomerengemisch): δ [ppm] = 1.13 / 1.18 (d, *J* = 6.7 Hz, 3H, -NH-CH-CH₃), 1.43 / 1.47 (d, *J* = 7.3 Hz, 3H, -S-CH-CH₃), 1.50 - 1.83 (m, 11H, Cyclohexyl), 3.73 / 3.78 (d, *J* = 13.2 Hz, 1H, Ph-CH₂-S-), 3.98 / 4.02 (q, *J* =

7.3 Hz, -NH-CH-CH₃), 4.31 / 4.38 (d, *J* = 13.2 Hz, 1H, Ph-CH₂-S-), 4.40 - 4.49 (m, 1H, -S-CH-CH₃), 7.33 - 7.40 (m, 2H, Phenyl 3-H, Phenyl 5-H), 7.52 (dq, *J* = 7.6 Hz, *J* = 1.4 Hz, 1H, Phenyl 4-H), 8.10 - 8.15 (m, 1H, Phenyl 4-H), 8.62 / 8.66 (d, *J* = 8.7 Hz, 1H, -NH).

¹³C-NMR (150 MHz, Chloroform-d): δ [ppm] = 16.0 / 16.0 (-NH-CH-CH₃), 21.8 / 22.1 (-S-CH-CH₃), 26.0 / 26.1 (Cyclohexyl), 26.1 / 26.1 (Cyclohexyl), 26.3 / 26.3 (Cyclohexyl), 29.0 / 29.1 (Cyclohexyl), 29.2 / 29.4 (Cyclohexyl), 35.1 / 35.3 (Ph-CH₂-S-), 42.2 / 42.4 (Cyclohexyl C-1), 53.7 / 54.3 (-S-CH-CH₃), 55.4 / 55.6 (-NH-CH-CH₃), 127.3 / 127.6 (Phenyl C-5), 127.7 / 127.7 (Phenyl C-4), 131.7 / 131.7 (Phenyl C-3), 132.5 / 132.6 (Phenyl C-6), 133.2 / 133.3 (Phenyl C-1), 140.6 / 140.6 (Phenyl C-2), 171.1 / 171.2 (C=O), 201.8 / 202.2 (C=S).

ESI: m/z (%): 366 (100) [M+H]⁺, 281 (10), 198 (32).

MS (HR-ESI): C₁₉H₂₇NO₂S₂ (365.55 g/mol):

Berechnete Werte ([M+H]⁺): 366.1556

Experimentell bestimmte ([M+H]⁺): 366.1564

4.15.3.11 2-[[[(1S)-1-Cyclohexylethyl]carbamothioyl]ethyl)sulfanyl]methyl}benzoesäure **139c**

In einem 100 ml-Zweihalskolben mit Serumkappe und Abgang zur Stickstoff-Vakuum-Linie werden 315 mg (2.81 mmol) Kalium-*tert.*-butanolat und 500 mg (2.81 mmol) 3-Methylisothiochroman-4-on **131b** sekuriert, in 25 ml abs. THF aufgenommen und für 1 h bei Raumtemperatur gerührt. Danach werden 475 mg (2.81 mmol) (S)-(+)-1-Cyclohexylethylisothiocyanat **311** hinzugegeben und die Reaktion für 4 d bei Raumtemperatur gerührt. Im Anschluss wird Salzsäure (6 mol/l) bis zur schwach sauren Reaktion hinzugegeben und die Mischung dreimal mit je 75 ml Dichlormethan extrahiert. Die organische Phase wird über Magnesiumsulfat

getrocknet und das Lösemittel am Rotationsverdampfer entfernt. Das Rohprodukt wird säulenchromatographisch mit Chloroform als Laufmittel gereinigt ($R_f = 0.02$).

Ausbeute: 44 mg (0.13 mmol) 5 % d. Th.

Schmelzpunkt : 111.1 °C

$^1\text{H-NMR}$ (600 MHz, Chloroform-d, Diastereomerengemisch): δ [ppm] = 1.14 / 1.18 (d, $J = 6.7$ Hz, 3H, -NH-CH-CH₃), 1.43 / 1.48 (d, $J = 7.3$ Hz, 3H, -S-CH-CH₃), 1.51 - 1.82 (m, 11H, Cyclohexyl), 3.72 / 3.77 (d, $J = 13.2$ Hz, 1H, Ph-CH₂-S-), 3.99 / 4.02 (q, $J = 7.3$ Hz, 1H, -NH-CH-CH₃), 4.30 / 4.37 (d, $J = 13.1$ Hz, 1H, Ph-CH₂-S-), 4.41 - 4.49 (m, 1H, -S-CH-CH₃), 7.34 - 7.40 (m, 2H, Phenyl 3-H, Phenyl 5-H), 7.52 (dq, $J = 7.5$ Hz, $J = 1.4$ Hz, 1H, Phenyl 6-H), 8.10 (ddd, $J = 9.6$ Hz, $J = 7.9$ Hz, $J = 1.3$ Hz, 1H, Phenyl 4-H), 8.63 - 8.69 (m, 1H, -NH).

$^{13}\text{C-NMR}$ (150 MHz, Chloroform-d, Diastereomerengemisch): δ [ppm] = 16.0 (-NH-CH-CH₃), 22.1 (-S-CH-CH₃), 26.1 (Cyclohexyl), 26.1 (Cyclohexyl), 26.3 (Cyclohexyl), 26.3 (Cyclohexyl), 29.0 (Ph-CH₂-S-), 29.4 (Cyclohexyl C-1), 29.7 (-S-CH-CH₃), 30.9 (Cyclohexyl), 42.2 (-NH-CH-CH₃), 127.7 (Phenyl C-5), 131.7 (Phenyl C-4), 131.7 (Phenyl C-3), 132.3 (Phenyl C-6), 133.1 (Phenyl C-1), 138.3 (Phenyl C-2), 166.6 (C=O), 207.0 (C=S).

ESI: m/z (%): 366 (100) [M+H]⁺, 281 (11), 223 (4).

MS (HR-ESI): C₁₉H₂₇NO₂S₂ (365.55 g/mol):

Berechnete Werte ([M+H]⁺): 366.1556

Experimentell bestimmte ([M+H]⁺): 366.1555

4.15.3.12 **N-Ethyl-5,7-dimethoxy-4-oxo-3,4-dihydro-1H-2-benzothiopyran-3-carbothioamid 140a**

In einem 25 ml-Zweihalskolben mit Serumkappe und Abgang zur Stickstoff-Vakuum-Linie werden 50 mg (0.45 mmol) Kalium-*tert.*-butanolat und 100 mg (0.45 mmol)

5,7-Dimethoxyisothiochroman-4-on **132a** sekuriert und anschließend in 10 ml Dimethylsulfoxid gelöst. Nun werden 40 mg (0.45 mmol) Ethylisothiocyanat **31a** hinzugegeben und die Reaktion für 3 d bei Raumtemperatur gerührt. Im Anschluss werden 5 ml dest. Wasser und 10 ml ges. wässrige Ammoniumchlorid-Lösung hinzugegeben, die Mischung dreimal mit je 75 ml Dichlormethan extrahiert. Die organische Phase wird mit 20 ml dest. Wasser gewaschen und über Magnesiumsulfat getrocknet. Das Lösemittel wird am Rotationsverdampfer entfernt. Das gewünschte Produkt ist auch bei der Verwendung von absolutiertem Dimethylsulfoxid in der Analytik nicht nachweisbar.

4.15.3.13 **N-Ethyl-5,7-dimethoxy-3-methyl-4-oxo-3,4-dihydro-1H-2-benzothiopyran-3-carbothioamid 140b**

In einem 50 ml-Zweihalskolben mit Serumkappe und Abgang zur Stickstoff-Vakuuminie werden 141 mg (1.26 mmol) Kalium-*tert.*-butanolat sekuriert und in 10 ml abs. THF aufgenommen. Ein zweiter 25 ml-Zweihalskolben mit 300 mg ($\equiv$ 0.69 mmol) 5,7-Dimethoxy-3-methylisothiochroman-4-on (55 %ig) **132b** wird ebenfalls sekuriert und anschließend werden 10 ml abs. THF zugegeben. Diese Lösung wird danach in den ersten Kolben überführt. Man rührt die Reaktionsmischung nun für 1 h bei Raumtemperatur. Danach werden 110 mg (1.26 mmol) Ethylisothiocyanat **31a** hinzugegeben, wobei die Temperatur 20 °C nicht übersteigen darf, und die Reaktion für 24 h bei Raumtemperatur gerührt. Im Anschluss wird Salzsäure (6 mol/l) bis zur schwach sauren Reaktion hinzugegeben und die Mischung dreimal mit je 75 ml Dichlormethan extrahiert. Die organische Phase wird mit 20 ml dest. Wasser gewaschen und über Magnesiumsulfat getrocknet. Das Lösemittel wird am Rotationsverdampfer entfernt. Der Rückstand wird in *n*-Hexan aufgenommen, wobei das gewünschte Produkt als Feststoff ausfällt.

Ausbeute: 40 mg (0.123 mmol) 18 % d. Th.

Schmelzpunkt: 242 °C (Verfärbung ab ca. 200 °C)

$^1\text{H-NMR}$ (600 MHz, Chloroform-d): δ [ppm] = 1.25 (t, J = 7.3 Hz, 3H, -NH-CH₂-CH₃), 1.74 (s, 3H, C-3-CH₃), 3.62 (d, J = 16.7 Hz, 1H, 1-H), 3.59 - 3.73 (m, 2H, -NH-CH₂-CH₃), 3.80 (s, 3H, C-5-O-CH₃), 3.89 (s, 3H, C-7-O-CH₃), 4.05 (d, J = 16.8 Hz, 1H, 1-H), 6.13 (d, J = 2.2 Hz, 1H, 6-H), 6.37 (d, J = 2.2 Hz, 1H, 8-H), 8.74 (br s, 1H, -NH).

$^{13}\text{C-NMR}$ (150 MHz, Chloroform-d): δ [ppm] = 13.1 (-NH-CH₂-CH₃), 24.7 (C-3-CH₃), 28.8 (C-1), 40.4 (-NH-CH₂-CH₃), 55.3 (C-7-O-CH₃), 56.4 (C-5-O-CH₃), 60.4 (C-3), 98.1 (C-6), 103.7 (C-8), 118.5 (C-4'), 140.7 (C-8'), 162.1 (C-5), 162.2 (C-7), 187.1 (C=O (C-4)), 198.9 (C=S).

GC/MS (R_T = 14.13 min): m/z (%): 325 (3) $[\text{M}]^+$, 237 (100), 209 (6), 205 (7), 178 (64), 135 (6).

MS (HR-ESI): C₁₅H₁₉NO₃S₂ (325.45 g/mol):

Berechnete Werte ($[\text{M}+\text{H}]^+$): 326.08791

Experimentell bestimmte ($[\text{M}+\text{H}]^+$): 326.08809

4.15.3.14 ***N*-Propyl-5,7-dimethoxy-3-methyl-4-oxo-3,4-dihydro-1*H*-2-benzothiopyran-3-carbothioamid 140c**

In einem 50 ml-Zweihalskolben mit Serumkappe und Abgang zur Stickstoff-Vakuuminlinie werden 236 mg (2.10 mmol) Kalium-*tert.*-butanolat sekuriert und in 10 ml abs. THF aufgenommen. Ein zweiter 25 ml-Zweihalskolben mit 250 mg (1.05 mmol) 5,7-Dimethoxy-3-methylisothiochroman-4-on **132b** wird ebenfalls sekuriert und anschließend werden 10 ml abs. THF zugegeben. Diese Lösung wird danach in den ersten Kolben überführt. Man rührt die Reaktionsmischung nun für 1 h bei Raumtemperatur. Danach werden 106 mg (1.05 mmol) Propylisothiocyanat **31m** hinzugegeben, wobei die Temperatur 20 °C nicht übersteigen darf, und die Reaktion für 24 h bei Raumtemperatur gerührt. Im Anschluss wird Salzsäure (6 mol/l) bis zur schwach sauren Reaktion hinzugegeben und die Mischung dreimal mit je 75 ml Dichlormethan extrahiert. Die organische Phase wird mit 20 ml dest. Wasser gewaschen und über Magnesiumsulfat getrocknet. Das Lösemittel wird am

Rotationsverdampfer entfernt. Der Rückstand wird in *n*-Hexan aufgenommen, wobei das gewünschte Produkt als Feststoff ausfällt, der mit wenig *n*-Hexan gewaschen wird.

Ausbeute: 0.21 g (0.62 mmol) 59 % d. Th.

Schmelzpunkt: 219.6 °C (Verfärbung ab ca. 150 °C)

¹H-NMR (600 MHz, Chloroform-d): δ [ppm] = 0.97 (t, *J* = 7.4 Hz, 3H, -NH-CH₂-CH₂-CH₃), 1.67 (dq, *J* = 14.3 Hz, *J* = 7.2 Hz, 2H, -NH-CH₂-CH₂-CH₃), 1.74 (s, 3H, C-3-CH₃), 3.52 - 3.65 (m, 2H, -NH-CH₂-CH₂-CH₃), 3.62 (d, *J* = 17.3 Hz, 1H, Ph-CH₂-S-), 3.79 (s, 3H, C-7-O-CH₃), 3.89 (s, 3H, C-5-O-CH₃), 4.05 (d, *J* = 16.8 Hz, 1H, Ph-CH₂-S-), 6.13 (d, *J* = 2.1 Hz, 1H, 6-H), 6.37 (d, *J* = 2.2 Hz, 1H, 8-H), 8.80 (br s, 1H, -NH).

¹³C-NMR (150 MHz, Chloroform-d): δ [ppm] = 11.4 (-NH-CH₂-CH₂-CH₃), 21.3 (C-3-CH₃), 24.8 (-NH-CH₂-CH₂-CH₃), 28.8 (C-1), 47.1 (-NH-CH₂-CH₂-CH₃), 55.3 (C-7-O-CH₃), 56.4 (C-5-O-CH₃), 60.6 (C-3), 98.1 (C-6), 103.7 (C-8), 118.5 (C-4'), 140.6 (C-8'), 162.1 (C-5), 162.2 (C-7), 187.1 (C=O (C-4)), 199.1 (C=S).

GC/MS (R_T = 15.08 min): m/z (%): 339 (1) [M]⁺, 237 (100), 178 (52).

MS (HR-ESI): C₁₆H₂₁NO₃S₂ (339.47 g/mol):

Berechnete Werte ([M+H]⁺): 340.10356

Experimentell bestimmte ([M+H]⁺): 340.10385

4.15.3.15 *N*-tert.-Butyl-5,7-dimethoxy-3-methyl-4-oxo-3,4-dihydro-1*H*-2-benzothiopyran-3-carbothioamid 140d

In einem 50 ml-Zweihalskolben mit Serumkappe und Abgang zur Stickstoff-Vakuumlinie werden 236 mg (2.10 mmol) Kalium-*tert.*-butanolat sekuriert und in 10 ml abs. THF aufgenommen. Ein zweiter 25 ml-Zweihalskolben mit 250 mg (1.05 mmol) 5,7-Dimethoxy-3-methylisothiochroman-4-on **132b** wird ebenfalls sekuriert und anschließend werden 10 ml abs. THF zugegeben. Diese Lösung wird danach in den

ersten Kolben überführt. Man rührt die Reaktionsmischung nun für 1 h bei Raumtemperatur. Danach werden 121 mg (1.05 mmol) *tert.*-Butylisothiocyanat **31d** hinzugegeben, wobei die Temperatur 20 °C nicht übersteigen darf, und die Reaktion für 36 h bei Raumtemperatur gerührt. Im Anschluss wird Salzsäure (6 mol/l) bis zur schwach sauren Reaktion hinzugegeben und die Mischung dreimal mit je 75 ml Dichlormethan extrahiert. Die organische Phase wird mit 20 ml dest. Wasser gewaschen und über Magnesiumsulfat getrocknet. Das Lösemittel wird am Rotationsverdampfer entfernt. Der Rückstand wird in Ethylacetat gelöst und das gewünschte Produkt mit *n*-Hexan ausgefällt. Das gewünschte Produkt konnte in der Analytik nur marginal nachgewiesen werden.

MS (EI, 70 eV): *m/z* (%): 353 (2) [M]⁺, 237 (100), 205 (22), 178 (35), 149 (9), 57 (20).

4.15.3.16 (1*R*,2*S*,5*R*)-5-Methyl-2-(propan-2-yl)cyclohexyl-3-methyl-4-oxo-3,4-dihydro-1*H*-2-benzothiopyran-3-carboxylat **142**

In einem 50 ml-Zweihalskolben mit Serumkappe und Abgang zur Stickstoff-Vakuum-Linie werden 224 mg (2.00 mmol) Kalium-*tert.*-butanolat sekuriert und in 10 ml abs. THF aufgenommen. Ein zweiter 25 ml-Zweihalskolben mit 178 mg (1.00 mmol) 3-Methylisothiochromanon **131b** wird ebenfalls sekuriert und anschließend werden 10 ml abs. THF zugegeben. Diese Lösung wird danach in den ersten Kolben überführt. Man rührt die Reaktionsmischung nun für 1 h bei Raumtemperatur. Danach werden 218 mg (1.00 mmol) (-)-Chlorameisensäurementhylester **141** in 5 ml abs. THF hinzugegeben und die Reaktion für 36 h bei Raumtemperatur gerührt. Im Anschluss wird Salzsäure (6 mol/l) bis zur schwach sauren Reaktion hinzugegeben und die Mischung dreimal mit je 75 ml Chloroform extrahiert. Die organische Phase wird über Magnesiumsulfat getrocknet. Das Lösemittel wird am Rotationsverdampfer entfernt. Das gewünschte Produkt ist in der Analytik nicht nachweisbar.

5. Literaturverzeichnis

- [1] B. Alberts, D. Bray, K. Hopkin, A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, P. Walter, *Lehrbuch der molekularen Zellbiologie*, 3. Aufl., Wiley-VCH Weinheim, **2005**.
- [2] Grafik mit Genehmigung von M. C. Villarreal verwendet
- [3] G. L. Singer, S. J. Nicolson, *Science*, **1972**, 175, 720-731.
- [4] H.-D. Jakubke, H. Jeschkeit, *Lexikon der Biochemie*, VCH Weinheim/Bergstraße, **1974**.
- [5] S. T. Lachenicht, Dissertation **2008**, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.
- [6] R. MacKinnon, *Angew. Chemie* **2004**, 116, 4362.
- [7] A. Fischer, Diplomarbeit **2008**, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.
- [8] M. J. Coghlan, W. A. Carroll, M. Gopalakrishnan, *J. Med. Chem.* **2001**, 44, 1627.
- [9] G. A. Gutman, K. G. Chandy, *Sem. Neurosciences* **1993**, 5, 101-106.
- [10] F. Lesage, M. Lazdunski, *Am. J. Physiol. Renal. Physiol.*, **2000**, 279, F793-F801.
- [11] Y. Kubo, J. P. Adelman, D. E. Clapham, L. Y. Jan, A. Karschin, Y. Kurachi, M. Lazdunski, C. G. Nichols, S. Seino, C. A. Vandenberg, *Pharmacol. Rev.* **2005**, 57, 509-526.
- [12] M.-A. Sperling, *New Engl. J. Med.* **2006**, 355, 507-510.
- [13] J. M. Simard, S. K. Woo, G. T. Schwartzbauer, V. Gerzanich, *J. Cerebral Blood Flow & Metabolism* **2012**, 32, 1699-1717.

-
- [14] T. J. Brown, R. F. Chapman, D. C. Cook, T. W. Hart, I. M. McLay, R. Jordan, J. S. Mason, M. N. Palfreyman, R. J. A. Walsh, M. T. Withnall, J.-C. Aloup, I. Cavero, D. Farge, C. James, S. Mondot, *J. Med. Chem.* **1992**, *35*, 3613-3624.
- [15] A. Marble, *Drugs* **1971**, *1*, 109-115.
- [16] H. Ruschig, W. Avmuller, G. Korger, H. Wagner, J. Scholtz, A. Bander, *U.S. Patent US2976317*.
- [17] W. Grell, R. Hurnaus, G. Griss, R. Sauter, M. Reiffen, E. Rupprecht, *Patent RE37035*.
- [18] C. Moreau, A. L. Prost, R. Dérand, M. Vivaudou, *J. Mol. Cell. Cardio.*, **2005**, *38*, 951-963.
- [19] B. Pirotte, J. Fontaine, P. Lebrun, *Curr. Med. Chem.* **1995**, *2*, 573-582.
- [20] H. Lemoine, A. Rood, D. Grittner, J. Küper, B. Pirotte, *Naunyn-Schmiedeberg's Arch. Pharmacol.* **2006**, 372.
- [21] F.-E. Nielson et al., *J. Med. Chem.* **2002**, *45*, 4171-4187.
- [22] M. Gollasch, R. Bychkov, C. Ried, F. Behrendt, S. Scholze, F. C. Luft, H. Haller, *J. Pharmacol. Exp. Ther.* **1995**, *275*, 681-692.
- [23] E. Salamon, R. Mannhold, H. Weber, H. Lemoine, W. Frank, *J. Med. Chem.* **2002**, *45*, 1086.
- [24] R. Bergmann, R. Gericke, *J. Med. Chem.* **1990**, *33*, 492-504.
- [25] H. Koga, H. Sato, J. Imagawa, T. Ishizawa, S. Yoshida, I. Sugo, N. Taka, T. Takahashi, H. Nabata, *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **1993**, *3*, 2005-2010.
- [26] V. Cecchetti, V. Calderone, O. Tabarrini, S. Sabatini, E. Filipponi, L. Testai, R. Spogli, E. Martinotti, A. Fravolini, *J. Med. Chem.* **2003**, *46*, 3670-3679.
- [27] A. Götzinger, Bachelorarbeit **2009**, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.
- [28] S. Hildebrandt, Bachelorarbeit **2012**, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.
- [29] V. Grote, Bachelorarbeit **2012**, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.
- [30] M. Franke, Bachelorarbeit **2013**, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.

- [31] P. de Tullio, B. Becker, S. Boverie, M. Dabrowski, P. Wahl, M.-H. Antoine, F. Somers, S. Seville, R. Ouedraogo, J. B. Hansen, P. Lebrun, B. Pirotte, *J. Med. Chem.* **2003**, *46*, 3342-3353.
- [32] S. Boverie, M.-H. Antoine, F. Somers, B. Becker, S. Seville, R. Ouedraogo, S. Couterotte, B. Pirotte, P. Lebrun, P. de Tullio, *J. Med. Chem.* **2005**, *48*, 3492-3503.
- [33] Y. Imai, A. Mochizuki, M. Kakimoto, *Synthesis* **1983**, *10*, 851.
- [34] Hermann J. Roth, Christa E. Müller, Gerd Folkers: *Stereochemie und Arzneistoffe*, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart, **1998**, 251-274.
- [35] D. E. Koshland, *Proc. Natl. Acad. Sci.* **1958**, 98-104.
- [36] M. Scholz, K. Bendorf, R. Gust, E. Hey-Hawkins, *ChemMedChem*, **2009**, *4*, 746-748.
- [37] R. A. Kasar, G. M. Knudsen, S. B. Kahl, *Inorganic Chemistry* **1999**, *38*, 2936-2940.
- [38] Y. Endo, K. Yaguchi, M. Tsuji, K. Yamaguchi, K. Shudo, *Chem. Pharm. Bull.* **1999**, *47*, 699-701.
- [39] G. C. Harrison, H. Diehl, *Org. Synth.* **1943**, *23*, 32.
- [40] *Organikum*, 18. korr. Auflage, Deutscher Verlag der Wissenschaften, **1990**.
- [41] S. Rudrawar, A. Kondaskar, A. K. Chakraborti, *Synthesis* **2005**, 2521-2526.
- [42] H.-J. Gais, A. Böhme, *J. Org. Chem.* **2002**, *67*, 1153-1161.
- [43] A. R. Pourali, *Monatshefte für Chemie* **2005**, *136*, 733-737.
- [44] S. Gobbi, *J. Med. Chem.* **2003**, *46*, 3662-3669.
- [45] D. R. de Magalhães Moreira, A. C. Lima Leite, *Eur. J. Med. Chem.* **2007**, *42*, 351-357.
- [46] H. Groß, B. Costisella, *Zeitschrift für die chem. Industrie* **1968**, *80*, 445-446.
- [47] C. R. Degenhardt, *Synth. Comm.* **1982**, *12*, 415-421.

-
- [48] D. Seebach, M. Kolb, B.-Th. Gröbel, *Chem. Ber.* **1973**, *106*, 2277-2290.
- [49] D. Seebach, R. Bürstinghaus, *Synthesis* **1975**, *7*, 461-462.
- [50] V. K. Aggarwal, B. N. Esquivel-Zamora, *J. Org. Chem.* **2002**, *67*, 8618-8621.
- [51] S. Dantale, V. Reboul, P. Metzner, C. Philouze, *Chem. Eur. J.* **2002**, *8*, 632-640.
- [52] S. Ghosh, I. Datta, R. Chakraborty, T. K. Das, J. Sengupta, D. C. Sarkar, *Tetrahedron* **1989**, *45*, 1441-1446.
- [53] M. Braun, A. Hessamian-Alinejad, B. Féaux De Lacroix, B. Hernandez Alvarez, G. Fischer, *Molecules* **2008**, *13*(4), 995-1003.
- [54] A. P. Kozikowski, I. N. Gaisina, H. Yuan, P. A. Petukhov, S. Y. Blond, A. Fedolak, B. Caldarone, P. McGonigle, *J. Am. Chem. Soc.* **2007**, *129*, 8328-8332.
- [55] U. Uhrig, H.-D. Höltje, R. Mannhold, H. Weber, H. Lemoine, *J. Mol. Graphics and Modelling* **2002**, *21*, 37-45.
- [56] J.-C. Tsai, S.-R. Li, L.-Y. Chen, P.-Y. Chen, J.-Y. Joung, C.-J. Shu, Y.-F. Lo, C.-N. Lin, E.-C. Wang, *J. Chin. Chem. Soc.* **2008**, *55*, 1317-1321.
- [57] B. Richrath, Dissertation **2010**, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.
- [58] K. Rutkauskas, Z.-I. Beresnevicius, *Chemistry of Heterocyclic Compounds* **2006**, *42*, 227-232.
- [59] *Organikum*, 16. Auflage, VEB Verlag, **1986**, 167.
- [60] L. A. Levy, *Synth. Comm.* **1983**, *13*, 639-648.
- [61] Patentschrift: WO 2009/014637 bzw. PCT/US2008/008749.
- [62] D. R. Boyd, N. D. Sharma, A. W. T. King, S. D. Shepherd, C. C. R. Allen, R. A. Holt, H. R. Luckarift, H. Dalton, *J. Biomol. Chem.* **2004**, *2*, 554-561.
- [63] Y. Wan, N. Kurchan, L. A. Barnhurst, A. G. Kutateladze, *Organic Letters* **2000**, *2*, 1133-1135.
- [64] Houben-Weyl, *Methoden der organischen Chemie*, Band E 19 d.

- [65] Patentschrift: US4501904 A1 **1985**.
- [66] H. K. Patney, *Synth. Comm.* **1993**, 23, 2229-2233.
- [67] H. K. Patney, *Synth. Comm.* **1993**, 23, 1829-1833.
- [68] W. Ando, H. Sonobe, T. Akasaka, *Tetrahedron* **1990**, 46, 5093-5100.
- [69] P. A. Kikilo, B. I. Khairutdinov, R. A. Shaikhutdinov, Yu. G. Shtyrlin, V. V. Klochkov, E. N. Klimovitskii, *Russian Journal of General Chemistry* **2001**, 71, 960-964.
- [70] F. D. Chattaway, E. G. Kellett, *J. Chem. Soc.* **1930**, 1352-1356.
- [71] W. Autenrieth, R. Hennings, *Chem. Ber.* **1902**, 35, 1388-1400.
- [72] N. A. Noureldin, W. B. McConnell, D. G. Lee, *Can. J. Chem.* **1984**, 62, 2113-2116.
- [73] S. Bügler, Dissertation **1983**, Universität Saarbrücken, 145.
- [74] A. M. McKillop, J. A. Tarbin, *Tetrahedron Lett.* **1983**, 24, 1505-1510.
- [75] K. Mori, H. Hashimoto, Y. Takenaka, T. Takigawa, *Synthesis* **1975**, 720-721.
- [76] L. N. Owen, M. U. S. Sultanbawa, *J. Chem. Soc.* **1949**, 3109-3113.
- [77] M. Braun, U. Mahler, S. Houben, *Liebigs Ann. Chem.* **1990**, 513-517.
- [78] Patentschrift: WO 2009/080722 bzw. PCT/EP2008/067952.
- [79] U. Burkard, F. Effenberger, *Chem. Ber.* **1986**, 119, 1594-1612.
- [80] C. Hardouin, M. J. Kelso, F. A. Romero, T. J. Rayl, D. Leung, I. Hwang, B. F. Cravatt, D. L. Boger, *J. Med. Chem.* **2007**, 50, 3359-3368.
- [81] A. K. Kiang, F. G. Mann, *J. Chem. Soc.* **1951**, 1909-1914.
- [82] M. F. Wempe, J. R. Grunwell, *J. Org. Chem.* **1995**, 60, 2714-2720.
- [83] K.-D. Gundermann, *Chem. Ber.* **1955**, 88, 1432-1436.
- [84] K. Inoue, S. Ueda, H. Nayeshiro, N. Moritome, H. Inouye, *Phytochemistry* **1984**, 23, 313-318.

- [85] H. Böhme, R. Malcherek, *Arch. Pharm.* **1980**, 313, 81-89.
- [86] C. Schmidt, Dissertation **2012**, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.
- [87] D. Stephan, M. Winkler, P. Kühner, U. Russ, U. Quast, *Diabetologia* **2006**, 49, 2039-2048.
- [88] P. Hohenberg, W. Kohn, *Phys. Rev.* **1964**, 136, B864-B871.

6. Abkürzungsverzeichnis

abs.:	absolut
Abb.:	Abbildung
Ada:	Adamantyl
ADP:	Adenosindiphosphat
AIBN:	Azo-bis-(isobutyronitril)
Ar:	Aryl
ATP:	Adenosintriphosphat
br:	breit (NMR)
Bu:	Butyl
<i>t</i> Bu:	<i>tert.</i> -Butyl
BuLi:	Butyllithium
d:	Tag(e)
d:	Dublett (NMR)
d. Th.:	der Theorie
dest.:	destilliert
DMF:	<i>N,N</i> -Dimethylformamid
DMSO:	Dimethylsulfoxid
EC ₅₀ :	Konzentration mit halbmaximaler Wirkung
EI:	Elektronische Ionisation (MS)
eq.:	Äquivalent(e)
entspr.:	entspricht
ESI:	Elektronenspray-Ionisation
Et:	Ethyl
GC:	Gaschromatographie
ges.:	gesättigt
h:	Stunde
HPC:	High Performance Computing

HPLC:	High Performance Liquid Chromatography
HR-MS:	High Resolution Mass Spectrometry
Hz:	Hertz
K_D :	Bindungskonstante
K_{ir} :	Einwärtsgerichteter Kaliumkanal (inward rectifier)
K_v :	Spannungsgesteuerter Kaliumkanal
KCO:	Kaliumkanalöffner
konz.:	konzentriert
LDA:	Lithiumdiisopropylamid
Lit.:	Literatur
Lsg.:	Lösung
<i>m</i> :	<i>meta</i>
m:	Multipllett (NMR)
<i>m</i> CPBA:	<i>meta</i> -Chlorperbenzoesäure
m/z:	Masse-über-Ladungs-Verhältnis (MS)
Me:	Methyl
min:	Minuten
MS:	Massenspektrometrie
<i>n</i> :	normal
NBS:	<i>N</i> -Bromsuccinimid
NMR:	Nuclear Magnetic Resonance (Kernmagnetische Resonanz)
<i>o</i> :	<i>ortho</i>
p.a.:	pro analysi
<i>p</i> :	<i>para</i>
pEC ₅₀ :	negativ dekadischer Logarithmus des EC ₅₀ -Werts
Ph:	Phenyl
PhLi:	Phenyllithium
pK _D :	negativ dekadischer Logarithmus der K _D -Werts
PPA:	Polyphosphorsäure
ppm:	parts per million

PPSE:	Polyphosphorsäuretrimethylsilylester
Pr:	Propyl
q:	Quartett (NMR)
quin:	Quintett (NMR)
Reflux:	zum Rückfluss erhitzen
R _f :	Retentionsfaktor
RT:	Raumtemperatur
s:	Singulett (NMR)
sek.:	sekuriert
Smp.:	Schmelzpunkt
R _f :	Retentionsfaktor (DC)
R _T :	Retentionszeit (MS)
RT:	Raumtemperatur
t:	Triplett (NMR)
<i>t, tert:</i>	tertiär
Tab.:	Tabelle
THF:	Tetrahydrofuran
TMD:	transmembranäre Domäne
Tol:	Tolyl
Ts:	Toluolsulfonyl
verd.:	verdünnt

7. Anhang

Tabelle 7-1: Liste der erfolgreich synthetisierten potentiellen Wirkstoffe (inklusive Amide)

Nr.	R
15a
15b
15c
15d
15e
15f
15g
15h

15j
15k
15l
15m
17c
17d
19a
19b
19c
19e

19f
19g
19h
19i
19n
19o
19p
19q
19r

29c
29e
29f
41c
41d
41g
41h
43a
43b
45a

45b
45f
51
52
63
64
70
76
77
110a

111a
111b
111d
111f
111h
111i
111j
113a

113b	
114	
135	
136b	
137a	
137b	
138a	
138b	
139a	
139b	

139c
140b
140c

Abbildung 7-1: $^1\text{H-NMR}$ -Spektrum von **15a**

Abbildung 7-2: ^{13}C -NMR-Spektrum von **15a** Abbildung 7-3: ^1H -NMR-Spektrum von **15b**

Abbildung 7-4: ^{13}C -NMR-Spektrum von **15b** Abbildung 7-5: ^1H -NMR-Spektrum von **15c**

Abbildung 7-6: ^{13}C -NMR-Spektrum von **15c** Abbildung 7-7: ^1H -NMR-Spektrum von **15e**

Abbildung 7-8: ^{13}C -NMR-Spektrum von **15e** Abbildung 7-9: ^1H -NMR-Spektrum von **15m**

Abbildung 7-10: ^{13}C -NMR-Spektrum von **15m** Abbildung 7-11: ^1H -NMR-Spektrum von **19b**

Abbildung 7-12: ^{13}C -NMR-Spektrum von **19b** Abbildung 7-13: ^1H -NMR-Spektrum von **41d**

Abbildung 7-14: ^{13}C -NMR-Spektrum von **41d** Abbildung 7-15: ^1H -NMR-Spektrum von **64**

Abbildung 7-16: ¹³C-NMR-Spektrum von **64** Abbildung 7-17: ¹H-NMR-Spektrum von **110a**

Abbildung 7-18: $^1\text{H-NMR}$ -Spektrum von **111f** Abbildung 7-19: $^1\text{H-NMR}$ -Spektrum von **113b**

Abbildung 7-20: ^{13}C -NMR-Spektrum von **113b** Abbildung 7-21: ^1H , ^1H -COSY(45)-Spektrum von **113b**

Abbildung 7-22: H,C-HMQC-Spektrum von **113b** Abbildung 7-23: ^1H -NMR-Spektrum von **135**

Abbildung 7-24: ¹³C-NMR-Spektrum von **135** Abbildung 7-25: ¹H-NMR-Spektrum von **138a**

Abbildung 7-26: ^{13}C -NMR-Spektrum von **138a** Abbildung 7-27: ^1H -NMR-Spektrum von **139b**

Abbildung 7-28: ^{13}C -NMR-Spektrum von **139b**Tabelle 7-2: Kristallographische Daten zu **41c****Crystal data and structure refinement**

Empirical formula	$\text{C}_{12}\text{H}_{14}\text{N}_2\text{S}_2$	
Formula weight	250.37	
Temperature	291(2) K	
Wavelength	0.71073 Å	
Crystal system	Monoclinic	
Space group	$C2/c$	
Unit cell dimensions	$a = 22.872(5)$ Å	$a = 90^\circ$
	$b = 7.2817(15)$ Å	$b = 102.28(3)^\circ$
	$c = 16.446(3)$ Å	$g = 90^\circ$
Volume	$2676.4(9)$ Å ³	
Z	8	
Density (calculated)	1.243 Mg/m ³	
Absorption coefficient	0.374 mm ⁻¹	
F(000)	1056	
Crystal size	? x ? x ? mm ³	
Theta range for data collection	2.79 to 25.00°	
Index ranges	$-27 \leq h \leq 27$, $-8 \leq k \leq 8$, $-17 \leq l \leq 17$	
Reflections collected	16958	
Independent reflections	2237 [R(int) = 0.0340]	
Completeness to theta = 25.00°	94.7 %	
Refinement method	Full-matrix least-squares on F ²	

Anhang

Data / restraints / parameters	2237 / 0 / 151
Goodness-of-fit on F2	1.121
Final R indices [$I > 2\sigma(I)$]	R1 = 0.0355, wR2 = 0.0752
R indices (all data)	R1 = 0.0511, wR2 = 0.0773
Largest diff. peak and hole	0.199 and -0.154 e.Å ⁻³

Bond lengths [Å] and angles [°]			
		N(2)-C(10)-C(9)	114.32(18)
S(1)-C(8)	1.721(3)	N(2)-C(10)-S(2)	124.12(17)
S(1)-C(1)	1.736(2)	C(9)-C(10)-S(2)	121.56(16)
S(2)-C(10)	1.658(2)	C(1)-C(9)-C(11)	113.05(18)
N(1)-C(1)	1.291(3)	C(1)-C(9)-C(10)	109.65(17)
N(1)-C(2)	1.395(3)	C(11)-C(9)-C(10)	110.94(19)
N(2)-C(10)	1.320(3)	C(1)-C(9)-H(91)	107.7
N(2)-C(12)	1.464(3)	C(11)-C(9)-H(91)	107.7
N(2)-H(1)	0.85(2)	C(10)-C(9)-H(91)	107.7
C(2)-C(3)	1.387(3)	C(2)-C(8)-C(6)	120.5(3)
C(2)-C(8)	1.395(3)	C(2)-C(8)-S(1)	109.67(16)
C(1)-C(9)	1.511(3)	C(6)-C(8)-S(1)	129.8(2)
C(10)-C(9)	1.538(3)	C(2)-C(3)-C(4)	118.9(3)
C(9)-C(11)	1.524(3)	C(2)-C(3)-H(31)	120.5
C(9)-H(91)	0.9800	C(4)-C(3)-H(31)	120.5
C(8)-C(6)	1.400(3)	C(5)-C(6)-C(8)	118.0(3)
C(3)-C(4)	1.371(4)	C(5)-C(6)-H(61)	121.0
C(3)-H(31)	0.9300	C(8)-C(6)-H(61)	121.0
C(6)-C(5)	1.370(4)	C(5)-C(4)-C(3)	120.9(3)
C(6)-H(61)	0.9300	C(5)-C(4)-H(41)	119.5
C(4)-C(5)	1.381(4)	C(3)-C(4)-H(41)	119.5
C(4)-H(41)	0.9300	C(9)-C(11)-H(111)	109.5
C(11)-H(111)	0.9600	C(9)-C(11)-H(112)	109.5
C(11)-H(112)	0.9600	H(111)-C(11)-H(112)	109.5
C(11)-H(113)	0.9600	C(9)-C(11)-H(113)	109.5
C(12)-C(13)	1.481(4)	H(111)-C(11)-H(113)	109.5
C(12)-H(121)	0.9700	H(112)-C(11)-H(113)	109.5
C(12)-H(122)	0.9700	N(2)-C(12)-C(13)	112.4(2)
C(5)-H(51)	0.9300	N(2)-C(12)-H(121)	109.1
C(13)-H(131)	0.9600	C(13)-C(12)-H(121)	109.1
C(13)-H(132)	0.9600	N(2)-C(12)-H(122)	109.1
C(13)-H(133)	0.9600	C(13)-C(12)-H(122)	109.1
C(8)-S(1)-C(1)	89.34(11)	H(121)-C(12)-H(122)	107.9
C(1)-N(1)-C(2)	110.78(18)	C(6)-C(5)-C(4)	121.5(3)
C(10)-N(2)-C(12)	124.1(2)	C(6)-C(5)-H(51)	119.2
C(10)-N(2)-H(1)	118.7(15)	C(4)-C(5)-H(51)	119.2
C(12)-N(2)-H(1)	117.2(15)	C(12)-C(13)-H(131)	109.5
C(3)-C(2)-N(1)	125.5(2)	C(12)-C(13)-H(132)	109.5
C(3)-C(2)-C(8)	120.1(2)	H(131)-C(13)-H(132)	109.5
N(1)-C(2)-C(8)	114.4(2)	C(12)-C(13)-H(133)	109.5
N(1)-C(1)-C(9)	122.16(18)	H(131)-C(13)-H(133)	109.5
N(1)-C(1)-S(1)	115.78(16)	H(132)-C(13)-H(133)	109.5
C(9)-C(1)-S(1)	122.06(17)		

Torsion angles [°]			
C(1)-N(1)-C(2)-C(3)	-179.3(2)	S(2)-C(10)-C(9)-C(11)	62.2(2)
C(1)-N(1)-C(2)-C(8)	0.6(2)	C(3)-C(2)-C(8)-C(6)	-0.1(3)
C(2)-N(1)-C(1)-C(9)	179.78(17)	N(1)-C(2)-C(8)-C(6)	180.0(2)
C(2)-N(1)-C(1)-S(1)	-0.8(2)	C(3)-C(2)-C(8)-S(1)	179.78(17)
C(8)-S(1)-C(1)-N(1)	0.63(17)	N(1)-C(2)-C(8)-S(1)	-0.1(2)
C(8)-S(1)-C(1)-C(9)	-179.96(17)	C(1)-S(1)-C(8)-C(2)	-0.24(16)
C(12)-N(2)-C(10)-C(9)	178.3(2)	C(1)-S(1)-C(8)-C(6)	179.6(2)
C(12)-N(2)-C(10)-S(2)	-1.6(3)	N(1)-C(2)-C(3)-C(4)	179.8(2)
N(1)-C(1)-C(9)-C(11)	164.7(2)	C(8)-C(2)-C(3)-C(4)	-0.1(3)
S(1)-C(1)-C(9)-C(11)	-14.7(3)	C(2)-C(8)-C(6)-C(5)	0.2(4)
N(1)-C(1)-C(9)-C(10)	-70.9(3)	S(1)-C(8)-C(6)-C(5)	-179.7(2)
S(1)-C(1)-C(9)-C(10)	109.68(19)	C(2)-C(3)-C(4)-C(5)	0.2(4)
N(2)-C(10)-C(9)-C(1)	116.8(2)	C(10)-N(2)-C(12)-C(13)	-179.9(2)
S(2)-C(10)-C(9)-C(1)	-63.3(2)	C(8)-C(6)-C(5)-C(4)	-0.1(4)
N(2)-C(10)-C(9)-C(11)	-117.6(2)	C(3)-C(4)-C(5)-C(6)	-0.1(4)

Hydrogen bonds [Å and °].

D-H...A	d(D-H)	d(H...A)	d(D...A)	<(DHA)
N(2)-H(1)...N(1)#1	0.85(2)	2.16(2)	3.011(3)	178(2)

Symmetry transformations used to generate equivalent atoms:

#1 -x,y,-z+3/2

Tabelle 7-3: Kristallographische Daten zu **41d****Crystal data and structure refinement**

Empirical formula	C ₁₄ H ₁₈ N ₂ S ₂	
Formula weight	278.42	
Temperature	291(2) K	
Wavelength	0.71073 Å	
Crystal system	triclinic	
Space group	<i>P</i> -1	
Unit cell dimensions	a = 7.9691(16) Å	a = 94.92(3)°.
	b = 9.6548(19) Å	b = 97.68(3)°.
	c = 9.993(2) Å	g = 92.52(3)°.
Volume	757.9(3) Å ³	
Z	2	
Density (calculated)	1.220 Mg/m ³	
Absorption coefficient	0.337 mm ⁻¹	
F(000)	296	
Crystal size	? x ? x ? mm ³	
Theta range for data collection	2.07 to 25.00°.	
Index ranges	-9<=h<=9, -11<=k<=11, -11<=l<=11	
Reflections collected	10014	
Independent reflections	2597 [R(int) = 0.0727]	
Completeness to theta = 25.00°	97.0 %	
Refinement method	Full-matrix least-squares on F ₂	

Data / restraints / parameters	2597 / 0 / 167
Goodness-of-fit on F ₂	0.997
Final R indices [$I > 2\sigma(I)$]	R1 = 0.0388, wR2 = 0.0683
R indices (all data)	R1 = 0.0799, wR2 = 0.0730
Largest diff. peak and hole	0.189 and -0.193 e.Å ⁻³

Bond lengths [Å] and angles [°]

S(1)-C(1)	1.730(2)	N(2)-C(10)-C(9)	113.1(2)
S(1)-C(3)	1.737(3)	N(2)-C(10)-S(4)	126.42(19)
S(4)-C(10)	1.648(2)	C(9)-C(10)-S(4)	120.49(18)
N(2)-C(10)	1.317(3)	C(3)-C(2)-C(7)	119.1(3)
N(2)-C(11)	1.496(3)	C(3)-C(2)-N(1)	114.9(2)
N(2)-H(1)	0.89(2)	C(7)-C(2)-N(1)	125.9(2)
N(1)-C(1)	1.298(2)	N(1)-C(1)-C(9)	122.7(2)
N(1)-C(2)	1.403(3)	N(1)-C(1)-S(1)	115.01(18)
C(10)-C(9)	1.550(3)	C(9)-C(1)-S(1)	122.24(17)
C(2)-C(3)	1.381(3)	C(8)-C(9)-C(1)	112.7(2)
C(2)-C(7)	1.401(3)	C(8)-C(9)-C(10)	112.80(19)
C(1)-C(9)	1.517(3)	C(1)-C(9)-C(10)	109.06(19)
C(9)-C(8)	1.532(3)	C(8)-C(9)-H(9A)	107.3
C(9)-H(9A)	0.9800	C(1)-C(9)-H(9A)	107.3
C(11)-C(13)	1.533(3)	C(10)-C(9)-H(9A)	107.3
C(11)-C(14)	1.513(3)	N(2)-C(11)-C(13)	110.23(19)
C(11)-C(12)	1.530(3)	N(2)-C(11)-C(14)	105.68(18)
C(3)-C(4)	1.401(4)	C(13)-C(11)-C(14)	109.3(2)
C(7)-C(6)	1.380(4)	N(2)-C(11)-C(12)	110.8(2)
C(7)-H(7A)	0.9300	C(13)-C(11)-C(12)	110.9(2)
C(4)-C(5)	1.366(4)	C(14)-C(11)-C(12)	109.8(2)
C(4)-H(4A)	0.9300	C(2)-C(3)-C(4)	120.9(2)
C(8)-H(8A)	0.9600	C(2)-C(3)-S(1)	109.0(2)
C(8)-H(8B)	0.9600	C(4)-C(3)-S(1)	130.1(2)
C(8)-H(8C)	0.9600	C(6)-C(7)-C(2)	119.3(3)
C(13)-H(13A)	0.9600	C(6)-C(7)-H(7A)	120.4
C(13)-H(13B)	0.9600	C(2)-C(7)-H(7A)	120.4
C(13)-H(13C)	0.9600	C(5)-C(4)-C(3)	119.2(3)
C(12)-H(12A)	0.9600	C(5)-C(4)-H(4A)	120.4
C(12)-H(12B)	0.9600	C(3)-C(4)-H(4A)	120.4
C(12)-H(12C)	0.9600	C(9)-C(8)-H(8A)	109.5
C(5)-C(6)	1.377(4)	C(9)-C(8)-H(8B)	109.5
C(5)-H(5A)	0.9300	H(8A)-C(8)-H(8B)	109.5
C(14)-H(14A)	0.9600	C(9)-C(8)-H(8C)	109.5
C(14)-H(14B)	0.9600	H(8A)-C(8)-H(8C)	109.5
C(14)-H(14C)	0.9600	H(8B)-C(8)-H(8C)	109.5
C(6)-H(6A)	0.9300	C(11)-C(13)-H(13A)	109.5
C(1)-S(1)-C(3)	90.04(13)	C(11)-C(13)-H(13B)	109.5
C(10)-N(2)-C(11)	130.2(2)	H(13A)-C(13)-H(13B)	109.5
C(10)-N(2)-H(1)	113.5(16)	C(11)-C(13)-H(13C)	109.5
C(11)-N(2)-H(1)	116.3(16)	H(13A)-C(13)-H(13C)	109.5
C(1)-N(1)-C(2)	111.1(2)	H(13B)-C(13)-H(13C)	109.5
		C(11)-C(12)-H(12A)	109.5

Anhang

C(11)-C(12)-H(12B)	109.5	C(3)-S(1)-C(1)-C(9)	-177.98(18)
H(12A)-C(12)-H(12B)	109.5	N(1)-C(1)-C(9)-C(8)	124.4(2)
C(11)-C(12)-H(12C)	109.5	S(1)-C(1)-C(9)-C(8)	-57.0(2)
H(12A)-C(12)-H(12C)	109.5	N(1)-C(1)-C(9)-C(10)	-109.5(2)
H(12B)-C(12)-H(12C)	109.5	S(1)-C(1)-C(9)-C(10)	69.1(2)
C(4)-C(5)-C(6)	120.6(3)	N(2)-C(10)-C(9)-C(8)	-140.9(2)
C(4)-C(5)-H(5A)	119.7	S(4)-C(10)-C(9)-C(8)	40.6(3)
C(6)-C(5)-H(5A)	119.7	N(2)-C(10)-C(9)-C(1)	93.1(2)
C(11)-C(14)-H(14A)	109.5	S(4)-C(10)-C(9)-C(1)	-85.4(2)
C(11)-C(14)-H(14B)	109.5	C(10)-N(2)-C(11)-C(13)	-65.6(3)
H(14A)-C(14)-H(14B)	109.5	C(10)-N(2)-C(11)-C(14)	176.4(3)
C(11)-C(14)-H(14C)	109.5	C(10)-N(2)-C(11)-C(12)	57.6(3)
H(14A)-C(14)-H(14C)	109.5	C(7)-C(2)-C(3)-C(4)	0.8(4)
H(14B)-C(14)-H(14C)	109.5	N(1)-C(2)-C(3)-C(4)	-177.4(2)
C(5)-C(6)-C(7)	121.0(3)	C(7)-C(2)-C(3)-S(1)	177.99(18)
C(5)-C(6)-H(6A)	119.5	N(1)-C(2)-C(3)-S(1)	-0.2(3)
C(7)-C(6)-H(6A)	119.5	C(1)-S(1)-C(3)-C(2)	-0.26(18)
		C(1)-S(1)-C(3)-C(4)	176.6(2)
Torsion angles [°]		C(3)-C(2)-C(7)-C(6)	-0.6(4)
C(11)-N(2)-C(10)-C(9)	-177.8(2)	N(1)-C(2)-C(7)-C(6)	177.4(2)
C(11)-N(2)-C(10)-S(4)	0.6(4)	C(2)-C(3)-C(4)-C(5)	-0.3(4)
C(1)-N(1)-C(2)-C(3)	0.8(3)	S(1)-C(3)-C(4)-C(5)	-176.9(2)
C(1)-N(1)-C(2)-C(7)	-177.3(2)	C(3)-C(4)-C(5)-C(6)	-0.3(4)
C(2)-N(1)-C(1)-C(9)	177.74(19)	C(4)-C(5)-C(6)-C(7)	0.4(5)
C(2)-N(1)-C(1)-S(1)	-1.0(2)	C(2)-C(7)-C(6)-C(5)	0.1(4)
C(3)-S(1)-C(1)-N(1)	0.74(18)		

Hydrogen bonds [Å and °].

D-H...A	d(D-H)	d(H...A)	d(D...A)	<(DHA)
N(2)-H(1)...N(1)#1	0.89(2)	2.23(3)	3.091(3)	162(2)

Symmetry transformations used to generate equivalent atoms:

#1 -x,y,-z+3/2

Tabelle 7-4: Kristallographische Daten zu *N*,3-Dimethyl-4-oxo-3,4-dihydro-1*H*-2-benzothiopyran-3-carbothioamid^[30]

Crystal data and structure refinement

Empirical formula	C ₁₂ H ₁₃ NOS ₂	
Formula weight	251.35	
Temperature	291(2) K	
Wavelength	0.71073 Å	
Crystal system	orthorhombic	
Space group	Fdd2	
Unit cell dimensions	a = 14.849(3) Å	a = 90°.
	b = 49.048(10) Å	b = 90°.
	c = 6.7921(14) Å	c = 90°.

Volume	4946.8(17) Å ³
Z	16
Density (calculated)	1.350 Mg/m ³
Absorption coefficient	0.408 mm ⁻¹
F(000)	2112
Crystal size	? x ? x ? mm ³
Theta range for data collection	2.87 to 29.21°.
Index ranges	-19<=h<=20, -66<=k<=66, -9<=l<=9
Reflections collected	14326
Independent reflections	3334 [R(int) = 0.0473]
Completeness to theta = 29.21°	99.2 %
Refinement method	Full-matrix least-squares on F ²
Data / restraints / parameters	3334 / 1 / 151
Goodness-of-fit on F ²	1.224
Final R indices [I>2sigma(I)]	R1 = 0.0474, wR2 = 0.1135
R indices (all data)	R1 = 0.0510, wR2 = 0.1155
Absolute structure parameter	0.05(9)
Largest diff. peak and hole	0.405 and -0.248 e.Å ⁻³

Bond lengths [Å] and angles [°]

		C(12)-H(123)	0.9600
S(1)-C(5)	1.789(3)	C(5)-S(1)-C(1)	99.82(13)
S(1)-C(1)	1.822(2)	C(11)-N(1)-C(12)	124.5(3)
S(2)-C(11)	1.661(2)	C(11)-N(1)-H(1)	114(2)
O(1)-C(2)	1.212(3)	C(12)-N(1)-H(1)	121(2)
N(1)-C(11)	1.313(3)	C(2)-C(1)-C(10)	111.5(2)
N(1)-C(12)	1.455(3)	C(2)-C(1)-C(11)	110.18(19)
N(1)-H(1)	0.87(4)	C(10)-C(1)-C(11)	108.9(2)
C(1)-C(2)	1.529(3)	C(2)-C(1)-S(1)	105.24(15)
C(1)-C(10)	1.534(3)	C(10)-C(1)-S(1)	106.83(18)
C(1)-C(11)	1.537(3)	C(11)-C(1)-S(1)	114.11(15)
C(2)-C(3)	1.495(4)	O(1)-C(2)-C(3)	122.0(2)
C(3)-C(4)	1.396(4)	O(1)-C(2)-C(1)	120.0(2)
C(3)-C(9)	1.399(4)	C(3)-C(2)-C(1)	118.0(2)
C(4)-C(6)	1.388(4)	C(4)-C(3)-C(9)	119.1(3)
C(4)-C(5)	1.498(4)	C(4)-C(3)-C(2)	123.1(2)
C(5)-H(51)	0.9700	C(9)-C(3)-C(2)	117.8(3)
C(5)-H(52)	0.9700	C(6)-C(4)-C(3)	119.1(3)
C(6)-C(7)	1.368(6)	C(6)-C(4)-C(5)	117.4(3)
C(6)-H(61)	0.9300	C(3)-C(4)-C(5)	123.5(2)
C(7)-C(8)	1.382(6)	C(4)-C(5)-S(1)	115.40(19)
C(7)-H(71)	0.9300	C(4)-C(5)-H(51)	108.4
C(8)-C(9)	1.372(6)	S(1)-C(5)-H(51)	108.4
C(8)-H(81)	0.9300	C(4)-C(5)-H(52)	108.4
C(9)-H(91)	0.9300	S(1)-C(5)-H(52)	108.4
C(10)-H(101)	0.9600	H(51)-C(5)-H(52)	107.5
C(10)-H(102)	0.9600	C(7)-C(6)-C(4)	121.1(4)
C(10)-H(103)	0.9600	C(7)-C(6)-H(61)	119.4
C(12)-H(121)	0.9600	C(4)-C(6)-H(61)	119.4
C(12)-H(122)	0.9600	C(6)-C(7)-C(8)	120.1(4)

Anhang

C(6)-C(7)-H(71)	119.9	S(1)-C(1)-C(2)-O(1)	-122.4(2)
C(8)-C(7)-H(71)	119.9	C(10)-C(1)-C(2)-C(3)	170.7(2)
C(9)-C(8)-C(7)	119.9(3)	C(11)-C(1)-C(2)-C(3)	-68.2(3)
C(9)-C(8)-H(81)	120.1	S(1)-C(1)-C(2)-C(3)	55.3(2)
C(7)-C(8)-H(81)	120.1	O(1)-C(2)-C(3)-C(4)	156.7(3)
C(8)-C(9)-C(3)	120.7(4)	C(1)-C(2)-C(3)-C(4)	-20.9(3)
C(8)-C(9)-H(91)	119.7	O(1)-C(2)-C(3)-C(9)	-23.9(4)
C(3)-C(9)-H(91)	119.7	C(1)-C(2)-C(3)-C(9)	158.5(2)
C(1)-C(10)-H(101)	109.5	C(9)-C(3)-C(4)-C(6)	-1.4(4)
C(1)-C(10)-H(102)	109.5	C(2)-C(3)-C(4)-C(6)	178.1(2)
H(101)-C(10)-H(102)	109.5	C(9)-C(3)-C(4)-C(5)	177.2(2)
C(1)-C(10)-H(103)	109.5	C(2)-C(3)-C(4)-C(5)	-3.4(4)
H(101)-C(10)-H(103)	109.5	C(6)-C(4)-C(5)-S(1)	164.8(2)
H(102)-C(10)-H(103)	109.5	C(3)-C(4)-C(5)-S(1)	-13.8(3)
N(1)-C(11)-C(1)	116.5(2)	C(1)-S(1)-C(5)-C(4)	44.3(2)
N(1)-C(11)-S(2)	124.62(19)	C(3)-C(4)-C(6)-C(7)	0.2(4)
C(1)-C(11)-S(2)	118.79(16)	C(5)-C(4)-C(6)-C(7)	-178.4(3)
N(1)-C(12)-H(121)	109.5	C(4)-C(6)-C(7)-C(8)	0.9(5)
N(1)-C(12)-H(122)	109.5	C(6)-C(7)-C(8)-C(9)	-0.8(6)
H(121)-C(12)-H(122)	109.5	C(7)-C(8)-C(9)-C(3)	-0.3(5)
N(1)-C(12)-H(123)	109.5	C(4)-C(3)-C(9)-C(8)	1.4(4)
H(121)-C(12)-H(123)	109.5	C(2)-C(3)-C(9)-C(8)	-178.1(3)
H(122)-C(12)-H(123)	109.5	C(12)-N(1)-C(11)-C(1)	174.4(2)
		C(12)-N(1)-C(11)-S(2)	-1.8(4)
Torsion angles [°]		C(2)-C(1)-C(11)-N(1)	147.0(2)
C(5)-S(1)-C(1)-C(2)	-62.11(18)	C(10)-C(1)-C(11)-N(1)	-90.4(3)
C(5)-S(1)-C(1)-C(10)	179.24(17)	S(1)-C(1)-C(11)-N(1)	28.9(3)
C(5)-S(1)-C(1)-C(11)	58.80(19)	C(2)-C(1)-C(11)-S(2)	-36.5(3)
C(10)-C(1)-C(2)-O(1)	-6.9(3)	C(10)-C(1)-C(11)-S(2)	86.1(2)
C(11)-C(1)-C(2)-O(1)	114.2(3)	S(1)-C(1)-C(11)-S(2)	-154.65(13)

Hydrogen bonds [Å and °].

D-H...A	d(D-H)	d(H...A)	d(D...A)	<(DHA)
N(1)-H(1)...S(1)	0.87(4)	2.48(4)	2.990(2)	118(3)
N(1)-H(1)...O(1)#1	0.87(4)	2.69(3)	3.170(3)	116(3)

Symmetry transformations used to generate equivalent atoms:

#1 x,y,z+1

Tabelle 7-5: Kristallographische Daten zu 3-Methyl-4-oxo-N-propyl-3,4-dihydro-1H-2-benzothiopyran-3-carbothioamid^[30]**Crystal data and structure refinement**

Empirical formula	C ₁₄ H ₁₇ NOS ₂
Formula weight	279.41
Temperature	291(2) K
Wavelength	0.71073 Å
Crystal system	orthorhombic

Anhang

Space group	<i>P</i> 212121	
Unit cell dimensions	<i>a</i> = 7.6717(2) Å	<i>a</i> = 90°.
	<i>b</i> = 13.1851(5) Å	<i>b</i> = 90°.
	<i>c</i> = 14.4259(5) Å	<i>c</i> = 90°.
Volume	1459.21(8) Å ³	
<i>Z</i>	4	
Density (calculated)	1.272 Mg/m ³	
Absorption coefficient	0.353 mm ⁻¹	
<i>F</i> (000)	592	
Crystal size	? x ? x ? mm ³	
Theta range for data collection	2.09 to 29.16°.	
Index ranges	-9 ≤ <i>h</i> ≤ 10, -18 ≤ <i>k</i> ≤ 18, -19 ≤ <i>l</i> ≤ 19	
Reflections collected	17673	
Independent reflections	3920 [<i>R</i> (int) = 0.0607]	
Completeness to theta = 29.16°	99.3 %	
Refinement method	Full-matrix least-squares on <i>F</i> ²	
Data / restraints / parameters	3920 / 0 / 170	
Goodness-of-fit on <i>F</i> ²	1.285	
Final <i>R</i> indices [<i>I</i> > 2σ(<i>I</i>)]	<i>R</i> 1 = 0.0347, <i>wR</i> 2 = 0.0831	
<i>R</i> indices (all data)	<i>R</i> 1 = 0.0354, <i>wR</i> 2 = 0.0835	
Absolute structure parameter	0.51(7)	
Largest diff. peak and hole	0.263 and -0.150 e.Å ⁻³	

Bond lengths [Å] and angles [°]			
		C(10)-H(102)	0.9600
S(1)-C(5)	1.8024(16)	C(10)-H(103)	0.9600
S(1)-C(1)	1.8283(15)	C(12)-C(13)	1.512(2)
S(2)-C(11)	1.6527(16)	C(12)-H(121)	0.9700
O(1)-C(2)	1.2187(18)	C(12)-H(122)	0.9700
N(1)-C(11)	1.325(2)	C(13)-C(14)	1.505(3)
N(1)-C(12)	1.4609(19)	C(13)-H(131)	0.9700
N(1)-H(1)	0.87(2)	C(13)-H(132)	0.9700
C(1)-C(2)	1.528(2)	C(14)-H(141)	0.9600
C(1)-C(11)	1.532(2)	C(14)-H(142)	0.9600
C(1)-C(10)	1.534(2)	C(14)-H(143)	0.9600
C(2)-C(3)	1.484(2)	C(5)-S(1)-C(1)	99.74(7)
C(3)-C(9)	1.397(2)	C(11)-N(1)-C(12)	123.89(15)
C(3)-C(4)	1.399(2)	C(11)-N(1)-H(1)	117.4(13)
C(4)-C(6)	1.397(2)	C(12)-N(1)-H(1)	118.1(13)
C(4)-C(5)	1.504(2)	C(2)-C(1)-C(11)	110.51(12)
C(5)-H(51)	0.9700	C(2)-C(1)-C(10)	112.39(13)
C(5)-H(52)	0.9700	C(11)-C(1)-C(10)	109.19(13)
C(6)-C(7)	1.371(3)	C(2)-C(1)-S(1)	102.54(10)
C(6)-H(61)	0.9300	C(11)-C(1)-S(1)	115.41(10)
C(7)-C(8)	1.372(4)	C(10)-C(1)-S(1)	106.71(11)
C(7)-H(71)	0.9300	O(1)-C(2)-C(3)	121.34(15)
C(8)-C(9)	1.377(3)	O(1)-C(2)-C(1)	121.40(14)
C(8)-H(81)	0.9300	C(3)-C(2)-C(1)	117.19(12)
C(9)-H(91)	0.9300	C(9)-C(3)-C(4)	119.52(16)
C(10)-H(101)	0.9600	C(9)-C(3)-C(2)	117.63(16)

Anhang

C(4)-C(3)-C(2)	122.84(14)	C(13)-C(14)-H(142)	109.5
C(3)-C(4)-C(6)	118.47(16)	H(141)-C(14)-H(142)	109.5
C(3)-C(4)-C(5)	123.30(14)	C(13)-C(14)-H(143)	109.5
C(6)-C(4)-C(5)	118.23(16)	H(141)-C(14)-H(143)	109.5
C(4)-C(5)-S(1)	114.87(11)	H(142)-C(14)-H(143)	109.5
C(4)-C(5)-H(51)	108.6		
S(1)-C(5)-H(51)	108.6	Torsion angles [°]	
C(4)-C(5)-H(52)	108.6	C(5)-S(1)-C(1)-C(2)	64.55(10)
S(1)-C(5)-H(52)	108.6	C(5)-S(1)-C(1)-C(11)	-55.64(12)
H(51)-C(5)-H(52)	107.5	C(5)-S(1)-C(1)-C(10)	-177.14(12)
C(7)-C(6)-C(4)	120.9(2)	C(11)-C(1)-C(2)-O(1)	-121.00(16)
C(7)-C(6)-H(61)	119.5	C(10)-C(1)-C(2)-O(1)	1.2(2)
C(4)-C(6)-H(61)	119.5	S(1)-C(1)-C(2)-O(1)	115.47(15)
C(8)-C(7)-C(6)	120.69(19)	C(11)-C(1)-C(2)-C(3)	61.83(17)
C(8)-C(7)-H(71)	119.7	C(10)-C(1)-C(2)-C(3)	-175.92(14)
C(6)-C(7)-H(71)	119.7	S(1)-C(1)-C(2)-C(3)	-61.70(15)
C(7)-C(8)-C(9)	119.6(2)	O(1)-C(2)-C(3)-C(9)	31.4(2)
C(7)-C(8)-H(81)	120.2	C(1)-C(2)-C(3)-C(9)	-151.41(15)
C(9)-C(8)-H(81)	120.2	O(1)-C(2)-C(3)-C(4)	-149.83(17)
C(8)-C(9)-C(3)	120.7(2)	C(1)-C(2)-C(3)-C(4)	27.3(2)
C(8)-C(9)-H(91)	119.6	C(9)-C(3)-C(4)-C(6)	1.4(3)
C(3)-C(9)-H(91)	119.6	C(2)-C(3)-C(4)-C(6)	-177.32(16)
C(1)-C(10)-H(101)	109.5	C(9)-C(3)-C(4)-C(5)	-178.82(16)
C(1)-C(10)-H(102)	109.5	C(2)-C(3)-C(4)-C(5)	2.5(2)
H(101)-C(10)-H(102)	109.5	C(3)-C(4)-C(5)-S(1)	11.1(2)
C(1)-C(10)-H(103)	109.5	C(6)-C(4)-C(5)-S(1)	-169.17(13)
H(101)-C(10)-H(103)	109.5	C(1)-S(1)-C(5)-C(4)	-42.91(14)
H(102)-C(10)-H(103)	109.5	C(3)-C(4)-C(6)-C(7)	0.0(3)
N(1)-C(11)-C(1)	116.42(14)	C(5)-C(4)-C(6)-C(7)	-179.82(18)
N(1)-C(11)-S(2)	125.57(12)	C(4)-C(6)-C(7)-C(8)	-0.9(3)
C(1)-C(11)-S(2)	117.92(12)	C(6)-C(7)-C(8)-C(9)	0.5(4)
N(1)-C(12)-C(13)	111.41(14)	C(7)-C(8)-C(9)-C(3)	1.0(4)
N(1)-C(12)-H(121)	109.3	C(4)-C(3)-C(9)-C(8)	-1.9(3)
C(13)-C(12)-H(121)	109.3	C(2)-C(3)-C(9)-C(8)	176.9(2)
N(1)-C(12)-H(122)	109.3	C(12)-N(1)-C(11)-C(1)	-179.89(13)
C(13)-C(12)-H(122)	109.3	C(12)-N(1)-C(11)-S(2)	-3.5(2)
H(121)-C(12)-H(122)	108.0	C(2)-C(1)-C(11)-N(1)	-147.19(14)
C(14)-C(13)-C(12)	111.71(17)	C(10)-C(1)-C(11)-N(1)	88.70(17)
C(14)-C(13)-H(131)	109.3	S(1)-C(1)-C(11)-N(1)	-31.46(17)
C(12)-C(13)-H(131)	109.3	C(2)-C(1)-C(11)-S(2)	36.09(16)
C(14)-C(13)-H(132)	109.3	C(10)-C(1)-C(11)-S(2)	-88.02(15)
C(12)-C(13)-H(132)	109.3	S(1)-C(1)-C(11)-S(2)	151.82(9)
H(131)-C(13)-H(132)	107.9	C(11)-N(1)-C(12)-C(13)	-83.8(2)
C(13)-C(14)-H(141)	109.5	N(1)-C(12)-C(13)-C(14)	172.01(18)

Hydrogen bonds [Å and °].

D-H...A d(D-H) d(H...A) d(D...A) <(DHA)

N(1)-H(1)...S(1)	0.87(2)	2.559(19)	3.0389(14)	115.8(15)
N(1)-H(1)...O(1)#1	0.87(2)	2.388(19)	3.060(2)	134.5(16)

Symmetry transformations used to generate equivalent atoms:

#1 -x,y-1/2,-z+3/2

Tabelle 7-6: Kristallographische Daten zu **139a**

Crystal data and structure refinement

Empirical formula	C ₁₅ H ₂₁ NO ₂ S ₂		
Formula weight	311.45		
Temperature	291(2) K		
Wavelength	0.71073 Å		
Crystal system	Triclinic		
Space group	P -1		
Unit cell dimensions	a = 8.8394(10) Å	a = 90.416(13)°.	
	b = 8.9296(13) Å	b = 92.103(9)°.	
	c = 12.0495(13) Å	g = 119.358(9)°.	
Volume	828.04(19) Å ³		
Z	2		
Density (calculated)	1.249 Mg/m ³		
Absorption coefficient	0.322 mm ⁻¹		
F(000)	332		
Crystal size	0.45 x 0.37 x 0.35 mm ³		
Theta range for data collection	2.618 to 24.999°.		
Index ranges	-9<=h<=10, -10<=k<=10, -14<=l<=14		
Reflections collected	6165		
Independent reflections	2879 [R(int) = 0.0867]		
Completeness to theta = 25.242°	95.7 %		
Absorption correction	None		
Refinement method	Full-matrix least-squares on F ²		
Data / restraints / parameters	2879 / 0 / 190		
Goodness-of-fit on F ²	1.012		
Final R indices [I>2sigma(I)]	R1 = 0.0619, wR2 = 0.1833		
R indices (all data)	R1 = 0.0655, wR2 = 0.1869		
Extinction coefficient	n/a		
Largest diff. peak and hole	0.362 and -0.423 e.Å ⁻³		

Bond lengths [Å] and angles [°]

S(1)-C(7)	1.818(3)	C(1)-C(6)	1.387(4)
S(1)-C(8)	1.822(3)	C(1)-C(2)	1.405(4)
S(2)-C(9)	1.663(3)	C(1)-C(7)	1.509(4)
O(1)-C(15)	1.291(4)	C(2)-C(3)	1.403(4)
O(1)-H(1)	0.8200	C(2)-C(15)	1.478(4)
O(2)-C(15)	1.223(4)	C(3)-C(4)	1.371(5)
N(1)-C(9)	1.324(4)	C(3)-H(31)	0.9300
N(1)-C(11)	1.476(4)	C(4)-C(5)	1.375(6)
N(1)-H(2)	0.78(4)	C(4)-H(41)	0.9300

Anhang

C(5)-C(6)	1.370(6)	C(1)-C(7)-H(72)	108.1
C(5)-H(51)	0.9300	S(1)-C(7)-H(72)	108.1
C(6)-H(61)	0.9300	H(71)-C(7)-H(72)	107.3
C(7)-H(71)	0.9700	C(9)-C(8)-C(10)	108.2(3)
C(7)-H(72)	0.9700	C(9)-C(8)-S(1)	115.45(18)
C(8)-C(9)	1.520(4)	C(10)-C(8)-S(1)	106.8(2)
C(8)-C(10)	1.539(4)	C(9)-C(8)-H(81)	108.7
C(8)-H(81)	0.9800	C(10)-C(8)-H(81)	108.7
C(10)-H(101)	0.9600	S(1)-C(8)-H(81)	108.7
C(10)-H(102)	0.9600	N(1)-C(9)-C(8)	115.1(2)
C(10)-H(103)	0.9600	N(1)-C(9)-S(2)	126.6(2)
C(11)-C(13)	1.513(4)	C(8)-C(9)-S(2)	118.09(19)
C(11)-C(12)	1.517(5)	C(8)-C(10)-H(101)	109.5
C(11)-C(14)	1.522(5)	C(8)-C(10)-H(102)	109.5
C(12)-H(121)	0.9600	H(101)-C(10)-H(102)	109.5
C(12)-H(122)	0.9600	C(8)-C(10)-H(103)	109.5
C(12)-H(123)	0.9600	H(101)-C(10)-H(103)	109.5
C(13)-H(131)	0.9600	H(102)-C(10)-H(103)	109.5
C(13)-H(132)	0.9600	N(1)-C(11)-C(13)	110.4(2)
C(13)-H(133)	0.9600	N(1)-C(11)-C(12)	110.2(2)
C(14)-H(141)	0.9600	C(13)-C(11)-C(12)	111.0(3)
C(14)-H(142)	0.9600	N(1)-C(11)-C(14)	105.0(3)
C(14)-H(143)	0.9600	C(13)-C(11)-C(14)	109.8(3)
C(7)-S(1)-C(8)	102.71(14)	C(12)-C(11)-C(14)	110.3(3)
C(15)-O(1)-H(1)	109.5	C(11)-C(12)-H(121)	109.5
C(9)-N(1)-C(11)	131.7(3)	C(11)-C(12)-H(122)	109.5
C(9)-N(1)-H(2)	113(3)	H(121)-C(12)-H(122)	109.5
C(11)-N(1)-H(2)	115(3)	C(11)-C(12)-H(123)	109.5
C(6)-C(1)-C(2)	117.2(3)	H(121)-C(12)-H(123)	109.5
C(6)-C(1)-C(7)	117.4(3)	H(122)-C(12)-H(123)	109.5
C(2)-C(1)-C(7)	125.4(3)	C(11)-C(13)-H(131)	109.5
C(3)-C(2)-C(1)	119.8(3)	C(11)-C(13)-H(132)	109.5
C(3)-C(2)-C(15)	117.4(3)	H(131)-C(13)-H(132)	109.5
C(1)-C(2)-C(15)	122.8(3)	C(11)-C(13)-H(133)	109.5
C(4)-C(3)-C(2)	120.9(3)	H(131)-C(13)-H(133)	109.5
C(4)-C(3)-H(31)	119.6	H(132)-C(13)-H(133)	109.5
C(2)-C(3)-H(31)	119.6	C(11)-C(14)-H(141)	109.5
C(3)-C(4)-C(5)	119.5(3)	C(11)-C(14)-H(142)	109.5
C(3)-C(4)-H(41)	120.3	H(141)-C(14)-H(142)	109.5
C(5)-C(4)-H(41)	120.3	C(11)-C(14)-H(143)	109.5
C(6)-C(5)-C(4)	120.1(3)	H(141)-C(14)-H(143)	109.5
C(6)-C(5)-H(51)	120.0	H(142)-C(14)-H(143)	109.5
C(4)-C(5)-H(51)	120.0	O(2)-C(15)-O(1)	121.0(3)
C(5)-C(6)-C(1)	122.5(3)	O(2)-C(15)-C(2)	123.7(3)
C(5)-C(6)-H(61)	118.7	O(1)-C(15)-C(2)	115.3(3)
C(1)-C(6)-H(61)	118.7		
C(1)-C(7)-S(1)	116.7(2)	Torsion angles [°]	
C(1)-C(7)-H(71)	108.1	C(6)-C(1)-C(2)-C(3)	-1.2(4)
S(1)-C(7)-H(71)	108.1	C(7)-C(1)-C(2)-C(3)	177.0(3)

Anhang

C(6)-C(1)-C(2)-C(15)	177.5(3)	C(11)-N(1)-C(9)-C(8)	-171.2(3)
C(7)-C(1)-C(2)-C(15)	-4.3(4)	C(11)-N(1)-C(9)-S(2)	3.0(4)
C(1)-C(2)-C(3)-C(4)	-0.8(5)	C(10)-C(8)-C(9)-N(1)	90.2(3)
C(15)-C(2)-C(3)-C(4)	-179.6(3)	S(1)-C(8)-C(9)-N(1)	-29.4(3)
C(2)-C(3)-C(4)-C(5)	1.9(5)	C(10)-C(8)-C(9)-S(2)	-84.6(3)
C(3)-C(4)-C(5)-C(6)	-1.0(6)	S(1)-C(8)-C(9)-S(2)	155.91(16)
C(4)-C(5)-C(6)-C(1)	-1.1(6)	C(9)-N(1)-C(11)-C(13)	-65.7(4)
C(2)-C(1)-C(6)-C(5)	2.2(5)	C(9)-N(1)-C(11)-C(12)	57.3(4)
C(7)-C(1)-C(6)-C(5)	-176.2(3)	C(9)-N(1)-C(11)-C(14)	176.1(3)
C(6)-C(1)-C(7)-S(1)	-105.5(3)	C(3)-C(2)-C(15)-O(2)	-165.1(3)
C(2)-C(1)-C(7)-S(1)	76.3(3)	C(1)-C(2)-C(15)-O(2)	16.1(5)
C(8)-S(1)-C(7)-C(1)	64.8(2)	C(3)-C(2)-C(15)-O(1)	14.9(4)
C(7)-S(1)-C(8)-C(9)	-83.6(2)	C(1)-C(2)-C(15)-O(1)	-163.9(3)
C(7)-S(1)-C(8)-C(10)	156.0(2)		

Hydrogen bonds [Å and °]

D-H...A	d(D-H)	d(H...A)	d(D...A)	<(DHA)
N(1)-H(2)...S(1)	0.78(4)	2.47(3)	2.985(3)	125(3)
O(1)-H(1)...O(2)#1	0.82	1.91	2.636(4)	147.1

Symmetry transformations used to generate equivalent atoms:

#1 -x,-y,-z+1